ALVEGESIC VET 10 MG/ML

Butorfanol 1%, soluţie injectabilă sub formă de Tartrat de butorfanol



De ce să utilizezi Alvegesic®

SEDARE UŞOARĂ

SIGUR

- Riscuri minime în caz de supradoză
- Sinergie cu alte molecule

TOATE CĂILE DE ADMINISTRARE POSIBILE

TIMP DE AŞTEPTARE

0 zile (cai!)

BistriVet
Everything for vets and farms

Biové
Laboratoires


ALVEGESIC VET 10 MG/ML

Butorfanol 1%, soluţie injectabilă sub formă de Tartrat de butorfanol



DOZAJ	MOD DE ADMIN.	ANALGESIC	SEDATIV
Cai	IV	0.01 mL/kg greutate corporală	0.20 mL/100 kg greutate corporală
Câini	IM, IV, SC	0.02 mL/kg greutate corporală	0.01 mL/kg greutate corporală
Pisici	IM, SC	0.04 mL/kg greutate corporală	0.04 mL/kg greutate corporală
	IV	0.01 mL/kg greutate corporală	0.01 mL/kg greutate corporală

Etapele anesteziei generale



Utilizare

Pre-anestezie

- Între 0.01 şi 0.02 ml/kg greutate corporală la câini
- 0.04 ml/kg greutate corporală la pisici
- Efect în **15-20 minute**
- Posibilă asociere cu un calmant

Anestezie

- În asociere cu **Medetomidina - Ketamina** la câini şi pisici, respectând protocoalele produselor

Sedare


- **Câini:** doar Alvegesic
- **Pisici:** doar Alvegesic, sau în asociere cu un anestezic local
- **Cai:** Alvegesic la 5 minute după romfidină sau hidroclorură de detomidină

Analgezia

- Analgezia viscerală la speciile ţintă
- Efect în 15 minute
- Durata: 2 ore
- Posibilitatea readministrării

Analgezia (Post)

- o administrare cu 15 minute înainte de trezire pentru prevenirea durerilor post-operatorii



V.M.D. nv/sa, member of Inovet • Hoge Mauw 900 • 2370 Arendonk • Belgium
Tel +32 14 67 20 51 • Fax +32 14 67 21 52 • info@inovet.eu • www.inovet.eu • join us on

InoVet

BistriVet
Everything for vets and farms

BistriVet
Bistrița, Str. Libertății Nr. 13, Bistrița-Năsăud,
420155 România, www.bistrivet.ro