LIVISTO


BistriVet
Everything for vets and farms

ANIMELOXAN

20 mg/ml

DON'T LET THE FLAME BURN

Meloxicam soluție injectabilă pentru bovine, suine și cabaline



Along with you

ANIMELOXAN

20 mg/ml

Meloxicam soluție injectabilă pentru bovine, suine și cabaline

DON'T LET THE FLAME BURN


Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) sunt utilizate pe scară largă în practica animalelor de producție pentru reducerea efectelor negative asociate cascadei inflamatorii, cum ar fi edemul excesiv, febra sau durerea.[1]

Scopul utilizării AINS este acela de a contribui la bunăstarea animalelor și de a restabili performanța acestora (producția de lapte sau rata de creștere), adesea afectată de durere cronică, inflamație și febră.

CUM ACȚIONEAZĂ MELOXICAM?

Meloxicam este un AINS care acționează prin inhibarea ciclooxigenazei-2 (**COX-2**), cu efect rezidual în ciclooxigenaza-1 (COX-1). Izoforma COX-1 promovează producerea de prostaglandine cu funcție de protecție în mucoasa gastrică, rinichi, trombocite și celule imunitare.

Inhibarea specifică a COX-2 permite un bun efect antiinflamator, antipiretic și analgezic, cu mai puține efecte adverse legate de inhibarea COX-1 (ex. efecte gastrointestinale).



Antiinflamator
Antipiretic
Inhibiția prostaglandinelor.

Antiinflamator
Anticoagulant
Inhibarea tromboxanului B2 (TXB2).

Antiinflamator
Analgezic
Inhibarea mai selectivă a COX-2 înseamnă mai puține efecte gastrointestinale secundare.

Selectivitatea crescută pentru COX-2 implică faptul că meloxicam asigură o activitate antiinflamatoare echivalentă altor AINS, dar cu **mai puține efecte secundare** gastrointestinale decât AINS COX-2 neselective.

DON'T LET THE FLAME BURN

CÂND SĂ UTILIZAȚI MELOXICAM

Indicații		
• Infecții respiratorii acute [2] • Diareea vițeilor [2] • Mastită acută [3,4] • Decornare [5] • Preoperator (cezariană, operații, șchiopătare) [5–7]	• Tulburări locomotorii neinfecțioase [4] • Septicemie puerperală și toxemie (sindrom mastită-metrită-agalaxie) [4] • Controlul durerii după castrarea chirurgicală [8] • Perioada periparturientă [9] • Boli infecțioase sistemice [9]	• Ameliorarea durerii în bolile musculo-scheletice și articulare cronice (șchiopătare, sinovită, osteoartrită...) [10,11] • Tratament analgezic simptomatic pentru colici (dureri viscerale) [4] • Durere post-operatorie [12] • Inflamație (edem malign) [11]

ANIMELOXAN 20 mg/ml este alegerea ideală pentru terapia adjuvantă a bolilor care evoluează cu inflamație, durere, febră sau edem. Cu **ANIMELOXAN 20 mg/ml**, nu lăsați flacăra să ardă.







DOZE ȘI TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine
- Cale de administrare SC sau IV.
- 2.5 ml/100 kg g.c.
- Doză unică.

Carne și organe
15 zile.

Lapte
5 zile.

Suine
- Cale de administrare IM.
- 2 ml/100 kg g.c.
- Doză unică.

Carne și organe
8 zile.

Cabaline
- Cale de administrare IV.
- 3 ml/100 kg g.c.
- Doză unică.

Carne și organe
5 zile.



Datorită caracteristicilor farmacocinetice și activității sale prelungite, o singură doză de **ANIMELOXAN 20 mg/ml** este suficientă pentru a obține un bun efect antiinflamator.

Everything for vets and farms

LIVISTO

BistriVet
Everything for vets and farms



ANIMELOXAN

20 mg/ml

Meloxicam soluție injectabilă pentru bovine, suine și cabaline

DON'T LET THE FLAME BURN

MAI PUȚINE EFECTE GASTROINTESTINALE NEGAIVE. DOZĂ UNICĂ

Compoziție
1 ml conține: Meloxicam 20 mg

Forma farmaceutică
Soluție injectabilă. Soluție limpede, galbenă

Specii țintă
Bovine, suine și cabaline

Indicații pentru utilizare
Bovine: Pentru utilizare în infecții respiratorii acute, în asociere cu o antibioterapie adecvată, în scopul reducerii semnelor clinice.
Indicat pentru utilizare în caz de diaree, în asociere cu o terapie orală de rehidratare, în scopul reducerii semnelor clinice la viței de peste o săptămână și la tineretul bovin. Indicat ca medicație adjuvantă în tratamentul mastitei acute, în asociere cu antibioterapie.
Suine: Pentru utilizare în tulburări locomotorii neinfecțioase, cu scopul reducerii simptomelor de șchiopătare și inflamație. Indicat ca terapie adjuvantă în tratamentul septicemiei puerperale și a toxemiei (sindromul mastită-metrită-agalaxie), împreună cu tratamentul antibiotic corespunzător.
Cabaline: Pentru utilizare în ameliorarea inflamației și calmarea durerii în tulburări musculoscheletice, atât acute, cât și cronice. Pentru reducerea durerii asociate colicii ecvine.

Contraindicații
Nu utilizați la caii cu vârstă mai mică de 6 săptămâni. Nu utilizați la animalele cu funcție hepatică, cardiacă sau renală afectată ori acolo unde există evidențe ale unor leziuni gastrointestinale ulcerogene.
Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Pentru tratamentul diareei la bovine, nu utilizați la animalele cu vârsta mai mică de o săptămână.

Precauții speciale pentru utilizare
Precauții speciale pentru utilizare la animale
Dacă apar reacții adverse, tratamentul trebuie întrerupt și trebuie cerut sfatul unui medic veterinar. Evitați utilizarea la animalele sever deshidratate, hipovolemice sau hipotensive care necesită rehidratare parenterală, deoarece există un potențial risc de toxicitate renală. În caz de ameliorare insuficientă a durerii atunci când este utilizat în tratamentul colicii ecvine, se recomandă reevaluarea atentă a diagnosticului, deoarece aceasta ar putea indica necesitatea unei intervenții chirurgicale.
Precauții speciale care trebuie luate de către persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale: Autoinjectarea accidentală poate cauza durere.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de autoinjectare accidentală, consultați imediat medicul și arătați-i prospectul sau eticheta. Dacă are loc contactul accidental cu pielea, spălați minuțios zona afectată. Spălați-vă mâinile după utilizare. Având în vedere riscul autoinjectării accidentale și efectele adverse de clasă cunoscute ale AINS și ale altor inhibitori ai prostaglandinei asupra sarcinii și/sau a dezvoltării embriofetale, produsul medicinal veterinar nu trebuie administrat de către femeile însărcinate sau de către femeile care încearcă să rămână însărcinate.

Reacții adverse
La bovine, o singură injecție subcutanată poate provoca un edem nedureros care durează până la 23 de zile. Injecția intravenoasă este, în general, bine tolerată. La suine, două injecții intramusculare consecutive au un efect iritant local care poate dura până la 9 zile.
La cabaline, poate apărea un edem tranzitoriu la locul injecției, dar se remite fără intervenție. În cazuri rare, pot apărea reacții anafilactoide grave (inclusiv fatale), care ar trebui tratate simptomatic.

Utilizarea în timpul gestației, lactației sau în perioada de ouat
Bovine și suine: Poate fi utilizat în timpul gestației și al lactației.
Cabaline: Nu utilizați la iepele gestante sau care alăptează.

Interacțiunea cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune
Nu administrați concomitent cu glucocorticosteroizi, cu alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene sau cu agenți anticoagulanți.

Cantități de administrat și calea de administrare
Bovine: Injecție subcutanată sau intravenoasă unică, în doză de 0.5 mg meloxicam/kg greutate corporală (i.e. 2.5 ml/100 kg greutate corporală), în combinație cu antibioterapia sau cu terapia de rehidratare orală, după caz.
Suine: Injecție intramusculară unică, în doză de 0.4 mg meloxicam/kg greutate corporală (i.e. 2.0 ml/100 kg greutate corporală), în combinație cu antibioterapia, după caz. Dacă este necesar, se poate administra o a doua doză de meloxicam, după 24 de ore.
Cabaline: Injecție intravenoasă unică, în doză de 0.6 mg meloxicam/kg greutate corporală (i.e. 3.0 ml/100 kg greutate corporală).

Supradozaj (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), dacă este cazul
În cazul unui supradozaj, trebuie inițiat un tratament simptomatic.

Timp de așteptare
Bovine: Carne și organe: 15 zile; Lapte: 5 zile
Suine: Carne și organe: 8 zile
Cabaline: Carne și organe: 5 zile. Nu utilizați la iepele care produc lapte pentru consum uman.

Perioada de valabilitate
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar, ambalat pentru vânzare: 2 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.

Precauții speciale pentru păstrare
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de temperatură pentru păstrare.

Ambalare
Flacoane din sticlă, de 50 ml și 100 ml.
Deținătorul autorizației de comercializare
aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Germania

Referințe bibliografice

1. LIVISTO. DEXAFAST- Technical dossier. (2019)
2. Engelen, B., Jehee, N. & Dinther, K. Van. Meloxicam – A literature review – Authors : 1–26 (2016).
3. McDougall, S., Niethammer, J. & Graham, E. M. Antimicrobial usage and risk of retreatment for mild to moderate clinical mastitis cases on dairy farms following on-farm bacterial culture and selective therapy. N. Z. Vet. J. 66, 98–107 (2018).
4. EMA. ANIMELOXAN 20 mg/ml. Summary of product characteristics. 1–23 (2017).
5. Orr, J., Geraghty, T. & Ellis, K. Anti-inflammatories in cattle medicine. Livest. J. 19, 322–329 (2014).
6. Barrier, A. C., Coombs, T. M., Dwyer, C. M., Haskell, M. J. & Goby, L. Administration of a NSAID (meloxicam) affects lying behaviour after caesarean section in beef cows. Appl. Anim. Behav. Sci. 155, 28–33 (2014).
7. Offinger, J. et al. Postoperative analgesic efficacy of meloxicam in lame dairy cows undergoing resection of the distal interphalangeal joint. J. Dairy Sci. 96, 866–876 (2013).
8. Viscardi, A. V. & Turner, P. V. Use of Meloxicam or Ketoprofen for piglet pain control following surgical castration. Front. Vet. Sci. 5, (2018).
9. Schoos, A., Devreese, M. & Maes, D. G. D. Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs in porcine health management. Vet. Rec. 185, 172 (2019).
10. Naylor, R. Non-steroidal anti-inflammatory treatment in the horse. Veterinary practice (2017).
11. MacLeay, J. M., Eades, S. C., Moore, R. M. & Stokes, A. M. Diseases of the Musculoskeletal System. in Equine Internal Medicine: Second Edi, 1371–1539 (2017).
12. Davis, J. L. Pharmacologic Principles. Equine Internal Medicine: Fourth Edition (Elsevier, 2018).

S.C. BistriVet S.R.L.
Bistrița, str. Libertății, nr. 13
Bistrița-Năsăud, 420155 România

www.bistrivet.ro