

BistriVet
Everything for vets and farms

CATALOG PRODUSE CABALINE

www.bistrivet.ro

BistriVet
Everything for vets and farms

CUPRINS

1 VACCINURI

Bioequin FH inj 5
Bioequin H 6
Cloteid 4 7
Ser Clostetan 7
Biocan R 8

2 ANTIBIOTICE

Procapen 9
Borgal 9
Spectam 9
Streptonamid 10

3 ANTIINFLAMATOARE

Animeloxan 11
Dexafast 11
Dexa-kel 11
Dexafort 12
Kelaprofen 12
Novasul 12
Wellicox 13

4 ANTIPARAZITARE

Equiverm Duo 14
Top Spot On 15
Panacur pastă 15
Panacur 10% 15
Vanbendazol 16
Equimoxin 16

5 ANESTEZICE

Alvegesic 17
Nalgosed 18
Narkamon Bio 19
Xylazin Bio 19
Domosedan 19

6 SPRAY-URI ŞI UNGUENTE

Animedazon 20
Protego 20
Zinkoxid 21
Aluminium spray 21
Arthro gel 21
Charmil spray 22
Charmil gel 22
Charmil multiaction skin pump spray 22
Herba gel 23
Rumak gel 23

8 HORMONALE

Busol 24
Genestran 24
Oestrophan 24
Oxytocin Bioveta 25

7 SUPLIMENTE

Calmix paste 26
Electro liquid 26
Joint solution 27

9 TONICE DIGESTIVE

Afanil 28
Menbutil 28
Tympanol 28
YeaBis 29
Ruchamax 29

10 PRODUSE OFTALMICE

Ocryl 30
Ocry-gel 31
Twelve 31
Fluodrop 32
Clerapliq 32

11 ADITIVI FURAJERI

Diaroak 33
ToxyBis FIX 33
Original XPC 34
MT.X+ 35
Mineral Block 36
Selco Block 36

12 VITAMINE

Introvit 37

13 FURAJE

VL Cal Action Mix 38
VL Cal Endurix 38
VL Cal Mix Tradition 39
VL Cal Juniorix 39
VL Cal Tradition Pellet 40
VL Cal Performix 40
VL Cal Pianissimo 41
VL Cal Superforce 41
VL Cal Fiberforce 42

14 RATICIDE ŞI INSECTICIDE

Muribrom 43
MasterFly Bait 44

15 ALTE PRODUSE

Eres 45
Drotavet 45
Bujiuri intrauterine URAKSHA 45
Buscopan 46
Şampon Herba Vital 46

16 CONSUMABILE/INSTRUMENTAR/ ECHIPAMENTE ZOOTEHNICE

Cleşte Reimers 47
Pensă Burdizzo 47
Adăpătoare cu plutitor din plastic 47
Adăpătoare din fontă emailată cu clapetă de inox 47
Ace şi fire sutură 48
Seringă UF cu ac 49
Seringă plexiglas 49
Bandaj elastic autoadeziv 49
Faşă tifon rolă 49
Mănuşi 50
Seringă dozator pistol rezervor 30 ml 50
Seringă dozator rezervor 50 ml 50
Seringă automată 1, 2, 3 şi 5 ml P albastru Flacon 51
Seringă automată A metalică 0,1-2 ml Furtun 51
Seringă automată B metalică 0,1-1 ml Furtun 51
Seringă automată B metalică 0,1-2 ml Furtun 52
Seringă automată B metalică 0,1-5 ml Furtun 52

CUPRINS

16 CONSUMABILE/INSTRUMENTAR/ ECHIPAMENTE ZOOTEHNICE

Seringă automată K pistol 2 ml Furtun **52**
Seringă automată 5 ml B PG **53**
Dispozitiv injectare de la distanţă **53**
HSW seringă automată ECO-MATIC® **54**
HSW seringă automată ECO-MATIC®cu furtun..... **54**
HSW seringă automată MULTI-MATIC 25 ml LL, 50 ml LL **54**
HSW seringă automată TUBERCULINARE HENKE-JECT® TBC 2 ml **55**
HSW seringă PLEXIGLAS - TU FLEX-MASTER® 10 ml LL **55**
HSW pistol dozator ECO-MATIC® WITH TUBING DRENCHER 30 ml LL **55**
Pistol dozator 60 ml (cu furtun) pentru administrare orală **56**
Pistol dozator 20, 30, 50 ml (fără furtun) pentru administrare orală **56**
Dozatoare Mixrite **56**
Pense **57**
Foarfece **57**
Cutii instrumentar **57**
Scafă aluminiu **58**
Ţesală cu 4 lame **58**

BioEquin FH

împotriva gripei ecvine, infecției cauzate de virusul herpetic ecvin și pentru imunizarea activă a iepelor gestante împotriva apariției avorturilor



Ambalaje: 10 flacoane de o doză
2 flacoane de o doză

Imunizarea activă a cailor pentru a reduce apariția de infecții respiratorii și a semnelor clinice cauzate de virusul gripal ecvin și virusul herpetic cabalin (EHV-1).
Imunizarea activă reduce apariția de avorturi cauzate de infecția cu virusul herpetic ecvin (EHV-1) la iepele gestante.

Conține tulpina EHV-1, care provoacă avort și care oferă imunitate încrucișată împotriva EHV-4, izolată de pe teritoriul Republicii Cehe.

Influența ecvină:
Instalarea imunității active: 14 zile după vaccinarea primară
Durata imunității active: 6 luni după revaccinare

Herpesvirusul:
Instalarea imunității active: 14 zile după vaccinarea primară
Durata imunității active: 6 luni după revaccinare

Schema de vaccinare:
Vaccinarea primară împotriva influenței ecvine și herpesvirusului ecvin:
Prima vaccinare la vârsta de 6 luni; a doua vaccinare după 4 săptămâni.
Revaccinarea împotriva influenței ecvine și herpesvirusului ecvin:
Prima revaccinare (a treia doză) se administrează la 3 luni după vaccinarea primară și următoarea revaccinare se efectuează o dată la 6 luni.
Vaccinarea iepelor gestante:
Pentru a reduce incidența avorturilor provocate de infecția cu virus herpetic ecvin, o doză de vaccin se administrează la iepele gestante în luna a doua după împerechere și apoi în luna a cincea (sau a șasea) și în luna a noua de gestație.

Conţine noile tulpini de virus gripal, în conformitate cu recomandările OIE:

- *Virusul influenței ecvine, inactivat*, tulpinile:
  A/Equi 2/Brno 08 (American type) H3N8
  A/Equi 2/ Morava 95 (European type) H3N8
- *Herpesvirus ecvin inactivat, tipul 1*, (EHV-1)

bioveta
WE respect ANIMALS
VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

BioEquin H

Vaccinul este utilizat în imunizarea activă a cailor pentru a reduce incidența apariției infecțiilor respiratorii și a simptomelor clinice cauzate de virusul herpetic ecvin (EHV-1) și pentru a reduce incidența avorturilor provocate de virusul herpetic ecvin (EHV-1).

Conține tulpina responsabilă de avort a virusului EHV-1, izolată pe teritoriul Republicii Cehe, care oferă imunitate încrucișată și împotriva EHV-4

Instalarea imunității active: 14 zile după vaccinarea primară
Durata imunității active: 6 luni după revaccinare

Schema de vaccinare:

Schema de vaccinare împotriva semnelor respiratorii:
Prima vaccinare se efectuează la vârsta de șase luni, revaccinarea după patru săptămâni (vaccinarea de bază), cu repetarea vaccinării la trei luni de la vaccinarea de bază. Vaccinarea de rutină se efectuează o dată la șase luni.

Vaccinarea iepelor gestante împotriva avortului:
Pentru a reduce incidența avorturilor provocate de virusul herpetic ecvin, se aplică 1 doză de vaccin iepelor gestante, în luna a doua de gestație, iar în continuare în lunile 5–6 și 9 de gestație.

Conținutul:
Herpesvirus ecvin inactivat, tipul 1, (EHV-1)



Ambalaje: 10 flacoane de o doză
2 flacoane de o doză

bioveta
WE respect ANIMALS
VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

CLOTEID 4 inj. ad us. vet.

Vaccin împotriva tetanosului



Imunitatea începe după 14 până la 21 zile de la revaccinare și persistă timp de cel puțin 4 ani la cai.

Calea de administrare:

Administrați intramuscular în mușchii gluteali. La cai, vaccinul poate fi administrat folosind așa-numita metodă cu ac uscat, de preferință în mușchii fesieri. În cazuri particulare, la cai deosebit de retivi, vaccinul poate fi administrat în mușchii cervicali sau pectorali.

Doza: 1 ml, revaccinarea cu același volum, după trei săptămâni.

Următoarea doză de rapel va fi administrată după patru ani de la vaccinare.

Ambalaje: 2 × 1 ml, 10 × 1 ml

Substanța activă: anatoxină tetanică purificată 30 UI

Ser Clostetan inj. ad us. vet.

Ser antitetanic



Calea de administrare:

Intramuscular sau intravenos

Doza:

Profilactic:

Cai	4 000–6 000 UI (13–20 ml)

Terapeutic:

Cai	40 000 UI (140 ml)

Doza terapeutică se administrează zilnic, timp de 2–4 zile, în funcţie de starea de sănătate a animalului.

Ambalaje: 1 × 20 ml, 5 × 20 ml, 1 × 100 ml

Substanţă activă: *Immunoserum tetanicum equinum nativum* min. 300 IU/1 ml



bioveta

vaccin antirabic inactivat

Biocan R

- vaccinul sub formă lichidă conține virusul rabic inactivat, valoarea antigenică a vaccinului, exprimată în unități internaționale (UI), este de minim 2,0 UI în 1 ml
- pentru imunizarea activă împotriva rabiei începând cu vârsta de 12 săptămâni
- se aplică s.c. sau i.m., în doză de 1 ml
- animalele vaccinate înainte de vârsta de 12 săptămâni trebuie revaccinate după atingerea acestei vârste
- animalele vaccinate pentru prima dată la vârsta de 3-12 luni trebuie revaccinate la un an după prima aplicare a vaccinului
- revaccinarea asigură protecția animalelor pentru minim 2 ani

ADMINISTRARE:

Doza este de 1 ml, indiferent de vârstă, greutate sau rasă. Se poate administra începând cu vârsta de 12 săptămâni.



Ambalaje: 10 doze/cutie x 10 ml
20 doze/cutie x 1 ml

Conținutul:

Virus rabic inactivat, tulpina SAD Vnukovo-32 min. 2 U.I

PROCAPEN 300 mg/ml
100 ml



Substanţă activă:
Benzilpenicilină procainică monohidrat - 300,00 mg/ml

Indicaţii:
- infecţii bacteriene generale (septicemii)
- infecţii ale: sistemului respirator, aparatului urinar şi genital, pielii şi unghiilor, articulaţiilor

Administrare:
0,5 ml/ 10 kg greutate corporală

Timp de aşteptare: Carne şi organe: 14 zile
Lapte: Produsul nu se va administra la iepele care produc lapte destinat consumului uman.

BORGAL 24%
100 ml



Substanţă activă:
1 ml conţine: 200 mg sulfadoxină şi 40 mg trimetoprim

Indicaţii:
- infecţii ale tractului respirator, cauzate de *Streptococcus equi subsp. equi* şi subsp. *zooepidemicus*
- infecţii ale tractului genital, cauzate de *Streptococcus equi subsp. Zooepidemicus, Klebsiella* spp. şi *Streptococul beta-hemolitic*

Administrare: 3 ml/50 kg greutate corporală (15 mg substanţă activă/kg greutate corporală), i.v. lent sau i.m.
Doza se poate repeta la interval de 24 - 48 ore.

Timp de aşteptare: Carne şi organe: 8 zile

SPECTAM
100 ml



Substanţă activă:
Spectinomicină (dihidroclorid pentahidrat) 100 mg/ml

Indicaţii:
- infecţii digestive şi repiratorii produse de micoplasme, salmonele, colibacili, pasteurele
- alte infecţii produse de germeni sensibili la spectinomicină

Administrare:
10 - 20 ml /100 kg greutate corporală, timp de 3 zile

Timp de aşteptare: Carne şi organe: 5 zile

STREPTONAMID
2,8 g - 5 plicuri/cutie



Substanţă activă:
Un plic conţine:
Sulfat de streptomicină 1 000 000 UI
Ftalilsulfatiazol 1,0 g

Indicaţii:
- infecţii ale tractului digestiv (diaree şi dizenterie) cauzate de către bacterii Gram-negative

Administrare:
2 - 3 plicuri de două ori pe zi, timp de 3 zile consecutiv
Doza maximă zilnică şi doza maximă totală:
Doză zilnică: Streptomicină 6 000 000 UI, Ftalilsulfatiazol 6 g
Doză maximă pe durata întregului tratament: Streptomicină 18 000 000 UI, Ftalilsulfatiazol 18 g
Produsul se administrează oral, în apă sau înlocuitori de lapte. A se administra individual.

Timp de aşteptare:
Lapte: Produsul nu se va administra la iepele care produc lapte destinat consumului uman.





ANIMELOXAN
20 mg/ml
50 ml; 100 ml

LIVISTO

Substanţă activă:
Meloxicam 20 mg/ml

Indicaţii:
- ameliorarea inflamaţiei şi durerii în tulburările musculo-scheletice acute şi cronice
- ameliorarea durerii asociate colicilor

Administrare:
Doză: 3 ml/100 kg greutate corporală
Se administrează în doză unică, intravenos.

Timp de aşteptare: Carne şi organe: 5 zile



DEXAFAST 2 mg/ml
100 ml

LIVISTO

Substanţă activă:
Dexametazonă 2,0 mg/ml

Indicaţii:
- pentru tratamentul afecţiunilor inflamatorii sau alergice

Administrare:
Doză: 1-5 ml/50 kg greutate corporală

Timp de aşteptare: Lapte: Produsul nu se va administra la iepele care produc lapte destinat consumului uman.



DEXA-KEL 0,2%
50 ml

kela
focus on health

Substanţă activă:
Dexametazonă fosfat 2,64 mg/ml

Indicaţii:
- în procese inflamatorii non-infecţioase, în special inflamaţii acute musculo-scheletice, precum: artrite, periartrite, tendovaginite, bursite, luxaţii, miozite, osteite şi entorse
- ca medicaţie adjuvantă în bolile infecţioase acute în asociere cu terapia antiinfecţioasă corespunzătoare
- în condiţii alergice, precum: astm, afecţiuni alergice ale pielii, muşcături de şarpe
- inducerea parturiţiei în timpul ultimei perioade de gestaţie
- în tratamentul şocului şi stărilor de stres (colaps circulator, şoc anafilactic, traumatisme), toxiemia de gestaţie

Administrare:
Doză: 1-5 ml (intraarticular)/animal
Inflamaţii: 0,5-2 ml/100 kg greutate corporală



DEXAFORT
50 ml

MSD Animal Health

Substanţă activă:
Fiecare ml conţine:
Dexametazonă 2,67 mg (sub formă de dexametazonă fenilpropionat)
Dexametazonă 1,32 mg (ca fosfat de dexametazonă)

Indicaţii:
- pentru utilizarea ca agent antiinflamator şi antialergic

Administrare:
Doză: 0,02 ml produs/kg greutate corporală, intramuscular

Timp de aşteptare: Carne şi organe: 24 zile



KELAPROFEN 10 %
50 ml, 100 ml, 250 ml

kela
focus on health

Substanţă activă:
Ketoprofen 100 mg/ml

Indicaţii:
- ameliorarea inflamaţiei şi durerii asociate cu tulburările musculo-scheletice
- ameliorarea durerii viscerale asociate colicilor

Administrare:
Doză: 1 ml/45 kg greutate corporală
Administrare timp de 3-5 zile

Timp de aşteptare: Carne şi organe: 1 zi



NOVASUL
100 ml

richter pharma

Substanţă activă:
Metamizol sodic 500 mg

Indicaţii:
- tratamentul durerilor, spasmelor, febrei, în cazuri de colică
- obstrucţie esofagiană şi alte spasme, precum cele specifice organelor abdominale
- pareze
- afecţiuni reumatice ca artrita acută şi cronică, tendovaginita, nevritele şi nevralgiile

Administrare:
Doză: Cai adulţi: 20 - 50 ml
Mânji: 5 - 15 ml

Timp de aşteptare: Carne şi organe: (numai intravenos): 6 zile
Lapte: Produsul nu se va administra la iepele care produc lapte destinat consumului uman.

WELLICOX 50 mg/ml 100 ml



Substanţă activă:
Flunixin 50 mg/ml

Indicaţii:
- reducerea inflamaţiei şi durerii asociate tulburărilor musculo-scheletice
- reducerea durerii viscerale asociată colicii

Administrare:
Doză: 1 ml/50 kg greutate corporală

Timp de aşteptare: Carne şi organe: 10 zile
Lapte: Produsul nu se va administra la iepele care produc lapte destinat consumului uman.



pastă orală pentru cai

EQUIVERM® Duo

bioveta

Ivermectină, praziquantel

Compoziţie:
Substanţe active:
Ivermectină 20 mg
Pranziquantel 100 mg



Indicaţii:
- tratamentul bolilor parazitare produse de cestode, nematode sau artropode sensibile la acţiunea antiparazitară a Equiverm Duo pastă orală

Administrare:
Doză: 1 ml/100 kg greutate corporală
Administrare orală

Timp de aşteptare: Carne: 30 zile
Lapte: Produsul nu se va administra la iepele care produc lapte destinat consumului uman.





TOP SPOT ON
25 ml

Compoziţie:
Substanţă activă: Permetrină 650 mg
Substanţe auxiliare: Butilparaben 1 mg,
Butilhidroxianisol 0,2 mg,
Butilhidroxitoluen 0,1 mg

Indicaţii:
● utilizare terapeutică şi preventivă la cai, împotriva ectoparaziţilor (căpuşe, ţânţari, tăuni)

Administrare:
Doză: conţinutul unui aplicator (25 ml) este suficient pentru un cal de aproximativ 500 kg

Timp de aşteptare: Nu utilizaţi niciodată la caii a căror carne este destinată consumului uman.

PANACUR PASTĂ 24 g
10 seringi/cutie



Compoziţie:
Seringa de 24 g conţine 4,5 g fenbendazol

Indicaţii:
● deparazitarea internă a cabalinelor (tineret şi adulţi)

Administrare:
Doză: 7,5 mg/kg greutate corporală sau o seringă de 24 g pentru 600 kg greutate corporală

Timp de aşteptare: Carne: 5 zile

PANACUR 10%
1 Litru



Compoziţie:
Substanţă activă: Fenbendazol 100 mg/ml

Indicaţii:
● în tratamentul parazitozelor produse de stadii mature şi imature ale nematodelor tractului gastrointestinal sau respirator

Administrare:
Doză: 1 ml produs/13 kg greutate corporală, oral

Timp de aşteptare: Carne: 5 zile

VANBENDAZOL 300 mg/g
10 ml, 20 ml



Compoziţie:
1 g pastă orală conţine:
Substanţă activă:
Fenbendazol 300 mg
Benzoat de sodiu 1,2 mg
Excipienţi:
monopropilenglicol, carboximetilceluloză sodică, apă purificată

Indicaţii:
- în tratamentul profilactic (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) şi curativ al nematodozelor determinate de paraziţi sensibili la acţiunea substanţei active: (*Strongylus vulgaris, Strongylus equines, Strongylus edentatus, Trichonema* spp., *Cylicocyclus* spp., *Strongyloides westeri, Oxiuris equi, Parascaris equorum*)

Administrare:
Doză: 10 mg s.a./kg greutate corporală, o singură administrare:
- o seringă de 10 ml/animal cu greutate corporală de 300 kg
- o seringă de 20 ml/animal cu greutate corporală de 600 kg

Timp de aşteptare: Nu se administrează la cabalinele destinate consumului uman.

EQUIMOXIN 18,92 mg/g
14,8 g



Compoziţie:
Fiecare gram conţine:
Moxidectin 18.92 mg

Excipienţi:
Alcool benzilic (E 1519) 37,84 mg
Edetat disosic 0,265 mg
Butilhidroxitoluen (E321) max. 0,144 mg

Administrare:
Administrare orală în doză unică.
Doza recomandată este de 0,4 mg moxidectin/kg greutate corporală.
O diviziune la scară corespunde dozei recomandate pentru 50 kg greutate corporală.
Conţinutul unui aplicator este destinat unui cal cu o greutate de 700 kg greutate corporală.

Timp de aşteptare: Nu se administrează la cabalinele destinate consumului uman.

Indicaţii:
În infestaţiile cu paraziţi sensibili la moxidectin:

Strongili mari: *Strongylus vulgaris* (adulţi şi stadii arteriale), *Strongylus edentatus* (adulţi şi stadii viscerale), *Triodontophorus brevicauda* (adulţi), *Triodontophorus serratus* (adulţi), *Triodontophorus tenuicollis* (adulţi);
Strongili mici (adulţi şi stadii larvare intraluminale): *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp., *Cylicostephanus* spp,. *Cylicodontophorus* spp., *Gyalocephalus* spp.;
Ascarizi: *Parascaris equorum* (stadii adulte şi larvare);
Alte specii: *Oxyuris equi* (adulţi şi stadii larvare), *Habronema muscae* (adulţi), *Gasterophilus intestinalis* (L2, L3), *Gasterophilus nasalis* (L2, L3), *Strongyloides westeri* (adulţi), *Trichostrongylus axei*;
Împotriva strongililor mici, produsul are o eficacitate persistentă timp de două săptămâni. Excreţia ouălor strongililor mici este suprimată timp de 90 de zile.

ALVEGESIC VET 10 MG/ML

Butorfanol 1%, soluţie injectabilă sub formă de tartrat de butorfanol

DOZAJ	MOD DE ADMIN.	ANALGESIC	SEDATIV
Cai	IV	0,01 ml/kg greutate corporală	0,20 ml/100 kg greutate corporală



Sedare:
Se administrează Alvegesic la 5 minute după romfidină sau hidroclorură de detomidină

Recomandări:

Analgezic:
Pentru ameliorarea durerilor abdominale moderate până la severe (durere abdominală asociată cu colici de origine gastrointestinală)

Sedativ:
Pentru sedare după administrarea unor agonişti ai receptorilor alfa 2 adrenergici (detomidină, romifidină)

Infuzie continuă de butorfanol pentru analgezie la caii cu colică:
- Stres redus: Niveluri plasmatice de cortizol scăzute
- Impact redus: Limitarea pierderii în greutate
- Cost redus: Timp de spitalizare mai scurt

Sedativ în următoarele circumstanţe:
- Ca parte a premedicaţiei în asociere cu xilazină sau detomidină
- Prevenirea trezirii
- Efecte secundare în aceste situaţii: ataxie, mişcări ale capului



Proprietăţi:

- O sedare uşoară, profundă şi sigură
- Reducere foarte bună a durerii
- Fără efecte secundare
- Sinergie cu alte molecule
- Perioadă de aşteptare nulă

NALGOSED 10 mg/ml

Compoziţie:
1 ml preparat conţine 10 mg butorfanol



Indicaţii:

Analgezic: Atenuarea durerii abdominale uşoare până la intensive de natură gastrointestinală inclusiv colica.
Preparatul atenuează durerea provenită în legătură cu colica sau cu starea de naştere.
Sedativ: pentru sedare după administrarea andreno-receptorilor agonist alfa2 (detomidin hidroclorid, romifidin) stabilit.
Sedare în decursul procedurilor de tratament şi diagnosticare a animalului în picioare.

Administrare:
administrare strict intravenoasă (i.v.)

Ca şi analgezic:

butorfanol singur:
Aplicaţi în doză de 0,1 mg/kg g.v., ceea ce corespunde unei doze de 0,01 ml preparat/kg g. v., deci 1 ml/100 kg g.v. i.v.
Doza se poate repeta în funcţie de necesitate. Efectul analgezic intervine în decurs de 15 minute de la aplicare.

Ca şi sedativ:

butorfanol în combinaţie cu detomidina:
Aplicaţi detomidina clorhidrat în doză de 0,012 mg/kg g.v. i.v. Apoi după 5 minute aplicaţi butorfanol în doză de 0,025 mg/kg g.v., ceea ce corespunde unei doze de 0,0025 ml preparat/kg g.v., deci 0,25 ml preparat/100 kg g.v. i.v.

butorfanol în combinaţie cu romifidina:
Aplicaţi romifidina în doză de 0,04–0,12 mg/kg g.v. i.v. Apoi după 5 minute aplicaţi butorfanol în doză de 0,02 mg/kg g.v., ceea ce corespunde unei doze de 0,002 ml preparat/kg g.v., deci 0,2 ml preparat/100 kg g.v. i.v.





NARKAMON BIO 100 mg/ml
10 ml; 50 ml

Compoziţie (1 ml):
Substanţă activă:

Ketamină	100,0 mg
(sub formă de clorhidrat de ketamină)	115,4 mg

Indicaţii:
- anestezie generală de scurtă durată pentru diagnostic şi intervenţii terapeutice

Administrare:
Doză: 2 ml produs/100 kg greutate corporală pe cale i.v.

Timp de aşteptare:
Nu se va utiliza la cai şi măgari care produc lapte şi carne destinate consumului uman.



XYLAZIN BIO 2%
50 ml

Compoziţie (1 ml):
Substanţă activă:
Xilazină 20 mg (echivalent cu 23,31 mg xilazină clorhidrat)

Indicaţii:
- calmare şi miorelaxare
- în combinaţie cu alte substanţe pentru analgezie şi anestezie

Administrare:
XYLAZIN BIO 2% se administrează intravenos.
Doza: 3-6 ml/100 kg greutate vie (0,6-1 mg/kg greutate vie)

DOMOSEDAN
5 ml

Substanţa activă:
Detomidină clorhidrat 10,00 mg/ml

Indicaţii:
- utilizat pentru a facilita manipularea cailor în timpul consultaţiilor
- intervenţii chirurgicale minore sau alte intervenţii

Administrare:
A se administra intramuscular sau intravenos lent, la o doză de 0,1-0,8 mg detomidină/kg greutate corporală, în funcţie de gradul de sedare necesar.

Timp de aşteptare: Carne: 2 zile



ANIMEDAZON SPRAY



Spray cutanat, suspensie pe bază de clortetraciclină, de culoare albastră, utilizat în tratamentul leziunilor traumatice superficiale şi chirurgicale contaminate cu agenţi sensibili la clortetraciclină


Compoziţie: Clorhidrat de clortetraciclină 2,45% vol
Patent Blue V 85% (E 131) 0,23 g
Izobutan 92,2 g

Ambalaj: 211 ml

Administrare: Agitaţi bine recipientul înainte de pulverizare. Recipientul trebuie ţinut la o distanţă de aproximativ 15 - 20 cm de suprafaţa care urmează să fie pulverizată; pulverizaţi timp de 3 secunde, până când zona supusă tratamentului este colorată uniform.
Pentru informaţii complete cu privire la indicaţii de administrare, consultaţi prospectul produsului.

Indicaţii de utilizare la animale mari:

- Leziuni traumatice superficiale şi chirurgicale
- Infecţii superficiale ale pielii şi copitelor
- Dermatita digitală
- Dermatita interdigitală



PROTEGO SPRAY PUDRĂ



Sprayul pudră Protego® cu microgranule îngrijeşte local zonele cutanate foarte solicitate şi sensibile creând un strat protector (regiune interdigitală, suprafaţa internă a coapselor, suprafaţa articulaţiei jaretului, leziuni provocate în urma utilizării harnaşamentelor), iar pulverizat pe răni sau plăgi operatorii sprijină regenerarea rapidă a pielii (de ex. răni cutanate superficiale, castrări). Pe lângă acestea, dispune de efect analgezic şi hemostatic. De asemenea, oferă protecţie complementară împotriva iritaţiilor cauzate de muşte şi ţânţari.


Compoziţie: Oxid de zinc, stearat de calciu, ulei de oregano, ulei de muşeţel, ulei de arnică, ulei de arbore de ceai, ulei de gălbenele

Ambalaj: 400 ml

Administrare:
Agitaţi bine înainte de utilizare! Suprafaţa afectată trebuie curăţată cu grijă. Se pulverizează zilnic de 2 - 3 ori, de la 10 - 20 cm distanţă. Praful de pudră poate fi îndepărtat cu o cârpă uscată.

Indicaţii de utilizare la animale mari:

- Orice rană superficială de pe suprafaţa pielii (muşcături, zgârieturi, tăieturi)
- Plăgi şi iritaţii





ZINKOXID SPRAY
200 ml

cp-pharma

Substanţă activă:
Oxid de zinc praf 12 g

Indicaţii:
- acoperirea plăgilor superficiale
- protecţia plăgilor de murdărie
- stimularea epitelizării
- efect uşor astringent
- impregnarea bandajelor pentru a împiedica aderarea la piele
- protecţia pielii înainte de aplicarea bandajelor gipsate

Administrare:
Se pulverizează timp de 1 - 2 secunde asupra zonei afectate, de la o distanţă de 20 - 25 cm. Tratamentul se poate repeta, în caz de nevoie, de mai multe ori.



ALUMINIUM SPRAY
200 ml

cp-pharma

Substanţă activă:
Praf de aluminiu (micronizat) 6,270 g

Indicaţii:
- acoperirea rănilor superficiale
- protecţia rănilor de murdărie
- ajută la dermizare

Administrare:
Se proiectează un jet de Aluminium spray timp de 1-2 secunde asupra zonei afectate, de la 20-25 cm distanţă faţă de plagă. Tratamentul se poate repeta, în caz de nevoie, de mai multe ori pe zi.



ARTHRO GEL
100 ml

cp-pharma

Compoziţie:
Aloe barbadensis (Aloe vera), carbomer, mentol, ulei de mentă, *Rosmarinus officinalis* (unt de rozmarin), terpineol, apă

Indicaţii:
- leziuni ale articulaţiilor (pauze fibrilare, vânătăi, entorse, etc.)
- tratament adjuvant în inflamaţie articulară
- pentru animale de competiţie şi sport, ale căror ţesuturi conjunctive sunt utilizate intens

Administrare:
Aplicaţi de 1 - 2 ori pe zi.



CHARMIL SPRAY
100 ml

Compoziţie:
Ulei de cedru himalaian, ulei pongamia

Indicaţii:
- în tratamentul rănilor şi infecţiilor cutanate, având proprietăţi antibacteriene, antifungice, antiinflamatoare, antilarvare şi acaricide

Administrare:
Aplicaţi de 1-2 ori pe zi.



CHARMIL GEL
25 gr, 50 gr

Indicaţii:
- răni şi diverse afecţiuni cutanate
- tăieturi, zgârieturi, arsuri
- vindecarea rănilor postoperatorii
- tratarea laminitei, abceselor
- tratarea scabiei, furunculilor, herpesurilor

Compoziţie:
- produs naturist din medicina ayurvedică

Administrare:
- se aplică de 1 - 2 ori/zi pe zona afectată şi în jurul acesteia, după curăţare, până la vindecare

Fără timp de aşteptare la carne, organe şi lapte.

CHARMIL MULTIACTION SKIN PUMP SPRAY
100 ml



Compoziţie:
- *Cedrus deodara, Pongamia glabra, Azadirachta indica*

Indicaţii:
- tratamentul diferitelor tipuri de răni
- tratamentul infecţiilor cutanate
- plăgi postoperatorii

Administrare:
- se aplică zilnic pe zona afectată şi în jurul acesteia, după curăţare, până la vindecare

HERBA GEL
100 g, 500 g, 1 kg



Compoziţie:
100 g Herba-Gel conţine:
- 15 ml extract hidro-alcoolic (alcool izopropilic) de:
  - Iederă (Hedera helix);
  - Sunătoare (Hypericum perforatum);
  - Coada şoricelului (Achillea millefolium);
  - Tătăneasă (Symphytum officinale);
  - Muguri de plop (Populus nigra);
  - Jaleş de grădină (Salvia officinalis);
  - Gălbenele (Calendula officinalis);
  - Pătlagină (Plantago major);
  - Brusture (Arctium lappa);
- 5 g CAMFOR
- 2 g METIL SALICILAT
- adjuvanţi gelatinoşi până la 100 g

Indicaţii:
Herba-gel conţine un amestec de extracte vegetale cu proprietăţi revulsive şi calmante.
Datorită conţinutului în camfor şi metilsalicilat, diminuează rapid durerea, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină locală, favorizând absorbţia produselor inflamatorii.
Se indică ca gel revulsiv la animale de companie, cai de cursă, ca adjuvant în artrite, miozite, tendinite asociate cu sensibilitate crescută, nevralgii. În hematoame, contuzii, mastite asociat cu edem mamar patologic, în caz de necesitate asociat cu alte medicamente (antibiotice, antiinflamatorii - administrate parenteral)

Administrare:
Se aplică pe zonele afectate, masând zona pentru o mai bună penetrare a produsului. Se aplică de mai multe ori pe zi, până la vindecare.

RUMAK GEL
250 g



Compoziţie:
Camfor, extract de castane sălbatice, mentol, excipienţi.

Indicaţii:
Gel pentru cai cu efect de încălzire - răcire şi de relaxare, cu ingrediente naturale. Regenerează şi relaxează musculatura, tendoanele şi ligamentele.

În cazul traumatismelor recente ale muşchilor, tendoanelor şi articulaţiilor, cum ar fi echimoze, entorse, luxaţii, dureri reumatice.

Se poate utiliza şi după antrenamente intense sau după competiţii.

- *Extract de castane sălbatice*: stimulează circulaţia locală. Are efect benefic asupra sistemului circulator: tonifică şi repară venele şi capilarele lezate, fluidizează fluxul sanguin. Calmează durerile provocate de ulcere varicoase, degeraturi, fracturi şi entorse.

- *Camfor:* antireumatic, antifebril, antinevralgic, antiinflamator.

- *Mentol:* antiseptic, antiinflamator, antipruriginos, răcoritor asupra regiunilor pe care se aplică, calmant.

Administrare:
Gelul se masează uşor până când pătrunde în piele, la nivelul zonei afectate.

BUSOL 0,004 mg/ml
10 ml



Substanţă activă:
Buserelină 0,004 mg/ml

Indicaţii:
- inducerea ovulaţiei
- ameliorarea ratei de gestaţie

Administrare: i.m., i.v., s.c.
- inducerea ovulaţiei la iepele aflate la estru, dacă se administrează repetat la intervale de 12 ore: 5-10 ml/animal
- ameliorarea ratei de gestaţie dacă se administrează la 8-12 zile de la monta naturală /inseminarea artificială: 5-10 ml/animal

GENESTRAN 75 µg/ml
20 ml; 50 ml



Substanţă activă:
Cloprostenol-Na 75 µg/ml

Indicaţii:
- inducerea luteolizei la iepele cu un corp luteal funcţional

Administrare:
Doza este de 0,3 - 0,5 ml/animal, intramuscular

Timp de aşteptare: Carne şi organe: 1 zi

OESTROPHAN
2 ml, 10 ml



Substanţă activă:
Cloprostenol 0,25 mg/ml

Administrare:
Doza este de 1 ml/animal, intramuscular

Timp de aşteptare: Carne şi organe: 1 zi

Indicaţii:
- avort în caz de gestaţie normală şi patologică (în prima parte a gestaţiei)
- anestru postpartum şi postservice (călduri liniştite, ciclu neregulat, corp galben persistent, chişti luteali, endometrită cronică postpuerperală), piometru, întreruperea gestaţiei normale sau patologice (prima jumătate a gestaţiei)
- terapie combinată în cazul chiştilor foliculari (din ziua a 10-a, după tratamentul cu HCG sau LRH, după detecţia unui răspuns ovarian pozitiv)
- inducerea fătării

OXYTOCIN 5 UI/ml
50 ml



Substanţă activă:
Oxitocină: 5 UI/ml

Indicaţii:
- facilitarea parturiţiei
- stimularea involuţiei în caz de retenţie placentară şi exometru
- pentru eliminarea conţinutului patologic al uterului
- endometrită, piometru
- agalaxie
- pentru eliminarea laptelui rezidual

Administrare:
Atonie uterină: 20 – 40 UI (i.m. sau s.c.), 2,5 – 10 UI (i.v.)
Retenţie placentară: 10 – 20 UI (i.m. sau s.c.)
Eliminarea laptelui, involuţie uterină: 40 UI (i.m. sau s.c.), 10 UI (i.v.)



CALMIX PASTE
60 ml



ROYAL İLAÇ

Indicaţii:
- reduce tonusul muscular
- calmează ritmul cardiac
- calmează sistemul nervos

Compoziţie:
L-triptophan 100,000 mg
Conservanţi (mg/kg): sorbat de potasiu 1.000 mg
Vitamine (mg,mcg/kg): vitamina B1 3.500 mg, vitamina B6 907 mg, vitamina B12 2,500 mcg, niacină 3,666 mg
Elemente analitice: fibre 0%, proteine 10%, ulei 0%, cenuşă 4,04%, sodiu (Na) 0%, apă pură 82,74%, ciclamat de sodiu 2,000 mg, magneziu (Mg) 2,166 mg

Administrare:
- pentru cai adulţi, cu 50 ml de apă, cu 1 - 2 ore înainte de competiţie, antrenament sau transport
- în caz de nevoie, se pot administra 3 seringi pe zi
- cai mici şi ponei (greutate: 300 - 400 kg) (ca supliment pentru mânji) 25 ml cu 1 - 2 ore înainte de antrenament

ELECTRO LIQUID
1 L



ROYAL İLAÇ

Compoziţie:
minerale, vitamine, sodiu, potasiu, magneziu şi calciu

Indicaţii:
- furaj complementar pentru cai, destinat asigurării necesarului de vitamine, sodiu, potasiu, magneziu şi calciu, în condiţii meteorologice extreme
- antrenamente, curse, transport şi diferişi factori de stres

Administrare:
Fiecare doză de 50 ml se adaugă la 1 litru apă şi se administrează deasupra limbii, cu ajutorul unei seringi sau sonde nazale. Aveţi grijă la căile respiratorii.
- cai adulţi: 30 minute de antrenament uşor: 80 - 100 ml/zi/animal
  30 - 60 minute de antrenament: 100 - 120 ml/zi/animal
- antrenamente riguroase, post-cursă, transpiraţie intensivă şi diaree: 100 - 150 ml/zi/animal
- mânji: 30 - 40 ml/zi/animal

În cazul diareei şi a pierderii de lichide, doza se poate repeta de două ori pe zi, în urma recomandărilor unui medic veterinar.





JOINT SOLUTION
1 L

ROYAL İLAÇ

Compoziţie:

Componente analitice

Fibre	0%
Proteine	1%
Ulei	0%
Cenuşă	0%
Sodiu (Na)	0%
Apă pură	71,79%

Alte compenente nutritive

Lizină	10.000 mg
Conservant	
Sorbat de potasiu	1.000 mg
Acid citric	3.000 mg
Vitamine	
Vitamina C	43.000 mg

Alte componente

Glucozamină sulfat de potasiu	166.000 mg
Metilsulfonilmetan	116.000 mg
Sulfat de condroitină	83.000 mg
Acid hialuronic	22 mg
Extract *Yucca schidgera*	16.000 mg
Boswella serrata	2.000 mg

Indicaţii:

• se foloseşte pentru protejarea şi susţinerea sănătăţii articulaţiilor la cai

Administrare:

• cai activi şi cu articulaţii slăbite: - timp de o săptămână - 25 ml de două ori pe zi
- după o săptămână - 25 ml pe zi, timp de 4 luni

Se recomandă folosirea directă pe limbă sau ca aditiv în furaj.

• pentru mânji şi cai mici, se recomandă administrarea a 25 ml/zi





AFANIL
100 ml

Compoziţie:
Extracte din plante şi uleiuri volatile carminative

Indicaţii:
- coterapie în impactarea fecală (constipaţie cauzată de către o masă fermă de fecale stagnantă în porţiunea distală a colonului sau în rect)

Administrare:
Doza: 50 ml
Administrare de 2 ori pe zi, timp de 2 zile

MENBUTIL 100 mg/ml
100 ml



Substanţă activă:
Menbutonă 100,0 mg/ml

Indicaţii:
- stimularea activităţii hepato-digestive în cazul tulburărilor digestive şi insuficienţei hepatice

Administrare:
Doza: 1 ml/20 - 40 kg greutate corporală

Fără timp de aşteptare la carne, organe şi lapte.

TYMPANOL
2 x 25 ml



Substanţă activă:
Polidimetilsiloxan activat 85 mg/g

Indicaţii:
- sindrom de colici, cauzat de acumulările de gaz
- în cazul intoxicaţiei cu preparate spumogene

Administrare:
25 ml la 3 - 5 litri de apă

YEABIS
1 kg, 10 kg



Compoziţie/kg:
Aditivi: *Saccharomyces cerevisiae*: 6 x 10^{11} UFC
Conservanţi: propionat de calciu (E282) 0,0225 mg
Substanţe aromatice: amestec de substanţe aromatice 0,9 mg.
Agent antiaglomerare: silicon precipitat şi uscat (E551a) 31,5 mg
Altele: pulbere de Yucca Schidigera, cristobalit, acid fulvic (din industria apei de băut), calcar din colonii de corali marini *(Maerl)*
Carrier: fainã de grâu

Administrare:
Doza: 5 kg/t furaj

Indicaţii:
● amestec complex din produse de origine naturală: drojdii vii (*Saccharomyces cerevisiae*) şi sursă de minerale cu biodisponibilitate crescută, cu rol în stabilizarea pH-ului, fixarea amoniacului şi îmbunătăţirea digestiei

RUCHAMAX
15 g, 1 kg



Compoziţie:
Acorus calamus, Allium sativum, Andrographis paniculata, Azadiracta indica, Balanites roxburghii, Curcuma longa, Calotropis procera, Centratherum anthelminticum, Commiphora mukul, Embeliaribes, Eclipta alba, Gardenia gummifera, Piper nigrum, Piper longum, Picrorrhiza kurroa, Phyllanthus emblica, Swertia alata, Semecarpus anacardium, Trachyspermum ammi, Trigonella foenum-graecum, Tinospora cordifolia, Terminalia chebula, Woodfordia fruticosa, Zingiber officinale, Kasisa, Narasara, Saindhava lavana, Tuuha

Indicaţii:
● inapetenţă, dispepsie, apetit diminuat, digestie încetinită, debilitate, convalescenţă
● indicat ca tonic general

Administrare:
Doza: cabaline: 15 g
mânji: 5 - 7 g



CUM ESTE **DIAGNOSTICAT** „OCHIUL USCAT”?

- Semnele clinice pot varia, iar simptomele pot fi ușoare până la severe, în funcție de stadiul bolii
- Ambii ochi sunt de obicei afectați
- Dacă medicul veterinar suspectează OCHI USCAT, atunci va efectua un test - acest test este Schirmer Tear care măsoară cantitatea de lacrimi pe care ochiul o produce. Un rezultat slab indică OCHI USCAT și necesită tratament
- Acest test implică introducerea unor fâșii de hârtie în interiorul pleoapei inferioare a câinelui și este de obicei bine tolerat de majoritatea pacienților.



Tested Schirmer Tear

CUM ESTE **TRATAT** „OCHIUL USCAT”?

Veterinarul dumneavoastră vă va prescrie picături pentru ochi

Unguent pentru ochi cu ciclosporină - se aplică de obicei de două ori pe zi pe ochi. Acest medicament esențial împiedică sistemul imunitar să atace țesutul lacrimal și are ca scop inversarea stării.
Dacă are succes, tratamentul cu acest medicament este pe viață - dacă medicamentul este oprit, sistemul imunitar va începe din nou să distrugă țesutul lacrimal.

Produse de curățare a ochilor - îndepărtarea acumulării de crustă și a secrețiilor care se observă frecvent la acești pacienți este benefică.
Câinele tău se va simți mai confortabil și va ajuta la aplicarea picăturilor medicamentate pentru ochi.

Picături pentru ochi pentru înlocuirea lacrimilor - acestea au scopul de a menține ochiul lubrifiat și de a preveni uscarea acestuia. Un ochi uscat este iritant și dureros și poate duce la deteriorarea corneei.
Înlocuirile lacrimale sunt utilizate frecvent inițial și apoi pot fi reduse sau oprite, dacă funcția glandei lacrimale este redobândită cu picături de ciclosporină. Dacă boala este depistată prea târziu, atunci ciclosporina poate să nu fie eficientă în inversarea modificării induse în țesutul lacrimal - în acest moment, înlocuitorii lacrimali pot deveni singura modalitate de a ajuta medical un ochi uscat.

Picături pentru ochi antibiotice - pot fi utilizate dacă este prezentă o infecție bacteriană secundară.

OCRYL

Soluție oftalmică special creată pentru curățarea ochilor și a ariei perioculare, îndepărtând crustele și secrețiile, reducând colorarea cauzată de petele lacrimale.

Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	Flacon 135 ml
Utilizare	La nevoie

- Îndepărtează crustele și secrețiile din ochi, din sacul conjunctival și din regiunea periorbitală
- Crustele și secrețiile pot acționa ca sursă de proliferare bacteriană
- Pregătirea regiunii periorbitale înaintea aplicării altor unguente sau soluții oftalmice
- Reduce colorarea provocată de lacrimi

INDICAȚII:
- Curățare și reducerea petelor lacrimale



Pete lacrimale:

Faza de atac – aplicați Ocryl folosind o dischetă de bumbac de 1-2 ori pe zi până la dispariția petelor

Faza de menținere – aplicați Ocryl folosind o dischetă de bumbac de 1-2 ori pe săptămână



Compoziție:

- Clorură de benzalconiu
- Albastru de metilen
- Ulei de trandafir
- Acid boric
- Borat de sodiu

- Același pH ca și lacrima
- Dozator optim și precis
- Valabilitate mare de utilizare
- Vârf dozator atraumatic

Clorura de benzalconiu: dezinfectează conjunctivita și prin proprietățile hidroabsorbante cresc concentrarea de substanțe nutritive la nivel cornean

Albastru de metilen: antiseptic

Acidul boric și **boradul de sodiu**: antiseptice și astringente

Ulei de trandafir: revitalizant

OCRY-GEL

CARBOPOL 980 NF

Gel pe bază de carbomer pentru lubrefierea și hidratarea corneei.

Compoziție	Carbopol 980 NF și Cetrimidă
Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	1 x 10g tub
Utilizare	1-2 picături la nevoie

- Carbopol 980 NF este un polimer hidrodispersabil capabil să rețină apa de 500 de ori mai multă decât propria greutate.

INDICAȚII:
- Anestezie generală
- Terapia de substituție în cazul deficitului de film lacrimal - ochi uscat

- tub cu vârf ergonomic
- proprietăți bioaderente și lubrefiante
- are același pH și osmolaritate ca și filmul lacrimal
- nu rămân urme albe după utilizare



TWELVE

ACID HIALURONIC , VITAMINA B12, FACTORI MINERALI TROFICI

Aplicații locale de factori implicați în multiplicarea celulară.

Compoziție	Acid hialuronic, vitamina B12, factori minerali trofici incluzând Mg^{2+} și Ca
Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	Flacon 1 x 10 ml
Utilizare	1-2 picături de 2 ori pe zi

- Menține umiditatea corneei
- Timp lung de valabilitate după prima deschidere (60 zile)

INDICAȚII:
- Cel mai bun suport pentru multiplicarea celulară



Cianocobalamina (Vitamina B12) este un factor esențial în multiplicarea celulară. Este implicată în sinteza de proteine și acizi nucleici. Este de asemenea implicată în procesul fiziologic anti radicali liberi.

Factorii mineral trofici joacă un rol important în reacția biochimică intracelulară în timpul unei activități intense ca multiplicarea sau faza de vindecare.

Acidul hialuronic este un constituent natural al filmului lacrimal. Îmbunătățește aderența lacrimală pe suprafața epiteliului corneal. Acidul hialuronic are de asemenea proprietăți lubrefiante și hidratante prin abilitatea lui de a se combina cu un număr crescut de molecule de apă.



FLUODROP

CORNEAL FOCUSRANGE
SEE THINGS MORE CLEARLY

FLUORESCEINĂ

Colorant lipsit de activitate farmacologică a cărui culoare se modifică în funcție de pH.

Compoziție	0.5%
Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	Cutie cu 10 x 0,4 ml fiole
Utilizare	1-2 picături per ochi

Avantajele soluției 0.5% 0.4 ml:

- Reduce "suprainundarea" ochiului cu fluoresceină
- Ajută la reducerea disconfortului



INDICAȚII:

- Vizualizare stromei corneene și a celulelor epiteliale afectate

UTILIZAT PENTRU:

- Observarea ulcerațiilor corneene
- Observarea permeabilității canalului nazo-lacrimal (testul Jones)
- Ajută la măsurarea TFBUT (timpul de rupere al filmului lacrimal)
- Observare scurgerii umoarei apoase prin perforația corneei (testul Seidal)

CLERAPLIQ

Direcționare inovatoare a matricei RGTA pentru a ajuta la refacerea și regenerarea matricei extracelulare a corneei.

Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	5 unități sterile unidoză de 0,33 ml
Utilizare	1-2 picături de 2-3 ori pe săptămână (la fiecare 2-3 zile)

- Fără conservanți
- Conține RGTA, un analog de sulfat de heparan - care nu este descompus de heparanaze naturale

INDICAȚII:

- Ajută la refacerea și regenerarea matricei extracelulare a corneei





DIAROAK
30 g, 1 kg, 15 kg



Compoziţie:
Caolin, *Tinospora cardifolia, Holarrhena antidysenterica, Punica granatum, Cyperus rotundus, Acacia catechu, Aegle marmelos, Woodfordia fruticosa, Polygonum aviculare, Berberis aristata, Andrographis paniculata, Symplocos paniculata, Zingiber officinale, Salmalia malabarica*

Indicaţii:
- în diareea de înţărcare
- în perioadele de risc crescut în producţie, ca de exemplu: în caz de boală, schimbarea furajului, relocare, înţărcare, medicaţie etc.
- diaree de origine specifică şi nespecifică
- previne pierderea de apă şi nutrienţi
- îmbunătăţeşte funcţia sistemului digestiv
- optimizează rata de conversie a furajului
- adsoarbe toxinele şi ajută la excreţia lor
- reface mucusul de pe tractul digestiv şi vilii intestinali
- protejează microflora intestinală

Administrare:
Cabaline: 30 g
Mânji: 10 - 15 g
Se administrează de 2 ori pe zi. În cazuri severe, doza se repetă la 6 ore.
Produsul se amestecă bine cu o cantitate de aproximativ 5 ori mai mare de apă, iar suspensia omogenă obţinută se administrează oral.



TOXYBIS FIX
25 KG

Compoziţie:
Inhibitori de micotoxine: Bentonită 1m558
Agenţi lianţi şi antiaglomeranţi: Bentonită 1m558i; Clinoptiolită 1g568; Sepiolită E562; Kiselgur E551c; Siliciu coloidal E551b
Substanţe suport: Drojdie de bere, Produse în drojdie, Făină de alge marine, Alge (Ulva spp., Solieria chordalis) q.s.p.


Indicaţii
ToxyBis FIX este un inhibitor de micotoxine utilizat pentru a realiza decontaminarea furajelor. Se va evita utilizarea orală simultană cu macrolidele.
Bentonita, o componentă majoră din ToxyBis FIX®, are o capacitate de legare cu Aflatoxina B1 de peste 90%. Micotoxinele sunt captate şi fixate selectiv, absorbţia vitaminelor şi mineralelor nefiind compromisă sau afectată.

Administrare
Se adaugă omogen în furaj de la 0,5 kg până la 2,5 kg pe tona de furaj complet, în funcţie de nivelul de contaminare cu micotoxine.

ORIGINAL XPC®

Diamond V

Produs natural obţinut prin fermentarea *Saccharomyces cerevisiae*, utilizat pentru creşterea imunităţii şi sănătăţii animalelor, incorporabil în toate tipurile de raţii furajere.



Imunitate

Digestie

Creştere şi Performanţă

Administrare:

- **Mânji: 3,5 g/animal**
- **Iepe/armăsari: 14 g/animal**
- **Cai de expoziţie/performanţă: 14 g/animal**
- **Cai în vârstă: 14 g/animal**
- **Cai de povară: 28 g/animal**






MT.X+
25 kg

Compoziţie:
Bentonită - 1m558i
Kieselgur - E551c
Drojdii
Compuşi aromatizanţi

Indicaţii:
- îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi economice

Administrare:
- Micotoxicoză subacută: 1 kg/t furaj
- Micotoxicoză acută: 1,5 - 2 kg/t furaj





MINERAL BLOCK
5 kg, 10 kg

ROYAL İLAÇ

Compoziţie:
Mangan, cobalt, zinc, cupru, fier, seleniu, iod, sodiu, magneziu, calciu

Indicaţii:
● echilibrează deficienţele de sare şi minerale comune la toate categoriile de vârstă

Administrare:
Plasaţi blocurile în apropierea surselor de apă, în număr suficient, pentru a preveni aglomerarea animalelor în jurul lor. Se lasă la consum *ad libitum*. Rata de consum iniţială este mai ridicată, dar va scădea în câteva zile, după perioada de acomodare.



SELCO BLOCK
5 kg, 10 kg

ROYAL İLAÇ

Compoziţie:
Mangan, cobalt, zinc, cupru, fier, seleniu, iod, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, sodiu, magneziu, fosfor, calciu

Indicaţii:
● asigurarea necesarului de vitamine şi minerale tineretului în creştere
● ajută dezvoltarea scheletului şi previn rahitismul
● asigură funcţionarea optimă a musculaturii, prevenind boala muşchilor albi
● previne inflamaţia/congestia intestinală

Administrare:
Plasaţi blocurile în apropierea surselor de apă, în număr suficient, pentru a preveni aglomerarea animalelor în jurul lor. Se lasă la consum *ad libitum*. Rata de consum iniţială este mai ridicată, dar va scădea în câteva zile, după perioada de acomodare.





INTROVIT
100 ml

Compoziţie:
Vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, D-pantenol, nicotinamidă, acid folic, biotină, clorhidrat de colină, aminoacizi

Indicaţii:
- prevenirea sau tratamentul deficitului de vitamine sau aminoacizi
- prevenirea sau tratamentul stresului (determinat de vaccinare, transport, umiditate ridicată, diferite afecţiuni, temperaturi ridicate sau modificări extreme de temperatură)
- îmbunătăţirea conversiei furajelor

Administrare:
Doza: 10 -15 ml produs/animal
Mânji: 5 -10 ml produs/animal





VL CAL ACTION MIX
20 kg

Compoziţie:

Fulgi de orz, fulgi de porumb, tărâţe de grâu, ovăz, lucernă, tărâţe de porumb, seminţe de in, seminţe de floarea-soarelui, melasă din trestie de zahăr, boabe de soia (produse din soia modificată genetic), orz, gluten de grâu, seminţe oleaginoase, furaj din sâmburi de palmier, carbonat de calciu, fructo-oligozaharide, clorură de sodiu, furaj din boabe de soia (produs din soia modificată genetic), ulei de soia

Componente analitice:

Proteină brută 11,0 %, grăsime brută 3,0 %, cenuşă brută 7 %, fibră brută 10,5 %, zaharuri 5,0 %, amidon 29,5 %, calciu 1,00 %, magneziu, 0,30 %, fosfor 0,60 %, sodiu 0,30 %

Aditivi:

Aditivi nutriţionali: vitamina A 12500 UI, vitamina D3 2500 UI, vitamina E 200 mg, biotină 200 µg, clorură de colină 160 mg, fier (sulfat de fier, monohidrat) 75 mg, iod (iodat de calciu, anhidru) 1,25 mg, cobalt (carbonat de cobalt (II) granulat acoperit) 0,3 mg, cupru (sulfat de cupru, pentahidrat) 30 mg, mangan (sulfat de mangan, monohidrat) 115 mg, zinc (oxid de zinc) 115 mg, seleniu (selenit de sodiu) 0,4 mg

Indicaţii:

- amestec de cereale, ideal pentru caii de concurs activi, angajaţi în munca uşoară



VL CAL ENDURIX
20 kg

Compoziţie:

Ovăz, grâu, porumb expandat, orz expandat, grâu expandat, seminţe de in, ulei de soia, seminţe de floarea-soarelui, melasă din trestie de zahăr, boabe de soia, lucernă, fulgi din boabe de fasole, orz, ulei din seminţe sfărâmate, clorură de sodiu, drojdie de bere, gluten din porumb, carbonat de calciu, fructo-oligozaharide.

Componente analitice:


Proteină brută 12,5%, grăsime brută 7,5%, cenuşă brută 6,5%, fibră brută 9,5%, calciu 0,8%, magneziu 0,30%, fosfor 0,60%, sodiu 0,45%, amidon 27,5%, zaharuri 4,5 %

Aditivi:

Aditivi nutriţionali: Vitamina A 10500 UI, vitamina D3 1500 UI, vitamina E 350 mg, vitamina B1 12 mg, vitamina B2 13 mg, D-pantotenat de calciu 25 mg, vitamina B6 2,5 mg, vitamina B12 0,03 mg, biotină 200 µg, clorură de colină 260 mg, fier (sulfat de fier monohidrat) 50 mg, iod (iodat de calciu, anhidru) 1,25 mg, cobalt (carbonat de cobalt (II) granulat acoperit) 0,30 mg, cupru (sulfat de cupru pentahidrat) 20 mg, trihidroxiclorură dicuprică 6 mg, mangan (sulfat de mangan, monohidrat) 110 mg, mangan (chelat de mangan al glicinei hidrat) 15 mg, zinc (sulfat de zinc, monohidrat) 95 mg, zinc (hidroxid de clorură de zinc monohidrat) 15 mg, L-selenometionină 0,20 mg, seleniu (selenit de sodiu) 0,24 mg

Indicaţii:

- furaj pentru cai de concurs care efectuează exerciţii de formare pe distanţe lungi; de exemplu: antrenamente de dresaj, militare, de rezistenţă etc.



VL CAL MIX TRADITION
20 kg

Compoziţie:

Fulgi de orz, tărâţe de grâu, lucernă, tărâţe de porumb, seminţe de floarea-soarelui furaj, fulgi de porumb, melasă din trestie de zahăr, sâmburi de palmier presaţi, orz, gluten de grâu, ulei de seminţe sfărâmate, carbonat de calciu, boabe de soia (produse din soia modificată genetic), clorură de sodiu, ulei de soia, furaj de soia (produs din soia modificată genetic), ulei de palmier, fructo-oligozaharide.

Componente analitice:

Proteină brută 12%, grăsime brută 2,5%, cenuşă brută 7,5%, fibră brută 10,5%, zaharuri 5,5%, amidon 28,5%, calciu 1,15%, magneziu 0,35%, fosfor 0,65%, sodiu 0,25%

Aditivi:


Aditivi nutriţionali: vitamina A 12500 UI, vitamina D3 2500 UI, vitamina E 100 mg, biotină 200 µg, clorură de colină 160 mg, fier (sulfat de fier, monohidrat) 75 mg, iod (iodat de calciu, anhidru) 1,25 mg, cobalt (carbonat de cobalt (II) granulat acoperit) 0,30 mg, cupru (sulfat de cupru, pentahidrat) 30 mg, mangan (sulfat de mangan, monohidrat) 115 mg, zinc (oxid de zinc) 115 mg, seleniu (selenit de sodiu) 0,40 mg

Indicaţii:

- mix de ingrediente esenţiale pentru o raţie echilibrată. Tradition Mix este un furaj combinat ce conţine toate elementele nutriţionale necesare pentru raţia unui cal. Nu conţine ovăz.

Administrare:

Cai în repaus: 0,5 până la 0,7 kg/100 kg greutate corporală/animal, zilnic
Cai utilizaţi la muncă uşoară (4 până la 6 ore pe săptămână, nivel scăzut): 0,6 până la 0,8 kg/100 kg greutate corporală, zilnic
Cai utilizaţi la munci uşoare, în mod regulat (5 până la 8 ore pe săptămână, nivel mediu): 0,7 până la 1,0 kg/100 kg greutate corporală, zilnic



VL CAL JUNIORIX
20 kg

Compoziţie:

Ovăz, tărâţe de grâu, fulgi de orz, pleavă din seminţe de in, porumb expandat, orz expandat, tărâţe de porumb, seminţe de floarea soarelui furaj, melasă din trestie de zahăr, furaj din sâmburi de palmier, boabe de soia prăjite, orz, clorură de sodiu, fructo-oligozaharide, ulei de palmier, ulei de soia.

Componente analitice:

Proteină brută 12,5%, grăsime brută 4,5%, cenuşă brută 7,5%, fibră brută 11%, zaharuri 4,0%, amidon 24,0%, calciu 1,0%, magneziu 0,35%, fosfor 0,65%, sodiu 0,25%

Aditivi:

Aditivi nutriţionali: vitamina A 25000 UI, vitamina D3 2500 UI, vitamina E 425 mg, biotină 310 µg, clorură de colină 250 mg, fier (sulfat de fier, monohidrat) 115 mg, iod (iodat de calciu, anhidru) 1,6 mg, cobalt (carbonat de cobalt (II) granulat acoperit) 0,43 mg, cupru (sulfat de cupru pentahidrat) 74 mg, cupru (chelat de cupru al glicinei hidrat) 15 mg, mangan (sulfat de mangan monohidrat) 200 mg, mangan (chelat de mangan al glicinei hidrat) 15 mg, zinc (sulfat de zinc, monohidrat) 203 mg, zinc (chelat de zinc al glicinei hidrat) 20 mg, seleniu (selenit de sodiu) 0,75 mg, seleniu (L selenometionină) 0,20 mg

Indicaţii:

- destinat cailor tineri în plină dezvoltare, pentru o creştere echilibrată
- un furaj combinat, pentru caii tineri cu vârste cuprinse între 1 şi 3 ani



VL CAL TRADITION PELLET 20 kg

Compoziţie:

Tărâţe de grâu, lucernă, orz, tărâţe de porumb, grâu, tărâţe de secară, boabe de soia (produse din soia modificată genetic), extract din sâmburi de palmier, melasă din trestie de zahăr, carbonat de calciu, seminţe de floarea-soarelui, clorură de sodiu, ulei de soia, ulei de palmier, preparat din soia (produs din soia modificată genetic), fructo-oligozaharide

Componente analitice:

Proteină brută 13,5%, grăsime brută 3,0%, cenuşă brută 7,5%, fibră brută 12,5%, zaharuri 4%, amidon 21%, calciu 1,10%, magneziu 0,35%, fosfor 0,60%, sodiu 0,25%

Aditivi:

Aditivi nutriţionali: vitamina A 15000 UI, vitamina D3 1500 UI, vitamina E 200 mg, vitamina B1 3 mg, vitamina B2 3 mg, biotină 100 µg, clorură de colină 90 mg, fier (sulfat de fier, monohidrat) 40 mg, iod (iodat de calciu, anhidru) 0,20 mg, cobal (carbonat de cobalt (II) granulat acoperit) 0,10 mg, cupru (sulfat de cupru, pentahidrat) 40 mg, mangan (sulfat de mangan, monohidrat) 100 mg, zinc (sulfat de zinc, monohidrat) 100 mg, seleniu (selenit de sodiu) 0,40 mg

Indicaţii:

- hrană ideală pentru caii aflaţi în repaus sau pentru caii utilizaţi la munci uşoare

Administrare:

Se administrează în plus faţă de fânul administrat din abundenţă şi/sau hrana limitată de pe păşuni şi/sau cantitatea limitată de materie primă

Cai în repaus: 0,5 până la 0,7 kg per 100 kg greutate corporală per animal, zilnic.

Cai utilizaţi la muncă uşoară (4 până la 6 ore pe săptămână, nivel scăzut): 0,6 până la 0,8 kg per 100 kg greutate corporală, zilnic

Cai utilizaţi la munci uşoare, în mod regulat (5 până la 8 ore pe săptămână, nivel mediu): 0,7 până la 1,0 kg per 100 kg greutate corporală, zilnic



VL CAL PERFORMIX 20 kg

Compoziţie:

Fulgi de orz, ovăz, grâu, seminţe de in, porumb expandat, tărâţe de grâu, orz expandat, seminţe de floarea-soarelui, melasă din trestie de zahăr, gluten de grâu, boabe de soia (produse din soia modificată genetic), tărâţe de porumb, tărâţe de ovăz, ulei de soia, ulei din seminţe mărunţite, carbonat de calciu, gluten din porumb, clorură de sodiu, furaj din sâmburi de palmier, fructo-oligozaharide, ulei de palmier

Componente analitice:

Proteină brută 11%, grăsime brută 4,5%, cenuşă brută 7%, fibră brută 9,5%, zaharuri 4,5%, amidon 31,5%, calciu 0,9%, magneziu 0,30%, fosfor 0,60%, sodiu 0,30%

Aditivi:

Aditivi nutriţionali: Vitamina A 15000 UI, vitamina D3 3000 UI, vitamina E 350 mg, biotină 240 µg, clorură de colină 190 mg, fier (sulfat de fier, monohidrat) 90 mg, iod (iodat de calciu, anhidru) 1,50 mg, cobalt (carbonat de cobalt (II) granulat acoperit) 0,36 mg, cupru (sulfat de cupru, pentahidrat) 36 mg, cupru (chelat de cupru al glicinei hidrat) 9 mg, mangan (sulfat de mangan, monohidrat) 140 mg, mangan (chelat de mangan al glicinei hidrat) 9 mg, zinc (oxid de zinc) 140 mg, zinc (chelat de zinc al glicinei hidrat) 12 mg, seleniu (selenit de sodiu) 0,48 mg, seleniu (L-selenometionină) 0,12 mg

Aditivi zootehnici: Saccharomyces cerevisiae

Indicaţii:

- furaj adecvat pentru caii de concurs activi/pentru caii activi, care sunt angajaţi în diferite activităţi intensive



VL CAL PIANISSIMO 20 kg

Compoziţie:

Seminţe de in, fulgi de orz, tărâţe de grâu, porumb expandat, orz expandat, melasă din trestie de zahăr, tărâţe de porumb, seminţe de floarea-soarelui, seminţe de in, gluten de grâu, ulei de soia, ulei de seminţe zdrobite, carbonat de calciu, boabe de soia (produse din soia modificată genetic), tărâţe, clorură de sodiu, furaj din sâmburi de palmier, fructo-oligozaharide, ulei de palmier

Componente analitice:

Proteină brută 10,5%, grăsime brută 4,0%, cenuşă brută 7%, fibră brută 13,5%, zaharuri 4,5%, amidon 27,5%, calciu 0,85%, magneziu 0,35%, fosfor 0,60%, sodiu 0,30%

Aditivi:

Aditivi nutriţionali: Vitamina A 12500 UI, vitamina D3 2500 UI, vitamina E 200 mg, biotină 200 µg, clorură de colină 160 mg, fier (sulfat de fier, monohidrat) 75 mg, iod (iodat de calciu, anhidru) 1,25 mg, cobalt (carbonat de cobalt (II) granulat acoperit) 0,30 mg, cupru (sulfat de cupru pentahidrat) 30 mg, cupru (chelat de cupru al glicinei hidrat) 9 mg, mangan (sulfat de mangan monohidrat) 115 mg, mangan (chelat de mangan al aminoacizilor, hidrat) 9 mg, zinc (oxid de zinc) 115 mg, zinc (chelat de zinc al glicinei hidrat) 12 mg, seleniu (selenit de sodiu) 0,40 mg, seleniu (L-selenometionină) 0,12 mg

Indicaţii:

- destinat cailor predispuşi la stres şi dificil de manipulat



VL CAL SUPERFORCE 20 kg

Compoziţie:

Constituenţi analitici:

Proteină brută 12,5%, grăsime brută 6%, cenuşă brută 6,5%, fibră brută 9,0%, zaharuri 4,0%, amidon 32,0%, calciu 0,70%, magneziu 0,3%, fosfor 0,60%, sodiu 0,45%

Aditivi nutriţionali:

Vitamina A 10500 UI, vitamina D3 1500 UI, vitamina E 350 mg, vitamina B1 12 mg, vitamina B2 13 mg, D-pantotenat de calciu 25 mg, vitamina B6 2,50 mg, vitamina B12 0,03 mg, biotină 200 µg, clorură de colină 260 mg, fier (sulfat de fier, monohidrat) 50 mg, iod (iodat de calciu, anhidru) 1,25 mg, cobalt (carbonat de cobalt (II) granulat acoperit) 0,30 mg, cupru (sulfat de cupru pentahidrat) 20 mg, cupru (trihidroxiclorură dicuprică) 6 mg, mangan (sulfat de mangan monohidrat) 113 mg, mangan (chelat de mangan al glicinei hidrat) 15 mg, zinc (sulfat de zinc, monohidrat) 95 mg, zinc (hidroxid de clorură de zinc monohidrat) 15 mg, seleniu (selenit de sodiu) 0,24 mg, seleniu (L-seleno-metionină) 0,20 mg

Aditivi zootehnici: Saccharomyces cerevisiae

Indicaţii:

- hrană de sport ideală pentru cai activi de competiţie (sărituri, curse de viteză)

Administrare:

Amestecaţi întotdeauna Superforce cu fân suficient (cel puţin 5 kg).
Cantitate zilnică pe animal:

- pentru antrenament şi competiţie: 0,800 kg la 100 kg greutate corporală
- pentru muncă uşoară: 0,600 kg la 100 kg greutate corporală

În repaus, aceste raţii trebuie reduse la jumătate.



VL CAL FIBERFORCE 15 kg

Compoziţie:
Ingrediente analitice:
Coji de seminte de in, tulpini de lucernă, lucernă, tărâţe de grâu, furaj din seminţe de floarea-soarelui, soia, ulei de ovăz, coji, pulpă de sfeclă uscată, seminţe de in, tărâţe, gluten din porumb, clorură de sodiu, fosfat monocalcic, grâu, carbonat de calciu, fructo-oligozaharide, furaje soia.

Indicaţii:
- pentru caii cu tulburări specifice, cum ar fi ulcerul gastric, patologiile gastrointestinale, rezistenţa la insulină, boala Cushing, colicile sau afecţiunile musculare

Administrare:

	HRĂNIRE
Efort	
Ca un concentrat suplimentar	max. 1 kg FiberForce
Ca furaj complet pentru caii care suferă de anumite afecţiuni (mentionate mai sus)	max. 2 kg FiberForce

scientifically proven

FiberForce the optimal gut improver









MURIBROM
- cub parafinat roşu 20 g/buc
- grâu roşu 25 g/plic
- pastă plic roşu 15 g/plic

Substanţă activă:
Bromadiolonă 0,005%

Indicaţii:
Se va folosi în interiorul locuinţelor particulare, în interiorul clădirilor şi instalaţiilor fixe sau mobile sau în apropierea lor (fără a se depăşi distanţa maximă de 0,5 m între staţie şi clădire/instalaţie), în staţii corect etichetate.
Produsul mai poate fi folosit şi în canalizări, dacă este necesar, ferm ataşat.

Administrare:
Şoareci de casă (*Mus musculus*): capcane cu momeli cu 50 g produs, la fiecare 5 - 10 m.
Şobolani (*Rattus norvegicus*): Capcane cu momeli de până la 200 g de produs, pline cu blocuri de 20 g produs, la fiecare 5 - 10 m.
Şobolani maro (*Rattus norvegicus*) (Canalizări): 200 g de momeală pentru fiecare punct de aplicare, în blocuri de 20 g



MURIBROM
- pastă plic albastru 15 g/plic

Substanţă activă:
Brodifacum 0,005%

Indicaţii:
Se va folosi în interiorul locuinţelor particulare, în interiorul clădirilor şi instalaţiilor fixe sau mobile sau în apropierea lor (fără a se depăşi distanţa maximă de 0,5 m între staţie şi clădire/instalaţie), în staţii corect etichetate.
Produsul mai poate fi folosit şi în canalizări, dacă este necesar, ferm ataşat.

Administrare:
Şobolani maro (*Rattus norvegicus*): capcane cu momeli cu 100 g produs la fiecare 10^2m
Şoareci (*Mus musculus*): capcane cu momeli cu 40 g produs la fiecare 10^2m
Şobolani negri (*Rattus rattus*): capcane cu momeli cu 100 g produs la fiecare 10^2m

MURIBROM
momeală raticidă gata de utilizare 150 g
momeală proaspătă



Raticid

Substanţă activă:
Brodifacoum 0,005%

Indicaţii:
Se va folosi în interiorul locuinţelor particulare, în interiorul clădirilor şi instalaţiilor fixe sau mobile, în staţii corect etichetate. Amplasaţi staţia de intoxicare în zona infestată.

Doza (dozele) şi frecvenţa de aplicare:
20-40 g de momeală/staţie.

Numărul şi calendarul de aplicare:
Dacă este nevoie de mai mult de o staţie, distanţa minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri.

Specii ţintă:
Şobolanul cenuşiu *(Rattus norvegicus)*

MASTERFLY® BAIT

DINOTEFURAN

INSECTICID PENTRU COMBATEREA MUŞTELOR

EFICACITATE de până la 8 LUNI



Dinotefuranul este un insecticid de ultimă generaţie, care omoară insectele acţionând asupra receptorilor de la nivelul sistemului lor nervos, anume asupra unui tip de receptori colinergici, numiţi receptori nicotinici.

Insecticid pudră pentru combaterea muştelor din locuinţe, adăposturi de animale, spaţii industriale şi împrejurimi.

- ✓ PULBERE SOLUBILĂ ÎN APĂ
- ✓ ACŢIUNE FOARTE RAPIDĂ
- ✓ ACŢIUNE DE LUNGĂ DURATĂ
- ✓ ACŢIONEAZĂ PRIN INGESTIE ŞI CONTACT

Disponibil la:
125 g şi 500 g



(Conţine recipient de dozare în interiorul flaconului)

INSECTICID INOVATIV CU EFECT DE LUNGĂ DURATĂ PENTRU COMBATEREA MUŞTELOR



QM QUIMUNSA
Derio Bidea, 51
48100 Munguía - Spain
Tel. (+34) 946 741 085
info@quimunsa.com
www.qmconsumo.com

Distribuitor:
BistriVet
Everything for vets and farms
S.C. BISTRI-VET S.R.L.
Libertăţii nr. 13, Bistriţa, România
Tel: +4 0363 401 304
office@bistrivet.ro
Pentru detalii accesaţi www.bistrivet.ro



ERES
100 ml

Compoziţie:
Substanţă activă:
Clorhidrat de bromhexin 2,74 mg

Indicaţii:
• în tratamentul infecţiilor bacteriene respiratorii, ca mucolitic

Administrare:
Doza:
- Greutate 50 - 200 kg: 0,18 ml/kg/5 zile
- Greutate 200 - 500 kg: 0,073 - 0,18 ml/kg/5 zile



DROTAVET
20 ml

Compoziţie:
Substanţă activă: Clorhidrat de drotaverină 20 mg/ml

Indicaţii:
• adjuvant în tratamentul afecţiunilor digestive (colici abdominale, ulcer gastric sau duodenal, gastrită, enterită spastică, colită, pancreatită, constipaţie spastică, spasme ale sfincterelor cardia şi pilor, spasme ale musculaturii netede a căilor biliare, litiază biliară, colecistită);
• spasme ale musculaturii netede a tractului urinar (litiază renală, litiază ureterală, pielită, cistită);
• afecţiuni ale aparatului genital (contracţii tetanice uterine, iminenţă de avort)

Administrare:
Doza: 8 - 10 ml i.m. sau s.c.
- colici abdominale acute: 8 ml intravenos lent

Bujiuri intrauterine URAKSHA
4 buc./folie



Compoziţie:
Adhatoda vasica, Ocimum sanctum, Curcuma longa, Glycyrrhiza glabra, Asparagus racemosus, Azadirachta indica , Berberis lycium, Ficus bengalensis, Ficus glomerata, Ficus religiosa, Gossypium herbaceum, Paederia foetida, Shilajeet

Indicaţii:
• prevenţia şi tratarea diferitelor infecţii intrauterine, după îndepărtarea manuală a placentei

Administrare:
Doza: 2 comprimate intrauterine, timp de 2 zile



BUSCOPAN
100 ml

Boehringer Ingelheim

Compoziţie:
1 ml conţine:
Bromură de butilscopolamină 4 g
Metamizol sodic 500 mg
Fenol (ca substanţă conservantă) 5 mg

Indicaţii:
- colici spastice
- colici datorate constipaţiei/fecaloamelor
- obstrucţie esofagiană

Administrare:
Doza: 20 - 30 ml
Administrare intravenos lent

Timp de aşteptare:
Carne şi organe: 12 zile.
Lapte: Produsul nu se va administra la iepele care produc lapte destinat consumului uman.

ŞAMPON HERBA VITAL
200 ml, 1 L

PROMEDIVET



Compoziţie:
o BRUSTURE (*Arctium lappa - radix*)
o MESTEACĂN (*Betula pendula - folium*)
o COADA CALULUI (*Equisetum arvense - folium*)
o NUC (*Juglans regia - folium*)
o MUŞEŢEL (*Matricaria chamomilla - flos*)
o JALEŞ DE GRĂDINĂ (*Salvia officinalis - folium*)
o URZICĂ (*Urtica dioica - radix et folium*).
Şamponul mai conţine lauriletersulfat de sodiu, dietanolamină de cocamidă, tensidă de cocos, clorură de acrilamid-dimetil-dialil-amoniu, conservant, parfum, clorură de sodiu, apă.

Indicaţii:
- pentru întreţinerea şi igienizarea părului la cabaline
- combate căderea părului

Administrare:
Uz extern, se umectează părul cu apă caldă, apoi se aplică şi se dispersează şamponul.
După 5 - 10 minute de acţiune, şamponul se îndepărtează prin clătire repetată cu apă caldă. Se usucă părul cu un prosop sau cu aer cald sau se ţine animalul într-o încăpere caldă până la uscarea părului.



Cleşte Reimers



Pensă Burdizzo
37 cm, 52 CM

Pensa se aplică pe cordonul testicular, la diferite nivele, pentru strivirea cordonului spermatic şi a vaselor care irigă testiculul, lăsând nestrivită o porţiune pentru menţinerea irigaţiei sanguine a scrotului.
Este larg utilizată datorită riscurilor scăzute de hemoragie sau infecţie după castrare.



Adăpătoare cu plutitor din plastic

Este fabricată din nailon PA66, cu protecţie UV, fiind rezistentă la coroziune. Adăpătoarea este ideală pentru toate animalele de rentă. Este dotată cu un plutitor din inox, ce menţine un nivel constant al apei. Uşor de montat.
Uşor de igienizat.
Dimensiuni: 28 cm x 27 cm x 12 cm.
Capacitate: 4 litri




Adăpătoare din fontă emailată cu clapetă de inox

Adăpătoare din fontă emailată cu clapetă de inox. Suprafaţă fină şi structură robustă. Poate fi folosită cu succes la vaci sau cai. Sistem de prindere pe perete sau pe ţeavă. Posibilitate de alimentare cu racord de 1/2 în partea de sus sau în partea de jos.

Ace și fire sutură

Identificarea acelor şi montare



Corp rotund | Tăiere curbă

Forma acului



Drept | ½Cerc | 3/8 Cerc | 1/4 Cerc | 5/8 Cerc



Fir acid poliglicolic, polifilament



Fir catgut cromic



Fir mătase chirurgicală



Fir nailon




Polipropilenă Monofilament

Absorbabile

Fir acid poliglicolic, polifilament
Fir catgut cromic
Fir polidioxanonă

Neabsorbabile

Fir mătase chirurgicală
Fir nailon



Fir polidioxanonă cu ac atraumatic (monofilament)



Fir de sutură fabricat din poliesterul polidioxanonă, resorbabil, sintetic, monofilament. Firul este acoperit cu polimer de polidioxanonă pentru a fi non antigenic, apirogen, extrem de moale şi a produce noduri sigure.

Caracteristici produs

- Material: poliester polidioxanonă
- Modalitate de absorbţie: hidroliză
- Timp de absorbţie: 180-210 zile
- Timp retenţie nod: până la 56 zile
- Grosime fir: USP 2, USP 1, USP 0
- Lungime fir: 75 cm
- Curbură ac: ½
- Tip ac: Secțiune rotundă (ac rotund) 45 mm, 40 mm, 35 mm
- Mod de ambalare: 12 buc/cutie

Beneficii

- Efect minim la nivel de ţesut
- Trecere uşoară prin ţesut
- Manipulare uşoară
- Produs sterilizat
- Absenţa capilarităţii
- Înnodare excelentă

Indicaţii:

Chirurgie generală, Chirurgie gastrointestinală, Chirurgie oftalmică, Ortopedie, Ginecologie-Obstetrică, Urologie, Chirurgie plastică



Fir acid poliglicolic, polifilament



Descriere:

Fir resorbabil pe termen mediu, realizat din acid poliglicolic pur, polifilament. Descompunerea acestuia se realizează prin hidroliză, într-o manieră predictibilă.

Caracteristici produs

- Material: acid poliglicolic
- Modalitate de absorbţie: absorbţie prin hidroliză
- Perioada de resorbţie predictibilă: 60-90 zile
- Grosime fir: USP 2, USP 1, USP 0, USP 2/0, USP 3/0
- Lungime fir: 75 cm
- Curbură ac: ½
- Tip ac: Secțiune rotundă (ac rotund) 45 mm, 40 mm, 35 mm, 30 mm, 25 m
- Mod de ambalare: 12 buc/cutie

Beneficii

- Manipulare uşoară
- Siguranţă la înnodare
- Noduri sigure
- Rezistenţă la rupere
- Flexibilitate ridicată
- Produs sterilizat
- Trecere uşoară prin ţesut

Indicaţii:

Chirurgie generală, Chirurgie oftalmică, Ginecologie-Obstetrică, Ortopedie, Urologie, Chirurgie plastică.

Contraindicaţii:

Fiind sutură resorbabilă, nu trebuie utilizată în situaţiile când suportul în plagă este necesar un timp nedefinit.

SERINGĂ UF CU AC





Seringă UF cu ac - diferite mărimi - 100 buc/cutie
Seringă UF fără ac - 25 buc/set
Seringă insulină 1 ml cu ac 21 G

SERINGĂ PLEXIGLAS



Seringă simplă plexiglas 0,5 ml; 10 ml; 20 ml; 30 ml; 50 ml

Caracteristici tehnice:

• seringă cu capacitate de reglaj până la 50 ml;
• design ergonomic;
• material de înaltă calitate prevăzut cu protecţie UV;
• piston metalic;
• seringa se sterilizează prin fierbere.
Piese de rezervă: set de garnituri



Bandaj elastic autoadeziv 10 cm/4.5 m; 5 cm

Bandaje autoaderente, dintr-un material special, copolimer, elastic, permeabile pentru aer, nu se lipesc de piele şi nu necesită tunderea regiunii pe care se aplică, fiind elastice nu limitează mişcările, iar animalele nu le pot rupe uşor cu dinţii. Sunt multifuncţionale, economice, aderă imediat ce straturile sunt înfăşurate unul peste celălalt, dar se pot desface cu uşurinţă cu mâna, economisind timp şi material.



FAŞĂ TIFON ROLĂ

Faşă tifon rolă 10 m/10 cm
Faşă tifon rolă 10 m/15 cm
Faşă tifon rolă 5 m/10 cm

MĂNUŞI



Mănuşi chirurgicale sterile pudrate 65 S, 75 M, 85 L

Mănuşi control gestaţie cu umăr

Mănuşi examinare latex S, M, L

Mănuşi examinare nitril S, M, L



Seringă dozator pistol REZERVOR 30 ml

Descriere produs:
- seringă automată de uz veterinar, destinată administrării cu precizie şi în serie a medicamentelor veterinare;
- se pretează pentru administrarea în masă, la toate speciile de animale şi pentru toate tipurile de soluţii (apoase, uleioase).

Caracteristici tehnice:
- seringă automată cu capacitatea de 30 ml şi posibilitate de dozare de 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml sau 5 ml;
- uşor de dezasamblat, componentele sunt uşor accesibile, se curăţă foarte uşor şi se întreţine cu ulei de silicon;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă;
- mâner ergonomic din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru transparent din sticlă, protejat cu un suport metalic gradat de la 1 la 30 ml;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindrul din sticlă;
- volumul de administrat se setează cu uşurinţă cu ajutorul unui limitator metalic fixat pe piston cu gradaţie între 1 şi 5 ml;
- se reumple prin tragerea pistonului până la max 30 ml.

Piese de rezervă: set de garnituri; cilindru din sticlă



Seringă dozator pistol REZERVOR 50 ml

Descriere produs:
- seringă automată de uz veterinar, destinată administrării cu precizie şi în serie a medicamentelor veterinare;
- se pretează pentru administrarea în masă, la toate speciile de animale şi pentru toate tipurile de soluţii (apoase, uleioase).

Caracteristici tehnice:
- uşor de dezasamblat, componentele sunt uşor accesibile, se curăţă foarte uşor şi se întreţine cu ulei de silicon;
- seringă automată cu capacitatea de 50 ml şi posibilitate de dozare de 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml sau 5 ml;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă;
- mâner ergonomic din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru transparent din sticlă, protejat cu un suport metalic;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindrul din sticlă;
- se reumple prin tragerea pistonului până la max 50 ml;
- volumul de administrat se setează cu uşurinţă cu ajutorul unui limitator metalic fixat pe mâner cu gradaţie între 1 şi 5 ml.

Piese de rezervă: set de garnituri; cilindru din sticlă



Seringă automată 1, 2, 3 şi 5 ml P albastru Flacon

Descriere produs:
- seringă automată de uz veterinar, destinată administrării cu precizie şi în serie a medicamentelor veterinare;
- se pretează pentru administrarea în masă la toate speciile de animale şi pentru toate tipurile de soluţii (apoase, uleioase).

Caracteristici tehnice:
- uşor de dezasamblat, componentele sunt uşor accesibile, se curăţă foarte uşor şi se sterilizează la 130° Celsius;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,5 ml în 0,5 ml, până la 1, 2, 3 şi 5 ml, dotată cu un suport rigid pentru flacon, acesta fiind prevăzut cu un ac de alimentare ce pătrunde în flacon;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă; se comercializează împreună cu uleiul de întreţinere;
- mâner din plastic;
- cilindru gradat, transparent din plastic;
- pistonul din plastic culisează perfect în cilindrul din plastic;
- volumul de administrat se setează cu uşurinţă cu ajutorul unui limitator micrometric din plastic fixat pe piston.

Seringă automată A metalică 0,1-2 ml Furtun

Descriere produs:
Este destinată pentru injectarea soluţiilor medicamentoase la animale.

Caracteristici tehnice:
- uşor de dezasamblat, componentele sunt uşor accesibile, se curăţă foarte uşor;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,1 în 0,1 ml, până la 2 ml;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă;
- mâner din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru gradat transparent din plastic, protejat cu un suport metalic;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindrul din plastic;
- volumul se reglează cu uşurinţă prin rotirea mânerului şi se fixează cu ajutorul unui limitator metalic.



Accesorii: furtun de alimentare din silicon medical; 1 ac de administrare; 1 ac de alimentare
Piese de rezervă: set de garnituri; cilindru din plastic.

Seringă automată B metalică 0,1-1 ml Furtun

Descriere produs:
Este destinată pentru injectarea soluţiilor medicamentoase la animale.

Caracteristici tehnice:
- uşor de dezasamblat, componentele sunt uşor accesibile, se curăţă foarte uşor;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,1 în 0,1 ml, până la 1 ml;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă;
- mâner din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru gradat transparent din plastic, protejat cu un suport metalic;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindrul din plastic;
- volumul se reglează cu uşurinţă prin rotirea mânerului şi se fixează cu ajutorul unui limitator metalic.



Accesorii: furtun de alimentare din silicon medical; 1 ac de administrare; 1 ac de alimentare
Piese de rezervă: set de garnituri; cilindru din plastic

Seringă automată B metalică 0,1-2 ml Furtun



Descriere produs:
Este destinată pentru injectarea soluţiilor medicamentoase la animale.
Caracteristici tehnice:
- uşor de dezasamblat, componentele sunt uşor accesibile, se curăţă foarte uşor;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,1 în 0,1 ml, până la 2 ml;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă;
- mâner din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru gradat transparent din plastic, protejat cu un suport metalic;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindrul din plastic;
- volumul se reglează cu uşurinţă prin rotirea mânerului şi se fixează cu ajutorul unui limitator metalic.

Accesorii: furtun de alimentare din silicon medical; 1 ac de administrare; 1 ac de alimentare
Piese de rezervă: set de garnituri; cilindru din plastic

Seringă automată B metalică 0,1-5 ml Furtun



Descriere produs
Este destinată pentru injectarea soluţiilor medicamentoase la animale.
Caracteristici tehnice:
- uşor de dezasamblat, componentele sunt uşor accesibile, se curăţă foarte uşor;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,5 în 0,5 ml, până la 5 ml;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă;
- mâner din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru gradat transparent din plastic, protejat cu un suport metalic;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindrul din plastic;
- volumul se reglează cu uşurinţă prin rotirea mânerului şi se fixează cu ajutorul unui limitator metalic.

Accesorii: furtun de alimentare din silicon medical; 1 ac de administrare; 1 ac de alimentare
Piese de rezervă: set de garnituri; cilindru din plastic



Seringă automată K pistol 2 ml Furtun

Descriere produs:
Este destinată pentru injectarea soluţiilor medicamentoase la animale.
Caracteristici tehnice:
- uşor de dezasamblat, componentele sunt uşor accesibile, se curăţă foarte uşor;
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,5 în 0,5 ml până la 2 ml;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă;
- mâner din metal (alamă nichelată sau cromată);
- cilindru metalic, încorporat în mâner;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindrul metalic;
- volumul se reglează cu uşurinţă prin rotirea dispozitivului rotund din capătul mânerului şi se fixează cu ajutorul unui limitator metalic.

Accesorii: furtun de alimentare din silicon medical; 1 ac de administrare; 1 ac de alimentare
Piese de rezervă: set de garnituri

Seringă automată 5 ml B PG Furtun



Descriere produs:
- se pretează pentru administrarea în masă la toate speciile de animale şi pentru toate tipurile de soluţii (apoase, uleioase);
- poate fi folosită atât pentru administrarea injectabilă cât şi orală.

Caracteristici tehnice:
- seringă automată cu capacitate de reglaj din 0,5 ml în 0,5 ml, până la 5 ml prevăzută cu furtun de alimentare din silicon medical;
- uşor de dezasamblat, componentele sunt uşor accesibile, se curăţă foarte uşor şi se sterilizează la 130° Celsius;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă;
- mâner ergonomic din plastic;
- cilindru gradat, din plastic transparent;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindrul din plastic, fără să fie nevoie de vreo garnitură care să se uzeze şi să trebuiască să fie înlocuită ulterior;
- volumul de administrat se setează cu uşurinţă cu ajutorul unui limitator micrometric din plastic fixat pe piston.

Accesorii: tijă pentru administrare orală; 2 bucăţi ace de alimentare de mărimi diferite; furtun de alimentare din silicon medical.

Piesă de rezervă: cilindru gradat

Dispozitiv injectare de la distanţă



Descriere produs:
- Este ideal pentru utilizarea în cazul animalelor retive din stabulaţie liberă, în cadrul adăposturilor pentru câini şi grădinilor zoologice;
- Este destinat pentru injectarea soluţiilor medicamentoase la animale de la distanţa de maxim 2 m.

Caracteristici tehnice:
- dispozitivul este alcătuit din mai multe componente care se asamblează foarte uşor;
- este prevăzut cu o seringă metalică în scut din plexiglas, cu capacitate de reglaj din 0,5 în 0,5 ml;
- piesele se pot înlocui cu uşurinţă;
- cilindru gradat, din plastic transparent;
- pistonul metalic culisează perfect în cilindru;
- reumplerea seringii metalice se face cu ajutorul unui furtun din silicon care se ataşează la capătul pistonului;
- la fiecare manoperă de injectare, acul trece printr-un tampon îmbibat cu dezinfectant şi astfel dispozitivul poate fi folosit în masă fără înlocuirea acului metalic;
- este prevăzut cu un dispozitiv sonor care semnalizează fiecare administrare.

Accesorii: 2 bucăţi de furtun de alimentare din silicon medical; 1 furtun din silicon medical pentru alimentarea tamponului cu dezinfectant, prevăzut cu limitator de dozaj; 1 ac de alimentare; seringă 50 ml pentru dezinfectant; seringă metalică cu cilindru plexiglas; instrucţiuni pe suport CD; cleme din plastic pentru fixarea seringii cu dezinfectant şi a furtunului de alimentare; set de 12 ace metalice 16 G.

Piese de rezervă: cilindru din plastic; tampoane pentru dezinfectare

HSW seringă automată ECO-MATIC®
1 ml, 2 ml, 5 ml

Seringă automată cu auto-umplere, cu suport pentru flacoanele medicale

Specificaţii:

•Seringă din plastic de calitate superioară, cu cilindru din plastic durabil
•Ataşament pentru ac din metal rezistent la transfer
•Acurateţe maximă, dozaj precis şi continuu
•Raport excelent calitate-preţ
•Design ergonomic şi compact, care permite uşurinţă în utilizare
•Cilindru din plastic durabil, disponibil în două dimensiuni, asigurând:
- fixare sigură a flacoanelor veterinare
- protecţia recipientului împotriva şocurilor
- schimbarea rapidă şi uşoară a flacoanelor veterinare (50 ml-250 ml)



Include:
HSW ECO MATIC® 1 x Seringă cu suport pentru flacoanele medical

Sistem Luer Lock	Vol/ml
	1 ml (0,1 ml - 1,0 ml)
	2 ml (0,2 ml - 2,0 ml)
	5 ml (0,5 ml - 5,0 ml)

HSW seringă automată ECO-MATIC® 5 ml

Seringă automată cu auto-umplere, cu furtun ataşat

Specificaţii:

•Seringă din plastic de calitate superioară, cu cilindru din plastic durabil
•Ataşament pentru ac din metal rezistent la transfer
•Acurateţe maximă, dozaj precis şi continuu
•Raport excelent calitate-preţ
•Design ergonomic şi compact, care permite uşurinţă în utilizare



Include:
HSW ECO-MATIC® 1 x Seringă cu furtun ataşat

Sistem Luer Lock	Vol/ml
	5 ml (0,5 ml - 5,0 ml)

HSW seringă automată MULTI-MATIC
25 ml LL, 50 ml LL

Seringă automată cu dozare multiplă

Specificaţii:

•Mâner durabil din aluminiu turnat sub presiune - durabilitate excelentă
•Cilindru din plastic de clasă medicală:
- cu accesoriu metalic pentru ac
- biocompatibil – autoclavabil (134°C/273°F)
- rezistent chimic la toate medicamentele cunoscute
- rezistenţă la razele UV şi la şocuri
•Acurateţe mare în dozare - toleranţă < 1%
•Dozare uşoară - rotiţă pentru dozare: 0,5ml (25 ml) sau 1ml (50 ml)
•Design ergonomic pentru o utilizare uşoară - uşor de dezasamblat



Include:
HSW MULTI-MATIC 1 x Seringă

Sistem Luer Lock	Vol/ml
	25 ml
	50 ml

HSW seringă automată TUBERCULINARE HENKE-JECT® TBC 2 ml

Seringă automată cu auto-umplere, cu suport pentru flacoanele medicale

Specificaţii:

•Confecţionată din metal şi sticlă
•Design modern şi ergonomic
•Precizie înaltă de dozare - 0,1ml prin apăsarea mânerului
•Schimbare sigură şi uşoară a acului prin sistemul Luer Lock
•Uşor de utilizat şi dezasamblat
•Autoclavabilă (se sterilizează la 134°)



Include:
HSW HENKE-JECT® TBC 1 x Seringă

Sistem Luer Lock	Vol/ml
	2 ml

Accessorii
HSW-ECO® Ac e 0 / ,7 x 4 mm 22 G x 1/8"

HSW seringă PLEXIGLAS - TU FLEX-MASTER® 10 ml LL

Versiunea A – pentru dozare uşoară

VERSIUNEA A

•Seringă ajustabilă hipodermică din plastic TPX
•Dozare uşoară
•Duza Luer Lock metalică, interschimbabilă
•Autoclavabilă (se sterilizează la 134°)
•Ambalat individual
•Duză de administrare disponibilă ca accesoriu
VERSIUNEA A - pentru dozare uşoară



Sistem Luer Lock	Vol/ml
	5 ml LL, 20 ml LL, 50 ml LL

HSW pistol dozator ECO-MATIC® WITH TUBING DRENCHER 30 ml LL

Seringă automată cu auto-umplere, pentru administrare orală

Specificaţii:

•Special dezvoltată pentru utilizare la bovine şi ovine
•Poate fi utilizată şi ca seringă pentru injecţie, cu un adaptor separat
•Design ergonomic şi uşor de utilizat
•Materiale de înaltă calitate, rezistenţă îndelungată
•Greutate mică
•Dozarea este setată printr-o rotiţă de dozare



Include:
HSW ECO-MATIC® Drencher:
1 x Seringă
1 x Furtun alimentare
1 x Adaptator tub metalic 11 cm - pentru administrare orală

HSW MULTI-MATIC 1 x Seringă

Sistem Luer Lock	Vol/ml
	25 ml
	50 ml



Pistol dozator 60 ml (cu furtun) pentru administrare orală

Cu o capacitate de 60 ml, pistolul dozator este ideal pentru administrarea orală a produselor medicamentoase pentru toate tipurile de rumegătoare. Se utilizează pentru a distribui 2,5 până la 60 ml de produs.
Foarte uşor de asamblat, cu mâner ergonomic pentru o utilizare uşoară.
Produsul vine la pachet cu un furtun cu lungimea de 120 cm.
Pistol dozator pentru toate tipurile de rumegătoare.
Corp din ABS foarte robust.
Rezistent la agenţi chimici. Reglarea dozei printr-un şurub.



Pistol dozator 20, 30, 50 ml (fără furtun) pentru administrare orală



DOZATOARE MIXRITE

Dozator MixRite 2.5 0,3% - 2%

Tip dozator	Utilizare	Debit de presiune	Interval de dozare	Frecvenţa	Conectori	Debite de injectare/h Min.-Max.	Greutate brută
MixRite 2.5 0,3% - 2%	Zootehnie/ Irigare/ Clor/Acizi/ Spălătorie auto	7-2500 l/h	0.2-8 bari	1:333 - 1:50	3/4” BSPT	0.021 - 50 l/h	1.8 KG

- arcuri de plastic
- buton on/off
- set de 3 garnituri de schimb



Dozator MixRite 3.5 0.5% - 5%

Tip dozator	Utilizare	Debit de presiune	Interval de dozare	Frecvenţa	Conectori	Debite de injectare/h Min.-Max.	Greutate brută
MixRite 3.5 0.5% - 5%	Zootehnie/ Irigare/ Clor/Acizi/ Spălătorie auto	10-3500 l/h	0.2-8 bari	1:200 - 1:20	3/4” BSPT	0.05 - 175 l/h	1.9 KG

- arcuri de plastic
- buton on/off
- set de 3 garnituri de schimb



PENSE



Pensă anatomică curbă 17.5 cm
Pensă anatomică dreaptă 17.5 cm
Pensă anatomică dreaptă 15 cm
Pensă anatomică Iris 10 cm, 14.5 cm
Pensă auriculară 8 cm, 10 cm, 14 cm, 16.5 cm

Pensă hemostatică Kocher curbă 12,5 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm
Pensă hemostatică Kocher dreaptă 12,5 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 23 cm, 26 cm
Pensă hemostatică Pean curbă 12,5 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm
Pensă hemostatică Pean dreaptă 12,5 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm
Port ac Mathieu 17 cm, 20 cm
Port ac Olsen Hegar 14 cm







FOARFECE

Foarfecă curbă A/A 13 cm, 14 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm
Foarfecă curbă A/B 20 cm
Foarfecă curbă B/A 13 cm, 14 cm, 15 cm, 17,5 cm, 18 cm
Foarfecă curbă B/B 13 cm, 14 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm
Foarfecă dreaptă A/A 13 cm, 14 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm
Foarfecă dreaptă A/B 16,5 cm
Foarfecă dreaptă B/A 13 cm, 14 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm
Foarfecă dreaptă B/B 13 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm, 17,5 cm, 20 cm



CUTII INSTRUMENTAR

Cutie instrumentar 5 x 2 x 1.5 cm

Material: oţel inox (conţine cel puţin 11% crom).
Frecvenţa de utilizare: zilnică (este rezistentă la coroziune şi căldură).
Domenii de utilizare: sterilizare la cald (Autoclav sau Pupinel) şi dezinfecţie instrumentar.

Cutie instrumentar 20 x 10 x 4 cm

Cutie instrumentar 26 x 15 x 5 cm



Scafă aluminiu - 1,6 kg - 2,5 kg

Scafă rotundă din aluminiu pentru hrănire şi pentru cântărirea concentratului furajer



Ţesală cu 4 lame

Ţesală rotundă. Material: inox, mâner din plastic. Format din cercuri cu dinţi, din tablă zincată.



YeaBis

SURSĂ DE CALCIU ŞI MINERALE **CU DROJDII VII**



Descriere:
Amestec complex din produse de origine naturală: drojdii vii (*Saccharomyces cerevisiae*) şi sursă de minerale cu biodisponibilitate crescută cu rol în stabilizarea pH-ului, fixare a amoniacului şi îmbunătăţirea digestiei.

Specii ţintă:
Rumegătoare mici şi mari, suine şi cai.

Compoziţie/kg:
Aditivi: *Saccharomyces cerevisiae*: 6 x 10^{11} UFC
Conservanţi: propionat de calciu (E282) 0,0225 mg
Substanţe aromatice: amestec de substanţe aromatice 0,9 mg.
Agent antiaglomerare: silicon precipitat şi uscat (E551a) 31,5 mg
Altele: pulbere de Yucca Schidigera, cristobalit, acid fulvic (din industria apei de băut), calcar din colonii de corali marini *(Maerl)*
Carrier: făină de grâu

Dozaj:
Dozajul va fi calculat în funcţie de compoziţia raţiei furajere şi a stării fiziologice a animalelor, respectându-se următoarele limite:

Cai: 5 Kg YeaBis/tonă furaj



BistriVet

Everything for vets and farms



Strada Libertăţii nr. 13 | Bistriţa |
Bistriţa-Năsăud | 420155 | România |
Telefon: +40 363 401 304 | Fax: +40 263 239 038

www.bistrivet.ro

•Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare şi pot diferi în orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produselor livrate, acestea putând prezenta abateri minore de la pozele şi descrierile prezentate în catalog.