

GRANIBIS POWDER

PREMIX PENTRU CONSERVAREA MATERILOR PRIME ȘI A FURAJELOR



Amestec granulat, cu conținut de acid propionic, acid formic și formiat de amoniu pentru conservarea cerealelor, a cerealelor măcinate și a furajelor combinate



Protecție eficientă și de lungă durată a furajelor împotriva fungilor, muceștilor și drojdiilor





Sigur și eficient

Prin aplicarea produsului, se elimină necesitatea procesului costisitor de uscare a cerealelor, contribuind la reducerea costurilor, prevenind infectarea cu micotoxine.

Acidul propionic previne încingerea furajelor, blocând multiplicarea mucegărilor.



Utilizare imediată

Cerealele pot fi utilizate imediat în hrana pentru animale, nu necesită timp de așteptare.

Utilizarea acizilor organici este benefică pentru îmbunătățirea digestiei.



Îmbunătățirea palatabilității furajelor

Combinația dintre acidul propionic și acidul formic are o influență pozitivă asupra palatabilității furajelor, ceea ce duce la o creștere a consumului și a valorii nutritive a furajelor.



Eficiență de lungă durată împotriva mucegaiurilor

Excipientul pe bază de vermiculită și pământ de diatomee asigură eliberarea gradată, în timp, a acizilor organici absorbiți, contribuind astfel la conservarea cerealelor pe o perioadă mai lungă.

**Granibis Powder eliberează constant acizii
pe întreaga perioadă de depozitare, oferind astfel
o protecție sigură și de lungă durată
împotriva contaminării după depozitare.**

Instrucțiuni de utilizare:

Tipul cerealelor și procentul de umiditate [%]	Durata conservării Doza minima [kg / t cereale]			
Porumb, grâu, ovăz, orz, triticeale, secară	Până la o lună	1–3 luni	3–6 luni	6–12 luni
12	1,5	2	2,5	3,5
14	2,5	3,0	3,5	4,5
16	3,5	4,5	5,5	6,5
18	4,5	5,5	7,0	8,0
20	5,0	7,0	8,0	9,0
22	5,5	8,0	9,0	10,0
24	6,0	8,5	10,0	11,5
Porumb boabe însilozat umed				
Până la 35	11,5	13,0	14,5	16,0
Până la 40	12,5	15,0	16,5	19,0
Până la 45	15,5	17,0	18,0	21,0
Porumb boabe măcinat, CCM, LKS, furaj combinat	4-6			

Ingrediente active:

Acid propionic

- efecte puternice împotriva muceștilor și, chiar și împotriva drojdiei.
- efect ridicat de conservare, contribuind la prevenirea fermentației și a apariției muceștilor și fungilor în furaje.

Acid formic din formiat de amoniu

- acționează ca un puternic agent antimicrobian, distrugând bacteriile și împiedicând creșterea ulterioară a acestora în furaje.


Acid formic

- efect bactericid și bacteriostatic puternic.
- îmbunătățește digestia proteinelor în tractul digestiv al animalelor, facilitând absorbția nutrienților și îmbunătățind performanța animalelor.

Aditivi tehnologici:

Vermiculită

Pământ de diatomee



Forma de prezentare:
Sac 25 kg

GRANIBIS POWDER

PREMIX PENTRU CONSERVAREA MATERILOR PRIME ȘI A FURAJELOR

INDICAT PENTRU:

- ✓ Conservarea cerealelor
- ✓ Creșterea perioadei de depozitare (în funcție de nivelul de umiditate)
- ✓ Depozitarea inclusiv în condiții de risc

Aplicare:

Metodele comune de aplicare a acizilor pulberi pentru conservarea furajelor includ:

Amestecare directă: Se adaugă GRANIBIS POWDER direct în furaje și se amestecă pentru distribuire uniformă.

Aplicare selectivă în zonele cu risc crescut: Pulberea nu se aplică în întregul volum al cerealelor, ci selectiv în zonele cu risc crescut de contaminare sau de dezvoltare a microorganismelor.

Aplicare la bază sau la suprafață: Se aplică un strat de pulbere la bază, înainte de depozitarea cerealelor, sau la suprafața cerealelor după depozitare, pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor în acele zone.

Utilizarea de sisteme automate: Sistemele automate dozează și distribuie acizii pulberi în furaje în timpul procesului de producție sau depozitare.

Este important să se respecte dozajul recomandat pe eticheta produsului și să se ia în considerare factori precum tipul de furaj și condițiile de depozitare, pentru a asigura eficacitatea și siguranța utilizării GRANIBIS POWDER în conservarea furajelor.



Principalele semne ale intoxicației cu micotoxine la animale includ:

Aflatoxina:

Manifestări: Scăderea apetitului, slăbiciune, icter, scăderea producției de lapte.

Transmisie în lapte: Da, aflatoxina se poate transmite în laptele produs de animalele contaminate.

Fumonisina:

Manifestări: Tulburări digestive, pierdere în greutate, afecțiuni hepatice și renale.

Zearalenona:

Manifestări: Tulburări reproductive, incluzând avorturi și pseudogestație la porci.

Ochratoxina:

Manifestări: Leziuni renale, insuficiență renală, scăderea producției de lapte la animalele lactante.

- Animalele care consumă furaje contaminate cu micotoxine sau alți agenți patogeni pot prezenta o varietate de semne și simptome. Acestea pot varia în funcție de tipul și nivelul contaminării, precum și de specia și vârsta animalelor.
- Aproape mereu, manifestările clinice și subclinice care apar sunt cauzate de infectarea cu un cumul de micotoxine. Rareori sunt determinate de un singur tip de micotoxine.
- Este important să se identifice și să se gestioneze sursele de contaminare cu micotoxine pentru a proteja sănătatea și producția animalelor.



 **BistriVet**
Everything for vets and farms

www.bistrivet.ro

Bistrița, Str. Libertății Nr. 13, Bistrița-Năsăud,
420155 România
office@bistrivet.ro