


Vaccinare împotriva EHV la cai




PRIMUL PAS ÎN PREVENIRE

SCHEMA DE VACCINARE **BioEquinH**



VACCINAREA IEPELOR GESTANTE




Instalarea imunității peste 14 zile după vaccinarea primară (după primele două doze), durata imunității fiind de luni după revaccinare (după a treia doză).

Administrați o doză de 1 ml adânc intramuscular pentru a minimiza reacțiile adverse în mușchiul gluteal, utilizând un ac uscat; nu încărcăți caii timp de 2-3 zile după administrare, verificați locul injectării.

**VACCINAREA
CAILOR REDUCE
SEMNICATIV
RĂSPÂNDIREA BOLII
ÎN POPULAȚIE**


VACCINAREA ÎMPOTRIVA EHV-1 LA MÂNZ

BioEquinH



INFLUENȚA ȘI VACCINAREA ÎMPOTRIVA EHV-1 LA MÂNZ

BioEquinFH



BIOSECURITATE

Respectarea regulilor de biosecuritate în combinație cu vaccinarea este cel mai bun mod de a proteja caii:



VACCINAȚI CU RESPECTAREA INTERVALULUI RECOMANDAT DE VACCINARE



EVITAȚI CONTACTUL DIRECT ÎNTRE ANIMALE



SEPARAȚI ANIMALE NECUNOSCUTE ȘI NOU SOSITE



ECHIPAȚI FIECARE CAL CU UN ECHIPAMENT INDIVIDUAL (CURĂȚENIE, ACCESORII DE ȘA)



EVITAȚI ADĂPAREA CAILOR DINTR-UN ADĂPĂTOR COMUN



DEZINFECTAȚI HAIENELE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEA



NU UITAȚI SĂ VĂ SPĂLAȚI PE MÂINI ÎN MOD REGULAR



CURĂȚAȚI ȘI DEZINFECTAȚI MIJLOCUL DE TRANSPORT DUPĂ FIECARE TRANSPORT AL ANIMALELOR



MONITORIZAȚI TEMPERATURA RIDICATĂ A ANIMALULUI



IZOLAȚI ANIMALELE BOLNAVE