



VIGOPHOS

100 mg/ml + 0,05 mg/ml
soluție injectabilă pentru bovine



VIGOPHOS

100 mg/ml + 0,05 mg/ml
soluție injectabilă pentru bovine



Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru tratamentul simptomatic al cetozei secundare (de exemplu, în deplasarea abomasului).

Cantități de administrat și calea de administrare

Pentru administrare intravenoasă.

Bovine: 5 mg butafosfan și 2,5 μ g cianocobalamină per kg greutate corporală, corespunzător cu 5 ml/100 kg greutate corporală pe zi, la intervale de 24 ore, timp de trei zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu este cazul.

TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Bovine:

Carne și organe: zero zile

Lapte: zero ore

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Păstrați flaconul în cutia de carton pentru a-l proteja de lumină.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

Data expirării se referă la ultima zi a lunii respective.

Atunci când un flacon este desigilat (deschis), prima dată trebuie să stabiliți data la care produsul rămas în flacon trebuie eliminat, utilizând data de expirare după deschidere, care este specificată în acest prospect.

Data eliminării trebuie scrisă în spațiul special de pe etichetă.