Carbodote®

ADMINISTRARE CARBODOTE

Administrați cantitatea de produs din seringa dozatoare „dial & dispense”, conform tabelului de mai jos:

Carbodote® Prime

CARBODOTE PRIME se utilizează ca primă intenție și se administrează o singură dată.
Un punct (•) corespunde la 7,8 g de produs.

Carbodote® Repeat

CARBODOTE REPEAT se administrează la fiecare 4-6 ore, timp de 24-48 de ore, atunci când este necesar.
Un punct corespunde (•) la 7,2 g de produs.

Greutatea animalului (kg)	Prime	Repeat
≤ 2	1 •	1 •
2.1 - 4	2 ••	2 ••
4.1 - 6	3 •••	3 •••
6.1 - 8	4 ••••	4 ••••
8.1 - 10	5 •••••	5 •••••
10.1 - 12	6 ••••••	6 ••••••
12.1 - 14	7 •••••••	7 •••••••
14.1 - 16	8 ••••••••	8 ••••••••
16.1 - 18	9 •••••••••	9 •••••••••
18.1 - 20	10 ••••••••••	10 ••••••••••







*Utilizarea catarticelor nu este recomandată la pacienții cu: deshidratare clinică; hipotensiune arterială; diaree; obstrucție gastrointestinală, perforație sau ileus; anomalii electrolitice.
A se utiliza cu prudență la pacienții cu afecțiuni renale sau cardiace preexistente.
Din cauza dimensiunii mici a acestora, nu utilizați catartice la animalele de companie exotice.La pacienții la care utilizarea laxativelor se consideră nepotrivită, înlocuiți Carbodote Prime cu Carbodote Repeat.

AT-033-A4

BistriVet
Everything for vets and farms
www.bistrivet.ro

PART OF THE ANTI-TOX RANGE

tvm
Smart. Inspired.
Essential.

Carbodote®

CARBODOTE GEL: DOZARE RAPIDĂ! ADMINISTRARE UȘOARĂ!



O REVOLUȚIE ÎN MANAGEMENTUL INTOXICAȚIILOR

BistriVet
Everything for vets and farms
www.bistrivet.ro

PART OF THE ANTI-TOX RANGE

tvm
Smart. Inspired.
Essential.

O REVOLUȚIE ÎN MANAGEMENTUL INTOXICAȚIILOR

Singurul duo de seringi cu cărbune activat disponibil în cabinetele medicale

RAPID
- Seringile preumplute "Grab & Go" permit îngrijirea rapidă a unui pacient otrăvit.
- Conțin un laxativ care ajută la eliminarea mai rapidă a toxinelor din tractul gastrointestinal.

ADMINISTRARE UȘOARĂ
- Administrare simplă - numărați punctele, fixați inelul și apăsați ușor pistonul.
- O seringă de 60 ml corspunde la 20 kg / greutate corporală.

IGIENIC
- Formulă unică sub formă de „gel” care nu necesită preparare prealabilă și nu curge!

SIGUR
- Produsele Carbodote sunt de până la 4.5 ori mai adsorbante decât alte produse similare pe bază de cărbune activat.





STEP 1 Prime

1



Prima intenție
unde este necesară administrarea cărbunelui activat în gestionarea intoxicațiilor.

Acțiune combinată a cărbunelui activat și a laxativului.

Se utilizează doar O DATĂ pentru fiecare expunere la toxine.

DE CE UTILIZĂM CATARTICE?

- **Laxativele** osmotice, cum ar fi sulfatul de sodiu, atrag apa în intestinul subțire, accelerând tranzitul intestinal și eliminând toxinele din tractul gastrointestinal mai rapid decât ar face-o doar cărbunele activat.[2]

COMPOZIȚIE: Carbodote® Prime:
Cărbune activat (30%), glicerină, sulfat de sodiu (6,25%)

STEP 2 Repeat



2

- Gel pur de cărbune activat
- Se utilizează atunci când este necesară administrarea repetată

Pasul 2
Administrarea repetată a cărbunelui activat simplu
este adesea necesară, deoarece multe toxine pot persista în tractul gastrointestinal (de ex., ca urmare a recirculării enterohepatice). [1]

Se administrează la fiecare 4-6 ore, timp de 24-48 ore.

COMPOZIȚIE: Carbodote® Repeat:
Cărbune activat (30%), glicerină

1. Study C14-2017/DPh.
2. Orisakwe O.E., and Ogbonna E. (1993). Effect of saline cathartics on gastrointestinal transit time of activated charcoal. Human Exp Toxicol; 12:403 – 405.