

CATALOG PRODUSE ANIMALE DE COMPANIE

BistriVet
Everything for vets and farms

www.bistrivet.ro

BistriVet
Everything for vets and farms

WWW.BISTRIVET.RO

everything for vets and farms.

BISTRI-VET | BistriVet | BISTRI-VET | bistrivet | BistriVet

S.C. BISTRI-VET S.R.L.
Bistrița-Năsăud, 420155 România
Telefon: +40 363 401 304
E-mail: office@bistrivet.ro

Catalogul BistriVet pentru animale de companie

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest catalog fără a anunța în prealabil.
Produsele și informațiile din acest document pot face obiectul unor modificări și/sau variații în ceea ce privește textele și ambalajele prezentate.
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi în orice mod (culoare, aspect, etc.) de imaginile produselor livrate, acestea putând prezenta abateri minore de la pozele și descrierile prezentate în catalog.

BistriVet
Everything for vets and farms

CUPRINS

1 VACCINURI

Biocan NOVEL PUPPY 5
Biocan NOVEL DHPPi 5
Biocan NOVEL DHPPi/L4 5
Biocan NOVEL DHPPi/L4R 6
Biocan NOVEL Pi/L4 6
Biocan NOVEL Respi 7
Biocan NOVEL R 8
Biocan DP 9
Biocan Puppy 9
Biocan DHPPi 9
Biocan L 9
Biocan LR 9
Biocan P 10
Biocan R 10
Biocan B 10
Biocan C 10
Borrelym 3 11
Biocan M 11
Cloteid 4 12
Felibio PCH 12
Felibio PCHR 12
Ser Clostetan 12

2 ANTIBIOTICE

Metrovis 13
Cylanic 14
Enrocat Flavour 15
Clavucil 16
Amoxy-kel 16
Combi-kel 16

3 ANTIINFLAMATOARE

Ficoxil 17
Hedylon 18
Dexa-kel 19
Dexafast 19
Dermipred 20
Meloxidyl 20
Firodyl 21
Carprodyl Quadri 21

4 ANTIPARAZITARE

Milbenin 22
Seliverm 23
Caniverm tabl. 24
Caniverm pastă 24
Fiprin 25
Dixie 26
Deltatic 27
Dr. Peticon 28
Cestal cat 29
Cestal plus 29
Duoflect 30
Top Spot On Stronger 31
Zerokeet 31

5 ANESTEZICE

Nalgosed 33
Narkamon Bio 34
Xilazin Bio 34
Domitor 35
Antisedan 35
Sedan 35
Alvegesic 36

6 ANTIEPILEPTICE

Vetbromide 37

7 SPRAY-URI

Protego 38
Spray amar 39
Spray adeziv 39
Zinkoxid 40
Aluminium spray 41
MP-Plus Zink Spray 41
Charmil multiaction skin pump 42
Charmil Spray 42

8 OTICE

Otibiovin 43
Otofin 43
Biodexin - soluție auriculară 43
Ototop 44

9 OFTALMICE

Ocryl 45
Ocry-gel 46
Viskyal 47
Twelve 47
Clerapliq 48
Fluodrop 48
Stromease 49
Ophtaprime 49

BistriVet
Everything for vets and farms

CUPRINS

10 SUPLIMENTE

Biomix plus Omega 3 50
Kalcevit 51
Immunocan 51
Kittycat 52
β-Caroten&Seaweed 52
Semavit 53
Connecten 53
Cardio Protect 54
MaxiM 54
Allergycalm 55
Relaxcalm 56
Rx Vitamins 56
Relaxan 57
Relaxan Forte 57
Arthromed 58
Ulei de Somon Norvegian 58
Sitalan 59
Oralade Gi+ 60
Oralade RF 61
Oralade ACTIVE 61
Pet Phos canin 62
Pet Phos felin 63

11 IGIENĂ ORALĂ

Dentihex 64
Bucogel 65

12 COSMETICE

Vskin 66
Douxo S3 67
Biodexin Sampon 68

13 UNGUENTE

Alaptid 69
Arthro gel 69
Newcharm gel 70
Charmil gel 70



14 ANTITOX

Carbodote Prime & Repeat 71
Carbodote Liquid 72
Emedog 72

15 HRANĂ

Monge 73
Gemon 74
Opti Life 75

16 ALTE PRODUSE

Galastop 76
Klistier 76
Urocid pastă 76
BisLac Pet 77
Comfort Zone 78
Fluoxevet 79
Litter King așternut pentru pisici 80
Carnet de sănătate înseriat 81
Pașaport pentru animale înseriat 81
Cititor microcip 81
Microcip cu aplicator 81

17 APARATURĂ ȘI USTENSILE MEDICALE

Stetoscop simplu și dublu 82
Microscop trinocular 82
Refractometru urină și proteină MedX 83
Otoscop digital I01 VET 83
Teste QuickBis 84
Ace și fire de sutură 85
Ace Atramat 86
Fire de sutură Atramat 87
Fire de sutură SMI 88
Catetere urinare pentru câini și pisici 89
Capsator/Decapsator agrafe de sutură 89
Lame Bisturiu SMI 89
Mâner bisturiu inox SMI 89
Bandaj autoadeziv / cu gust amar 89
Coliere Elisabetane 90
HSW Seringi plexiglas 91
Seringi cu ac 91
Tub endotraheal 91
Perfuzor/ Perfuzor Y 92
Branule cu valvă 92
Comprese tifon 92
Bandaj elastic autoadeziv 92

bioveta WE respect ANIMALS




SCHEMĂ DE VACCINARE

Biocan®

NOVEL

O nouă generaţie de vaccinuri
inovative menite să confere
cea mai bună protecţie căţeilor

PROTOCOL STANDARD DE VACCINARE



PUPPY

- Parvoviroza
- Boala lui Carré

DHPPi/L4

- Parvoviroza
- Boala lui Carré
- Hepatita Rubarth
- Tusea de canisă
- Leptospiroza

DHPPi/L4R

- Parvoviroza
- Boala lui Carré
- Hepatita Rubarth
- Tusea de canisă
- Leptospiroza
- Rabia

VACCINĂRI ADIŢIONALE

- C — Coronavirus
- B — Borrelia
- T — Tetanos
- M — Microsporum



Biocan NOVEL PUPPY
10 doze/cutie

bioveta

Specii ţintă: câini

Indicaţii:
Imunizarea activă a câinilor, de la vârsta de 6 săptămâni
- prevenirea mortalităţii şi semnelor clinice de boală cauzate de virusul bolii lui Carré
- prevenirea semnelor clinice, leucopeniei şi excreţiei virale cauzate de parvovirusul canin de tip 2a, 2b, 2c

Administrare:
Administrare subcutanată.
Fiecare doză se prepară prin reconstituirea liofilizatului (componentele CDV şi CPV) cu solventul în flacon (apă pentru preparate injectabile). Vaccinul reconstituit se agită uşor şi se administrează imediat, pe cale subcutanată. Se administrează 1 ml de vaccin, de la vârsta de 6 săptămâni, indiferent de greutatea şi rasa animalului.



Biocan NOVEL DHPPI
10 doze/cutie

bioveta

Specii ţintă: câini

Indicaţii:
Imunizarea activă a câinilor în vârstă de cel puţin 6 săptămâni pentru:
- prevenirea mortalităţii şi semnelor clinice de boală cauzate de virusul bolii lui Carré
- prevenirea mortalităţii şi semnelor clinice de boală cauzate de adenovirusul canin tip 1
- prevenirea semnelor clinice cauzate de adenovirusul canin tip 2
- prevenirea semnelor clinice cauzate de parvovirusul canin
- prevenirea semnelor clinice (secreţii oculare şi nazale) cauzate de virusul parainfluenţei canine

Administrare:
Administrare subcutanată
Se reconstituie aseptic liofilizatul cu diluantul. Se agită bine şi se injectează imediat întreg conţinutul (1 ml) de vaccin reconstituit.



Biocan NOVEL DHPPI/L4
10 doze/cutie

bioveta

Specii ţintă: câini

Indicaţii:
Imunizarea activă a câinilor în vârstă de cel puţin 6 săptămâni pentru:
- prevenirea mortalităţii şi semnelor clinice de boală cauzate de virusul bolii lui Carré
- prevenirea mortalităţii şi semnelor clinice de boală cauzate de adenovirusul canin tip 1
- prevenirea semnelor clinice cauzate de adenovirusul canin tip 2
- prevenirea semnelor clinice cauzate de parvovirusul canin
- prevenirea semnelor clinice (secreţii oculare şi nazale) cauzate de virusul parainfluenţei canine
- prevenirea semnelor clinice şi reducerea infecţiilor urinare cauzate de bacteria *L. interrogans,* serogrup Australis, serovar Bratislava
- prevenirea semnelor clinice şi reducerea infecţiilor urinare cauzate de bacteria *L. interrogans,* serogrup Canicola, serovar Canicola şi de bacteria *L. interrogans*, serogrup Icterohaemorrhagiae, serovar Icterohaemorrhagiae
- prevenirea semnelor clinice şi reducerea infecţiilor urinare cauzate de bacteria *L. kirschneri,* serogrup Grippotyphosa, serovar Grippotyphosa

Administrare:
Administrare subcutanată
Schema de vaccinare primară:
- 2 doze de Novel DHPPi/L4 la interval de 3–4 săptămâni, începând cu vârsta de 6 săptămâni.

Rabie: În cazul în care protecţia împotriva rabiei este necesară:
- prima doză: Novel DHPPi/L4 de la vârsta de 8–9 săptămâni.
- a 2-a doză: Novel DHPPi/L4R după 3–4 săptămâni, dar nu înainte de vârsta de 12 săptămâni.



Biocan NOVEL DHPPI/L4R
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii:
Imunizarea activă a câinilor în vârstă de cel puţin 8-9 săptămâni pentru:
- prevenirea mortalităţii şi semnelor clinice de boală cauzate de virusul bolii lui Carré
- prevenirea mortalităţii şi semnelor clinice de boală cauzate de adenovirusul canin tip 1
- prevenirea semnelor clinice cauzate de adenovirusul canin tip 2
- prevenirea semnelor clinice cauzate de parvovirusul canin
- prevenirea semnelor clinice (secreţii oculare şi nazale) cauzate de virusul parainfluenţei canine
- prevenirea semnelor clinice şi reducerea infecţiilor urinare cauzate de bacteria *L. interrogans*, serogrup Australis, serovar Bratislava
- prevenirea semnelor clinice şi reducerea infecţiilor urinare cauzate de bacteria *L. interrogans*, serogrup Canicola, serovar Canicola şi de bacteria *L. interrogans*, serogrup Icterohaemorrhagiae, serovar Icterohaemorrhagiae
- prevenirea semnelor clinice şi reducerea infecţiilor urinare cauzate de bacteria *L. kirschneri*, serogrup Grippotyphosa, serovar Grippotyphosa
- prevenirea mortalităţii, semnelor clinice şi a infecţiilor cauzate de virusul rabic

Administrare:
Administrare subcutanată

Două doze de Novel DHPPi/L4R la 3-4 săptămâni distanţă, începând cu vârsta de 8–9 săptămâni. A doua doză nu trebuie administrată înainte de vârsta de 12 săptămâni.



Biocan NOVEL Pi/L4
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii:
Imunizarea activă a câinilor în vârstă de cel puţin 6 săptămâni pentru:
- prevenirea semnelor clinice (secreţii oculare şi nazale) şi reducerea excreţiei virale cauzate de virusul parainfluenţei canine
- prevenirea semnelor clinice şi reducerea infecţiilor urinare cauzate de bacteria *L. interrogans*, serogrup Australis, serovar Bratislava
- prevenirea semnelor clinice şi reducerea infecţiilor urinare cauzate de bacteria *L. interrogans*, serogrup Canicola, serovar Canicola şi de bacteria *L. interrogans*, serogrup Icterohaemorrhagiae, serovar Icterohaemorrhagiae
- prevenirea semnelor clinice şi reducerea infecţiilor urinare cauzate de bacteria *L. kirschneri*, serogrup Grippotyphosa, serovar Grippotyphosa

Administrare:
Administrare subcutanată
Două doze de Novel Pi/L4 la 3–4 săptămâni distanţă începând cu vârsta de 6 săptămâni.
Revaccinare: O singură doză de Novel Pi/L4 va fi administrată anual.




bioveta WE respect ANIMALS

Biocan NOVEL Respi

O formulă simplă, nedureroasă şi non-invazivă, cu administrare intranazală



- Vaccin viu, atenuat, destinat imunizării active a câinilor împotriva parainfluenţei şi bordeteliozei canine
- Imunitate puternică ce debutează rapid





Debutul imunizării se realizează:
✓ la 3 zile după vaccinarea împotriva infecţiei cu Bordetella bronchiseptica
✓ la 7 zile după după vaccinarea împotriva parainfluenţei
✓ durata imunităţii: 1 an

Ambalare: 5 x 1 doză
La fiecare unitate de ambalare se oferă 5 aplicatoare

RECOMANDAT PENTRU	AVANTAJE	APLICARE INTRANAZALĂ
• Câini ce urmează să participe la expoziţii, concursuri sau diferite manifestări organizate de asociaţiile chinologice • Locuri unde se constată cu regularitate o prezenţă ridicată a câinilor • Saloane de îngrijire a câinilor • Şcoli de dresaj • Creşe, hoteluri de câini	• Vaccinul funcţionează şi în prezenţa anticorpilor maternali • Administrare practică doar într-o singură nară, cu sau fără aplicator • Protecţie pe termen lung până la 1 an • Debut rapid al imunităţii • Vaccinarea este posibilă începând cu a treia săptămână de viaţă • Necesită administrarea unei singure doze • Administrare concomitentă cu alte vaccinuri din gama Novel	• Se recomandă administrarea vaccinului la temperatura camerei • Ţineţi uşor botul câinilor, înclinând capul în sus • Aplicaţi vaccinul lent, fără a irita mucoasa nazală (iritarea poate provoca reflex respirator - strănut) • Vaccinul este potrivit pentru toate rasele de câini

Biocan NOVEL R

bioveta WE respect ANIMALS

Vaccin monovalent inactivat împotriva rabiei la câini

- **Imunitate timp de trei ani după o singură aplicare la căţei mai mari de 12 săptămâni**

AVANTAJE

• **Imunitate ridicată** - se instalează în termen de 2 săptămâni după o singură aplicare şi durează 3 ani

• **Siguranţă** - vaccin inactivat, fără reacţii generale şi locale post-vaccinare

• **Flexibilitatea opţiunilor de vaccinare** - poate fi inclusă în orice schemă de vaccinare pentru a evita administrarea concomitentă a mai multor vaccinuri într-o singură injecţie

• **Adaptabilitate** - la cerinţele locale/naţionale pentru vaccinare antirabică





BIOCAN DP
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii: Pentru imunizarea activă împotriva jigodiei şi parvovirozei la câini, începând cu vârsta de 6 săptămâni.

Administrare: Doza este de 1 ml/animal, indiferent de vârstă, greutate sau rasă; vaccinarea se poate face începând cu săptămâna a 6-a de viaţă.
Modul de administrare – subcutanat.



BIOCAN PUPPY
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii: Pentru imunizarea activă a câinilor împotriva jigodiei şi parvovirozei, începând cu vârsta de 5 săptămâni.

Administrare: Doza – 1 ml de soluţie injectabilă (componenta liofilizată se diluează cu cea lichidă) indiferent de vârsta, greutatea sau rasa animalului; dar nu mai devreme de vârsta de 5 săptămâni.
Modul de administrare – subcutanat.
Animalele vaccinate pentru prima dată trebuie revaccinate în 14 – 21 zile. Pentru menţinerea imunităţii, se recomandă revaccinarea anuală.



BIOCAN DHPPi
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii: Pentru imunizarea activă a câinilor împotriva jigodiei, laringotraheitei infecţioase, hepatitei infecţioase, parvovirozei şi parainfluenţei, începând cu vârsta de 6 săptămâni.

Administrare: Doza este de 1 ml/animal, indiferent de vârstă, greutate şi rasă; prima vaccinare se poate efectua la vârsta de 6 săptămâni.
Calea de administrare – subcutanată



BIOCAN L
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii: Pentru imunizarea activă a câinilor împotriva celor mai frecvent întâlnite serotipuri de leptospire, începând cu vârsta de 8 săptămâni.
Vaccinul conţine cele mai frecvente serovariante de leptospire la câini: *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira canicola* şi *Leptospira grippotyphosa*

Administrare: 1 ml, indiferent de greutatea sau rasa animalului. Metodă de administrare – subcutanat.
Vaccinul Biocan L trebuie administrat începând cu vârsta de 8 săptămâni, iar revaccinarea trebuie efectuată în 14 – 28 zile, astfel ca rapelul să se realizeze la vârsta minimă de 12 săptămâni.



BIOCAN LR
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii: Acest vaccin este destinat imunizării active a câinilor împotriva rabiei şi a celor mai frecvent întâlnite serotipuri de leptospire.

Administrare: Subcutanată, 1 ml indiferent de vârsta animalului, greutate sau rasă.



BIOCAN P
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii: Pentru imunizarea activă a câinilor împotriva parvovirozei

Administrare: Doza este de 1 ml indiferent de vârstă, greutate sau rasa animalului, vaccinul putându-se efectua începând cu săptămâna a 6-a de viaţă.
Modul de administrare – subcutanat



BIOCAN R
10 doze/cutie

Specii ţintă: Câini şi pisici, animale de blană

Indicaţii: Imunizarea activă a speciilor ţintă împotriva rabiei

Doza este de 1 ml, indiferent de vârsta, greutatea sau rasa animalului. Se poate administra începând cu vârsta de 12 săptămâni.
Metode de administrare:
- subcutanată
- intramusculară, preferabil în muşchii membrului pelvin



BIOCAN B
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii:
Pentru imunizarea activă a câinilor începând cu vârsta de 12 săptămâni, împotriva boreliozei (boala Lyme).

Administrare: 1 ml indiferent de vârsta, greutatea şi rasa animalului, dar nu înainte de împlinirea vârstei de 12 săptămâni. Căţelele gestante nu vor fi vaccinate.
Administrare subcutanată, preferabil în regiunea omoplatului.
Administrare intramusculară, preferabil în partea extremă a musculaturii pelvisului.



BIOCAN C
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii: Imunizarea activă a câinilor împotriva coronavirozei canine, începând cu vârsta de 5 săptămâni.

Administare:
Doza: 1 ml indiferent de vârstă, greutate corporală şi rasă. Vaccinul se administrează subcutanat începând cu vârsta de 5 săptămâni; revaccinarea se efectuează la 14 - 21 zile de la prima vaccinare.
Pentru menţinerea permanentă a imunităţii, revaccinarea trebuie efectuată la intervale de 6 luni.

BORRELYM 3

DESPRE VACCINARE

- **Vaccinul împotriva boreliozei la câini produs de Bioveta a. s., producător ceh de produse medicinale veterinare, este singurul vaccin de pe piaţă care conţine cele trei genuri de bacterii – *Borrelia garinii, Borrelia afzelii* şi *Borrelia burgdorferi sensu stricto*;**
- **Vaccinarea este utilizată pentru a proteja câinii împotriva boreliozei – bolii Lyme de la vârsta de 12 săptămâni;**
- **Imunitatea este dezvoltată la o lună după vaccinarea primară, ceea ce înseamnă că două doze sunt administrate la un interval de 14–21 de zile;**
- **Se recomandă revaccinarea anuală pentru a menţine protecţia câinelui împotriva bolii Lyme;**
- **Vaccinul împotriva boreliozei se administrează pe cale subcutanată;**

Cea mai bună perioadă pentru vaccinarea regulată a câinilor împotriva boreliozei – bolii Lyme este înainte de apariţia căpuşelor, adică în lunile noiembrie – martie.





Administrare: Subcutanată, 1 ml începând cu vârsta de 12 săptămâni. Prima vaccinare: administrarea a două doze la interval de trei săptămâni.

Vaccinarea se recomandă înainte de perioada cu risc de infecţie ridicat, permiţând vaccinului să se instaleze corespunzător înainte de apariţia căpuşelor.



BIOCAN M
10 doze/cutie

Vaccin împotriva *Microsporum canis*

Specii ţintă: câini şi pisici

Compoziţia:
Microsporum canis inact. – min. 1 mil. forme vegetative, formaldehidă max. 0,05%, soluţie salină tamponată.

La animalele imunizate se dezvoltă imunitatea într-o lună de la revaccinare şi durează cel puţin un an.
Animalele vaccinate pentru prima dată trebuie revaccinate cel puţin o dată la un interval de 14 – 21 zile. În cazul vaccinării terapeutice, se va efectua o a treia vaccinare, la 18 – 24 zile după revaccinare, dacă este necesar. Imunitatea se formează în decurs de o lună după revaccinare şi durează cel puţin un an.
Vaccinul nu infectează mediul cu sporii virulenţi ai *Microsporum canis* şi, prin urmare, este potrivit pentru eliminarea agentului din populaţia animală sensibilă şi din mediu.

Indicaţii:
De la vârsta de 2 luni, pentru profilaxia şi terapia micozelor pielii la pisici provocate de dermatofitul *Microsporum canis*.
Vaccinul trebuie administrat întotdeauna singur, nu este folosit ca diluant pentru vaccinurile liofilizate sau amestecat cu vaccinuri lichide.

Modalitatea de administrare:
Subcutanată, în zona din spatele omoplatului sau adânc intramuscular în muşchii membrului posterior.



Dozarea: 1 ml, fără a se ţine cont de vârsta, greutatea şi rasa individului.



CLOTEID 4
10 doze/cutie

Specii ţintă: câini

Indicaţii:
Pentru imunizarea activă a câinilor împotriva tetanosului, de la vârsta de 3 luni. Imunizarea începe la 14 - 21 zile de la vaccinare.

Administrare: 1 ml după vârsta de 3 luni. Revaccinarea se realizează după 3 săptămâni.
Mod şi cale de administrare: Intramusculară, după vârsta de 3 luni, cu rapel la 3 săptămâni după prima vaccinare. Imunizarea este activă timp de 2 ani.



FELIBIO PCH
10 doze/cutie

Specii ţintă: pisici

Indicaţii: Pentru imunizarea activă a pisicilor împotriva infecţiei cu virusul panleucopeniei feline, calicivirusului şi herpesvirusului felin. Imunitatea se instalează la 2 – 4 săptămâni de la revaccinare. Imunitatea este de 12 luni.

Administrare: 1 ml, indiferent de rasă, greutate sau vârstă (dar nu la pisici cu vârstă mai mică de 8 săptămâni).
Mod de administrare: subcutanat



FELIBIO PCHR
10 doze/cutie

Specii ţintă: pisici

Indicaţii: Pentru imunizarea activă a pisicilor împotriva infecţiei cu virusul panleucopeniei feline, calicivirusului, herpesvirusului felin şi rabiei.

Administrare: 1 ml, indiferent de rasă, greutate sau vârstă (dar nu la pisici cu vârstă mai mică de 8 săptămâni).
Mod de administrare: subcutanat



SER CLOSTETAN
20 ml

Specii ţintă: câini şi pisici

Indicaţii: pentru imunizarea pasivă în timpul intervenţiilor chirurgicale, în caz de accidentare etc.
În scopuri terapeutice la primele simptome clinice ale tetanosului.

Administrare:
Mod de administrare: subcutanat, intramuscular sau intravenos.
Profilactic: 2 000 – 3 000 UI (7 – 10 ml)
Terapeutic: 20 000 UI (70 ml)

Doza terapeutică se administrează zilnic, timp de 2-3 zile, în funcţie de starea de sănătate a pacientului.

LIVISTO

METROVIS

Metronidazol 100 mg, 250 mg şi
750 mg comprimate pentru câini şi pisici


LARGE OR SMALL, WE CATCH THEM ALL



Indicaţii

- Tratamentul infecţiilor tractului gastrointestinal determinate de *Giardia spp. şi Clostridium spp. (de ex. C. perfringens sau C. difficile).*
- Tratamentul infecţiilor tractului urogenital, cavităţii orale, gâtului şi pielii determinate de bacterii strict anaerobe (de ex. *Clostridium* spp.) susceptibile la metronidazol.

Dozaj: 50 mg/kg greutate corporală o dată pe zi, sau 25 mg/kg greutate corporală de două ori pe zi, timp de 5 - 7 zile.




100 mg

Greutate corporală	Număr comprimate fiecare 12 h	Număr comprimate fiecare 24 h
1 kg	1/4	1/2
2 kg	1/2	1
3 kg	3/4	1+1/2
4 kg	1	2
8 kg	2	4



250 mg

Greutate corporală	Număr comprimate fiecare 12 h	Număr comprimate fiecare 24 h
5 kg	1/2	1
7.5 kg	3/4	1+1/2
10 kg	1	2
15 kg	1+1/2	3
20 kg	2	4



750 mg

Greutate corporală	Număr comprimate fiecare 12 h	Număr comprimate fiecare 24 h
7.5 kg	1/4	1/2
15 kg	1/2	1
30 kg	1	2
45 kg	1+1/2	3
60 kg	2	4

LIVISTO

CYLANIC

Amoxicilină și acid clavulanic
Comprimate pentru câini și pisici



Antibiotice cu spectru larg utilizate în cazuri de:

- Boli de piele (piodermită superficială și profundă)
- Infecții ale țesuturilor moi (abcese și sacculită anală)
- Boli respiratorii (ale tractului respirator superior și inferior)
- Infecții dentare (gingivite)
- Infecții ale tractului urinar
- Enterite

Dozaj: 12,5 mg/kg greutate corporală, de 2 ori/zi

Durata tratamentului
cel puțin 5-7 zile

3,75-5 kg: 1 comprimat	18,75-25 kg: 1 comprimat	37,5-50 kg: 1 comprimat
50/12.5 mg	250/62.5 mg	500/125 mg

1 comprimat acoperă cu 25% mai mult din g. c.

În cazurile cronice sau refractare, ar putea fi necesară o durată mai lungă de tratament

- **Afecțiuni cronice ale pielii**
  10 - 20 zile
- **Cistite cronice:**
  10 - 28 zile
- **Afecțiuni respiratorii:**
  8 - 10 zile

LIVISTO

ENROCAT FLAVOUR

Enrofloxacină 25mg/ml suspensie orală pentru pisici



PENTRU ANIMALE MOFTUROASE

Soluție palatabilă cu aromă umami



90% dintre pisici au manifestat interes pentru ENROCAT FLAVOUR în timpul celor 5 zile de tratament.

100% dintre pisici nu au prezentat salivare după administrare.

DOZARE UȘOARĂ

Seringă specială gradată în ml și în funcție de greutatea corporală a pisicii(kg).

DOZAJ:

5 mg enrofloxacină/kg/24h (0,2 ml/kg/24h)

- Administrare o dată pe zi
- Aplicator ușor de utilizat pentru o dozare precisă
- Tratamentul se administrează, în general, timp de 5-10 zile consecutive.

SIGURANȚA COPIILOR:

- Capac de siguranță conceput pentru a preveni ingerarea accidentală a produsului sau înghițirea capacului de către copii.

CLAVUCIL
50 mg; 250 mg; 500 mg



Substanţă activă: Amoxicilină (ca amoxicilină trihidrat) 200 mg; Acid clavulanic (clavulanat de potasiu) 50 mg, 200 mg şi 500 mg;

Specii ţintă: Câini.

Indicaţii: Tratamentul infecţiilor cauzate de microorganisme sensibile la combinaţia amoxicilină/acid clavulanic, în special:
- Dermatite (superficiale şi profunde), cauzate de *Staphylococcus intermedius*;
- Infecţii ale tractului urinar cauzate de *E. coli*;
- Infecţii ale tractului respirator cauzate de *Streptococcus* spp;
- Enterită cauzată de *E. coli*.

Administrare: orală.
Doza recomandată este de 10 mg amoxicilină/2,5 mg acid clavulanic/kg greutate corporală (= 12,5 mg de substanţe active combinate) de 2 ori pe zi, pe cale orală la câini, respectiv 1 comprimat/20 kg greutate corporală la fiecare 12 ore.

AMOXY-KEL 15%
100 ml



Substanță activă: Amoxicilină trihidrat 150 mg/ml

Indicații:
În tratamentul următoarelor infecții cu tulpini susceptibile, la câini:
- infecții respiratorii
- infecții gastrointestinale
- infecții urogenitale
- infecții și răni ale pielii, abcese, tonsilite, gingivite și otite
- în prevenția infecțiilor postoperatorii

Administrare: Câini: 1 ml/10 kg greutate corporală, timp de 3-5 zile

COMBI-KEL 40
100 ml; 250 ml



Substanță activă:
- Benzilpenicilină procainică 200 mg/ml
- Dihidrostreptomicină sulfat 200 mg/ml

Indicații:
- infecţii ale tractului respirator (bronhopneumonie, pleuropneumonie)
- infecţii urogenitale, endometrice, mastite, meningite
- infecţii ale pielii, abcese, dermatite interdigitale

Administrare: Câini: 0,25 ml/4 kg greutate corporală/zi, timp de 1-7 zile

FICOXIL

Comprimate masticabile cu Firocoxib pentru câini

LIVISTO



Mai puține efecte gastrointestinale adverse[5,6]
Mai puțin decât alte AINS.


Produs hipoalergenic și fără gluten

Comprimate aromate și masticabile
Aromă de vită de origine animală.

Blister perforat
Pentru administrare ușoară.

2 moduri de prezentare pentru toate mărimile
57 mg și 227 mg

Comprimate divizibile
Comprimatele se pot împărți în 2 sau 4 părți egale.



FICOXIL este un inhibitor selectiv COX-2[4]

Obiectivul tratamentului este de a reduce durerile și inflamațiile, menținând astfel mobilitatea și calitatea vieții câinelui.

Molecula de firocoxib prezintă proprietăți analgezice, antiinflamatorii și antipiretice, care au îmbunătățit scorul pe scara de ameliorare a durerii și a inflamației.[2,3]

FICOXIL este indicat pentru a ameliora:

- **Durerile și inflamațiile asociate cu osteoartrita.**
- **Durerile post operatorii și inflamațiile asociate leziunilor țesuturilor moi la câini și în chirurgia ortopedică și dentară.**

DOZE

5 mg per kg greutate corporală o dată pe zi.



DURATA TRATAMENTULUI

Osteoartrită: Având în vedere faptul că studiile din teren au fost limitate la 90 de zile, tratamentul pe termen mai lung trebuie să fie analizat cu atenție și necesită monitorizare obișnuită de către medicul veterinar.

Ameliorarea durerilor postoperatorii: timp de până la 3 zile, după cum este necesar, începând cu 2 ore înainte de operație.

Tratamentul trebuie continuat fără întrerupere timp de până la câteva zile după dispariția completă a simptomelor clinice.

HEDYLON

Comprimate pentru câini şi pisici



Uşor de administrat

- Comprimate divizibile pentru administrare uşoară şi dozare precisă

2 tipuri de concentraţii pentru câini de talie mică, medie, mare şi pisici

Dozaj: 0.5 mg – 2 mg/kg/24h

Indicaţii: Pentru tratamentul simptomatic sau ca tratament adjuvant al bolilor inflamatorii şi mediate imun la câini şi pisici.



La o doză de 0,5 mg/kg:



5 kg = 1/2 comprimat 5 mg

10 kg = 1 comprimat 5 mg

5 mg **Pisici/Câini de talie mică**

La o doză de 0,5 mg/kg:



12.5 kg = 1/4 comprimat 25 mg

25 kg = 1/2 comprimat 25 mg

50 kg = 1 comprimat 25 mg

25 mg **Câini de talie medie şi mare**



DEXA-KEL 0,2% 50 ml

Substanţă activă: Dexametazonă sodiu fosfat 2 mg

Indicaţii:

- în procese inflamatorii non-infecţioase, în special inflamaţii acute musculo-scheletice, precum: artrite, periartrite, tendovaginite, bursite, luxaţii, miozite, osteite şi entorse
- ca medicaţie adjuvantă în bolile infecţioase acute, în asociere cu terapia anti-infecţioasă corespunzătoare
- în condiţii alergice, precum: astm, afecţiuni alergice ale pielii, muşcături de şarpe
- în tratamentul şocului şi condiţiilor de stres (colaps circulator, şoc anafilactic, traumatisme)

Administrare:

- şoc: 5 mg dexametazonă/kg g.v. sau 2,5 ml Dexa-Kel 0,2/kg g.v (injecţie intravenoasă)
- reacţii alergice: 0,1 - 0,4 mg dexametazonă/kg g.v. sau 0,05 - 0,2 ml Dexa-Kel 0,2/kg g.v. (injecţie intramusculară)
- edem cerebral: 2 mg dexametazonă/kg g.v. sau 1 ml Dexa-Kel 0,2/kg g.v.(injecţie intramusculară)



DEXAFAST 2 mg/ml 100 ml

Substanţă activă: Dexametazonă (ca fosfat sodic de dexametazonă) 2 mg

Indicaţii: Tratamentul afecţiunilor inflamatorii sau alergice la câini şi pisici

Administrare: 0,1 mg dexametazonă/kg greutate corporală echivalent cu 0,5 ml/10 kg



DERMIPRED



Compoziție:
Prednisolon 10 mg / 20 mg

Comprimate rotunde, de culoare bej până la maron deschis, cu linie dublu crestată pe o parte.
Comprimatele pot fi divizate în două sau patru părți egale.

Indicații:
Tratamentul simptomatic sau ca tratament adjuvant al afecțiunilor inflamatorii și al dermatitelor imuno-mediate la câini.

Administrare: pe cale orală.
Doza și durata totală a tratamentului este determinată de medicul veterinar pentru fiecare caz în parte, în funcție de severitatea simptomelor. Trebuie utilizată cea mai mică doză eficientă.

Doza inițială:
- pentru dermatitele care necesită o doză antiinflamatoare: 0,5 mg per kg greutate corporală, de două ori pe zi.
- pentru dermatitele care necesită o doză imunosupresivă: 1 – 3 mg per kg greutate corporală, de doua ori pe zi.

Pentru tratamentul de lungă durată: când după o perioadă de dozare zilnică, a fost obținut efectul dorit, doza trebuie redusă până la cea mai mică doză eficientă. Reducerea dozei trebuie făcuta prin terapie cu zi alternativa și/sau prin înjumătățirea dozei la intervale de 5-7 zile până se ajunge la cea mai mică doză eficientă.
De exemplu, pentru un câine de 10 kg care necesită o doză antiinflamatoare de 0,5 mg/kg de două ori pe zi, se administrează o jumătate de comprimat de 10 mg de două ori pe zi.

MELOXIDYL



Compoziție:
Fiecare ml conține:
Meloxicam 1,5mg
Sodium benzoate 2mg

Comprimate rotunde, de culoare bej până la maron deschis, cu linie dublu crestată pe o parte.
Comprimatele pot fi divizate în două sau patru părți egale.

Indicații:
Ameliorarea inflamaţiei şi a durerii în tulburările musculo-scheletale acute şi cronice la câini.

Administrare: pe cale orală.
A se agita bine înainte de folosire. A se administra amestecat în mâncare.

Tratamentul iniţial constă în administrarea în prima zi a unei doze unice de 0,2 mg meloxicam/kg greutate corporală. Tratamentul va continua cu administrarea unei doze de întreţinere zilnice orale (la intervale de 24 ore) de 0,1 mg meloxicam/kg greutate corporală. Suspensia poate fi administrată utilizând seringile gradate aflate în interiorul ambalajului.
Seringa se află fixată pe flacon şi are o scală care corespunde cu doza de întreţinere (0.1mg Meloxicam/kg greutate corporală).
În acest fel pentru prima zi de tratament va fi necesar de două ori volumul pentru întreţinere.
Un răspuns clinic normal se poate observa în 3-4 zile.Dacă nu se observă nici o îmbunataţire clinică, tratamentul trebuie întrerupt după 10 zile.
Pentru a evita contaminările externe în timpul utilizării, nu puneţi conţinutul flaconului în alt recipient şi folosiţi seringile gradate găsite în ambalaj numai pentru acest produs.

FIRODYL



Compoziție:
Firocoxib.....62,5 mg / 250 mg

Tablete palatabile!
Comprimatele se pot divide în sferturi egale.

Indicații:
Pentru ameliorarea durerii și a inflamației asociate cu osteoartrita la câini.
Pentru ameliorarea durerii post operatorii și a inflamației asociate cu intervențiile chirurgicale ale țesuturilor moi, ortopedice și dentare la câini.

Administrare: pe cale orală.
Se administrează 5 mg/kg greutate corporală, 1 dată pe zi conform tabelului de mai jos.
Pentru reducerea inflamației și durerilor post-operatorii, animalele pot fi tratate timp de pana la 3 zile cât este nevoie, începând cu aproximativ 2 ore înaintea operației.
La recomandarea medicului veterinar, după operația ortopedică, în funcție de răspunsul observat, tratamentul poate fi continuat și după primele 3 zile, cu doza zilnică recomandată.

Greutate corporală (kg)	Număr de comprimate		Interval de doze (mg/kg GC)
	62,5 mg	250 mg	
3,1	0,25		5,0
3,2–6,2	0,5		5,0–9,8
6,3–9,3	0,75		5,0–7,4
9,4–12,5	1	0,25	5,0–6,6
12,6–15,5	1,25		5,0–6,2
15,6–18,5	1,5		5,1–6,0
18,6–21,5	1,75		5,1–5,9
21,6–25		0,5	5,0–5,8
25,1–37,5		0,75	5,0–7,5
37,6–50		1	5,0–6,6
50,1–62,5		1,25	5,0–6,2
62,6–75		1,5	5,0–6,0
75,1–87,5		1,75	5,0–5,8
87,6–100			

CARPRODYL Quadri




Compoziție:
Carprofen..... 50 mg / 120 mg
Comprimatul poate fi divizat în patru sferturi.

Indicații:
Reducerea inflamației și durerii cauzate de afecțiunile sistemului musculo-scheletic și de bolile degenerative articulare.
În managementul durerii post-operatorii ca o continuare a analgeziei parenterale.

Administrare: pe cale orală.
Doza inițială este de 4 mg carprofen/kg greutate corporală/zi, administrat într-o doză unică zilnic.
Efectul analgezic al fiecărei doze persistă pentru cel puțin 12 ore.
Doza zilnică poate fi redusă în funcție de răspunsul clinic.
Ca analgezic în durerile post-operatorii, tratamentul pre-operator cu produse medicinale veterinare injectabile care conțin carprofen, poate fi urmat de administrarea de carprofen comprimate, în doză de 4 mg /kg greutate corporala/zi timp de 5 zile.

Un comprimat nou



50 & 120 mg

Doze și concentrații noi

CARPRODYL QUADRI	Un comprimat pentru un câine de:
50 mg	12.5 - 15.5 kg
120 mg	30 - 37.4 kg

Ușor de divizat



MILBENIN

comprimate aromatizate pentru câini



2,5 mg/25 mg

comprimate masticabile pentru câini de talie mică și căței



12,5 mg/125 mg

comprimate masticabile pentru câini

Dozare:
Doza minimă recomandată: 0,5 mg de milbemicin oximă și 5 mg de praziquantel pe kg care se administrează o dată.
Produsul trebuie administrat cu sau după o cantitate de hrană.

Substanțe active:

2,5 mg **Milbemicin oximă** 12,5 mg **Milbemicin oximă**
25,0 mg **Praziquantel** 125,0 mg **Praziquantel**

Indicații:

Prevenirea bolii viermilor cardiaci:
- *Dirofilaria immitis**

Cestode:
- *Dipylidium caninum*
- *Taenia spp.*
- *Echinococcus spp.*
- *Mesocestoides spp.*

Nematode:
- *Ancylostoma caninum*
- *Toxocara canis*
- *Toxascaris leonina*
- *Trichuris vulpis*
- *Crenosoma vulpis*
- *Angiostrongylus vasorum**

(paraziți în stadiul de adult imatur (L5) și adult)
- *Thelazia callipaeda**

* a se vedea schema de tratament și de prevenire a bolii în prospect

Doza recomandată:

Dozare: MILBENIN	Greutate	MILBENIN 2,5 mg/25 mg comprimate masticabile pentru câini de talie mică și căței	MILBENIN 12,5 mg/125 mg comprimate masticabile pentru câini
	1-5 kg	1 comprimat masticabil	
	> 5 - 25 kg		1 comprimat masticabil
	25 - 50 kg		2 comprimate masticabile
	> 50 - 75 kg		3 comprimate masticabile



WE respect ANIMALS

SELIVERM

SPOT-ON • selamectina

bioveta







CANIVERM



Compoziţie:
1 comprimat – 0,175 g:
Fenbendazol 37,5 mg, Pirantel embonat 36 mg, Praziquantel 12,5 mg.

6 × 0,175 g
100 × 0,175 g



Compoziţie:
1 comprimat – 0,7 g:
Fenbendazol 150 mg, Pirantel embonat 144 mg, Praziquantel 50 mg

6 × 0,7 g
100 × 0,7 g

Administrare:

Căţei, câini de talie mică şi pisici:
- 1 comprimat 0,175 g per 0,5 – 2 kg greutate corporală
- ½ comprimat 0,7 g sau 2 comprimate 0,175 g per 2 – 5 kg greutate corporală

Câini de talie mijlocie:
- 1 comprimat 0,7 g sau 4 comprimate 0,175 g per 5 – 10 kg greutate corporală

Câini de talie mare:
- 1 comprimat 0,7 g pentru fiecare 10 kg greutate corporală

ACUM CU AROMĂ DE SARDINĂ

CANIVERM PASTĂ
4 ml; 10 ml



Compoziţie:
- Fenbendazol 75 mg
- Pirantel embonat 72 mg
- Praziquantel 25 mg

Indicaţii: Boli cauzate de helminţi la câini şi pisici (*Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multi-locularis, Dipylidium caninum, Taenia* spp., *Multiceps multiceps, Mesocestoides* spp.).

Administrare:
Pisică:
•0.5 ml de pastă per 0.5 - 2 kg greutate corporală
•1 ml de pastă per 2.1 - 5 kg greutate corporală

Câine:
•0.5 ml de pastă pentru 0.5 - 2 kg greutate corporală
•1 ml de pastă pentru 2.1 - 5 kg greutate corporală
şi apoi 1 ml de pastă pentru fiecare 5 kg greutate corporală

FIPRIN

spot-on

luptă nu numai cu puricii și căpușele...

Substanță activă: fipronil



bioveta

WE respect ANIMALS

Ambalaj:

- 3 pipete cu o singură doză
- 25 pipete cu o singură doză





- Eficiență înaltă
- Produs sigur
- Aplicare ușoară
- Etichetă autocolantă detașabilă pentru carnetul de vaccinare

Omoară eficient căpușele, puricii, păduchii malofagi, protejând astfel nu numai animalele, dar și oamenii împotriva infecțiilor transmise de purici și căpușe.



Protecție de până la 30 zile împotriva căpușelor și a păduchilor malofagi



Protecție de până la 60 zile împotriva puricilor

SOLUȚIE ANTIPARAZITARĂ SPOT ON

pentru câini și pisici

FIPRONIL

dixie

TRATAMENTUL ȘI PREVENIREA INFESTAȚIILOR CU PURICI ȘI CĂPUȘE

Dozare în funcţie de greutatea corporală

Greutate corporală	Doză
2 -10 kg	pipetă 0,67 ml
10 – 20 kg	pipetă 1,34 ml
20 – 40 kg	pipetă 2,68 ml
40 – 60 kg	pipetă 4,02 ml
Pisici	pipetă 0,50 ml



DELTATIC

Zgardă (medicamentată) cu deltametrin pentru câini



PROTECȚIE CU SPECTRU LARG

Infestații cu căpușe
6 luni de protecție

Mușcături de țânțari
6 luni de protecție

Infestații cu purici
4 luni de protecție







3 mărimi diferite



Dr.Peticon

NON-TOXIC SIGUR FĂRĂ INSECTICIDE

PROTECȚIE ANTIPARAZITARĂ ÎMPOTRIVA PURICILOR ȘI CĂPUȘELOR CU EFECT ÎNDELUNGAT

DIMETICONĂ

ZGARDĂ ANTIPARAZITARĂ

pentru câini și pisici

PIPETE SPOT ON

pentru câini și pisici



ALTERNATIVA IDEALĂ PENTRU PRODUSELE ANTIPARAZITARE MEDICAMENTOASE



Cestal Cat

Tablete antiparazitare palatabile
pentru pisici



Compoziție:
Praziquantel..... 20 mg
Pirantel..... 80 mg
Fiecare comprimat poate fi divizat în două părți egale.

Indicații:
Pentru tratamentul la pisici a infestațiilor cu viermi lați și viermi rotunzi, cauzate de următorii paraziți:
Ascarizi: *Toxocara cati, Toxascaris leonina* (adulți și forme imature);
Strongili: *Ancylostoma tubaeforme*;
Tenii: *Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum* (adulți și forme imature) *Joyeuxiella spp*;

Administrare: pe cale orală.
Dozele recomandate sunt: 20,0 mg pirantel (echivalent 57,5 mg / kg pirantel embonat) și 5 mg / kg praziquantel.
Acest lucru este echivalent cu 1 comprimat pe 4 kg de greutate corporală.

Greutate corporală (kg)	Număr de comprimate
1	½
>2.0 - ≤4.0	1
>4.0 - ≤6.0	1 ½
>6.0 - ≤8.0	2



Cestal plus

Tablete antiparazitare palatabile
pentru câini



Compoziție:
Praziquantel..... 50.0 mg
Pyrantel embonat..... 144.0 mg
Fenbendazol..... 200.0 mg
Fiecare comprimat poate fi divizat în două părți egale.

Indicații:
Cestal Plus este recomandat la câini pentru tratamentul infestării cu viermi lați (cestode) și viermii cilindrici (nematode), inclusiv:
Ascarizi: *Toxocara canis, Toxascaris leonina* (forme adulte și forme imature);
Strongili: A*ncylostoma caninum, Uncinaria stenocephala* (forme adulte);
Trichocephalidae: *Trichuris vulpis* (forme adulte);
Viermi lați: *Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum* (forme adulte și forme imature);

Administrare: pe cale orală.
1 tabletă / 10 kg greutate vie, după cum urmează :
Produsul se administrează oral în următoarele doze:
1 comprimat pe 10 kg greutate corporală, ceea ce corespunde cu următoarele cantități de substanțe active: praziquantel 5 mg/kg, pyrantel embonat 14,4 mg/kg, fenbendazol 20 mg/kg.

Căței și câini de talie mică:
< 2 kg g.c. = 1/4 comprimat
2-5 kg g.c. = 1/2 comprimat
5-10 kg g.c. = 1 comprimat

Câini de talie medie:
10-20 kg g.c. = 2 comprimate
20-30 kg g.c. = 3 comprimate

Câini de talie mare:
30-40 kg g.c. = 4 comprimate
40-50 kg g.c. = 5 comprimate

DUOFLECT

Soluție spot-on pentru tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici și/sau căpușe



Indicații:
Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici și/sau căpușe.

Câini:
- Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*).
Eficacitatea insecticidă imediată împotriva infestațiilor noi cu purici adulți, persistă timp de 9 săptămâni. Prevenirea multiplicării puricilor prin inhibarea eclozionării ouălor de purici (activitate ovocidă) și dezvoltarea de purici adulți din ouă, persistă timp de 8 săptămâni după aplicare.

- Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu căpușe (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*).
Produsul are un efect acaricid imediat și persistent timp de 6 săptămâni după aplicare.

Pisici:
-Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*).
Eficacitatea insecticidă imediată împotriva infestațiilor noi cu purici adulți persistă timp de 8 săptămâni. Prevenirea multiplicării puricilor prin inhibarea eclozionării ouălor de purici (activitate ovocidă) și dezvoltarea de purici adulți din ouă persistă timp de 6 săptămâni după aplicare.

-Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu căpușe (*Rhipicephalus turanicus*). Produsul are un efect acaricid imediat și persistent timp de 5 săptămâni după aplicare.

Produsul poate fi utilizat în cadrul strategiei de tratament pentru controlul dermatitei alergice la purici (DAP) atunci când a fost diagnosticată de un medic veterinar.



TOP SPOT ON STRONGER



Compoziţie: Substanţă activă: Permetrină 650 mg
Substanţe auxiliare: Butilparaben 1 mg,
Butilhidroxianisol 0,2 mg,
Butilhidroxitoluen 0,1 mg,
Dietilenglicol monoetilic 125 mg,
Propilenglicol lauricum ad 1 ml

Specii ţintă: Câini

Administrare:

Sub 15 kg – aplicaţi conţinutul unei pipete (1 ml) pe piele, între omoplaţii animalelor mici (Dog S, sau o pipetă din pachetul mare).

Între 15 şi 30 kg – aplicaţi conţinutul a două pipete (2 x 1 ml) pe pielea dintre omoplaţi şi baza urechii la câinii de talie mijlocie (Dog M sau 2 pipete din ambalajul mare).

Peste 30 kg – aplicaţi conţinutul a 3 pipete (3 x 1 ml) pe pielea dintre omoplaţi, jumătatea spatelui şi baza urechii la câinii de talie mare (Dog L sau 3 pipete din ambalajul mare).

Indicaţii: Tratamentul infestaţiilor cu purici (*Ctenocephalides felis*) şi prevenirea reinfestării cu purici prin efectul insecticid de până la 5 săptămâni.
Produsul previne infestaţiile noi cu căpuşe *Rhipicephalus sanguineus*.
Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei pentru tratamentul dermatitei alergice provocate de purici (DAP).

ZEROKEET
100 ml



Compoziţie:
Fiecare 10 ml conţine (în g): *Cedrus deodara* 2.0, *Pongamia glabra* 0.50, *Azadirachta indica* 0.30, *Acorus calamus* 0.20, *Eucalyptus globulus* 0.20, Baze de absorbţie q.s.

Administrare:
Aplicarea pe întregul corp (diluţie până la 1/2 în apă) la intervale săptămânale până la recuperarea completă. Zerokeet se aplică o dată pe zi în cazul leziunilor, unde sunt prezente.
Alte afecţiuni cutanate - diluţie 1/2 până la 1/4 în apă, în funcţie de severitatea afecţiunii.

Indicaţii:
Omoară toţi puricii şi căpuşele în câteva minute. Previne infestarea.

NARKAMON BIO 100 mg/ml
Soluţie injectabilă pentru câini, pisici, cai şi măgari conţinând ketamină
Ambalaje: 10 ml, 50 ml



NALGOSED 10 mg/ml
Produs ce conţine butorfanol, un opioid ce acţionează la nivel central, el fiind indicat pentru analgezie, sedare şi preanestezie.
Ambalaje: 10 ml



XYLAZIN BIO 2% inj.
Sedativ, analgezic, miorelaxant
Ambalaje: 50 ml



Includerea produselor NALGOSED şi NARKAMON în protocoalele de anestezie

GREUTATEA VIE A CÂINELUI (kg)	ANALGEZIE 0,2 – 0,3 mg/kg NALGOSED 10 mg i.m. (ml)	SEDARE + ANALGEZIE 1+2		Introducere în analgezie prin inhalare 1+2+ Propofol 10 mg/ml, 1–4 mg/kg (ml)	Anestezie pe termen scurt 1+2+ Propofol 10 mg/ml, 1–4 mg/kg (ml)	ANESTEZIE 1+2+ NARKAMON 100 mg/ml po 15 min. i.m. Ketamină 5 mg/kg (ml)
		0,01 – 0,025 mg/kg Medetomidin 1mg/ml i.m. (ml)	Butorfanol 0,1 mg/kg NALGOSED 10 mg/ml i.m. (ml)			
1	0,03	0,02	0,01	0,25	0,15	0,05
2	0,05	0,04	0,02	0,50	0,25	0,10
3	0,075	0,06	0,03	0,75	0,40	0,15
4	0,100	0,08	0,04	1,00	0,50	0,20
5	0,125	0,10	0,05	1,25	0,65	0,25
6	0,150	0,12	0,06	1,50	0,75	0,30
7	0,175	0,14	0,07	1,75	0,90	0,35
8	0,20	0,16	0,08	2,00	1,00	0,40
9	0,25	0,18	0,09	2,25	1,20	0,45
10	0,30	0,20	0,10	2,50	1,25	0,50
12	0,35	0,24	0,12	3,00	1,50	0,60
14	0,40	0,28	0,14	3,50	1,75	0,70
16	0,45	0,32	0,16	4,00	2,00	0,80
18	0,50	0,36	0,18	4,50	2,25	0,90
20	0,55	0,40	0,20	5,00	2,50	1,00
22	0,60	0,45	0,22	5,50	3,00	1,10
24	0,65	0,45	0,25	6,00	3,00	1,20
26	0,70	0,50	0,25	6,50	3,25	1,30
28	0,75	0,55	0,30	7,00	3,50	1,40
30	0,80	0,60	0,30	7,50	3,75	1,50
32	0,95	0,65	0,35	8,00	4,00	1,60
34	1,00	0,65	0,35	8,50	4,25	1,70
36	1,10	0,70	0,35	9,00	4,50	1,80
38	1,15	0,75	0,40	9,50	4,65	1,90
40	1,20	0,80	0,40	10,00	5,00	2,00
42	1,25	0,80	0,45	10,50	5,25	2,10
44	1,30	0,85	0,45	11,00	5,50	2,20
46	1,35	0,90	0,45	11,50	6,00	2,30
48	1,45	0,95	0,50	12,00	6,00	2,40
50	1,50	1,00	0,50	12,50	6,55	2,50
55	1,65	1,10	0,55	13,75	7,00	2,75
60	1,80	1,20	0,60	15,00	7,50	3,00
65	1,95	1,30	0,65	16,25	8,00	3,25
70	2,10	1,40	0,70	17,50	9,00	3,50
75	2,25	1,50	0,75	18,75	9,50	3,75
80	2,40	1,60	0,80	20,00	10,00	4,00

NALGOSED 10 mg/ml



Compoziţie:
1 ml preparat conţine 10 mg butorfanol

Indicaţii:

CÂINE:

Analgezic: Atenuarea durerii uşoare până la intense legate de procedurile post-operatorii, mai ales în urma operaţiilor ortopedice sau ale ţesuturilor moi.
Sedativ: În combinaţie cu medetomidina clorhidrat.
Preanestezic: Administrarea preparatului în preanestezie reduce doza totală de anestezice, mai ales a tiopentalului de sodiu. Preparatul se administrează ca parte integrantă a protocolului anestezic în combinaţie cu clorhidrat de ketamină.

PISICĂ:

Analgezic: Atenuarea durerilor uşoare până la intense legate de procedurile chirurgicale, mai ales în urma intervenţiei de castrare, în urma operaţiilor ortopedice sau a operaţiilor ţesuturilor moi.
Sedativ: În combinaţie cu medetomidina clorhidrat.
Preanestezic: Administrarea preparatului în preanestezie reduce doza totală de anestezice, mai ales a tiopentalului de sodiu. Preparatul se administrează ca parte integrantă a protocolului anestezic în combinaţie cu clorhidrat de ketamină.

Administrare:

CÂINE

Ca analgezic:
• butorfanol singur: Aplicaţi în doză de 0,2–0,3 mg/kg g.v., ceea ce corespunde unei doze de 0,02–0,03 ml preparat/kg g. v., deci 0.2–0,3 ml preparat/10 kg g. v. i. v., i. m. sau s.c.

Ca sedativ:
• butorfanol în combinaţie cu medetomidina: Aplicaţi butorfanol în doză de 0,1 mg/kg g. v., ceea ce corespunde unei doze de 0,01 ml preparat/kg g.c. i. v. sau i. m. Aplicaţi imediat medetomidina clorhidrat în doză de 0,01–0,025 mg/kg g.c. i.v. sau i.m.
Ca preanestezic:
• butorfanol singur: Aplicaţi în doză de 0,1–0,2 mg/kg g.c., ceea ce corespunde unei doze de 0,01–0,02 ml preparat/kg g. v. i. v., i. m. sau s.c.
Ca sedativ şi preanestezic – premedicaţie la anestezia cu barbiturice:
• butorfanol în combinaţie cu medetomidina: Aplicaţi butorfanol în doză de 0,1 mg/kg g. v., ceea ce corespunde unei doze de 0,01 ml preparat/kg g. v. i. v. sau i. m. Imediat apoi, aplicaţi medetomidină clorhidrat în doză de 0,01 mg/kg g. v. i. m.
Ca parte integrantă a protocolului anestezic:
• butorfanol în combinaţie cu medetomidina şi ketamina: Aplicaţi butorfanol în doză de 0,1 mg/kg g. v., ceea ce corespunde unei doze de 0,01 ml preparat/kg g. v. i. m. Imediat apoi aplicaţi medetomidină clorhidrat în doză de 0,025 mg/kg g.v.. i. m. După 15 min. aplicaţi ketamina în doză de 5 mg/kg g. v. i. m.

PISICĂ

Ca analgezic preoperativ:
• butorfanol singur: Aplicaţi în doză de 0,4 mg/kg g. v., ceea ce corespunde unei doze de 0,04 ml preparat/kg g. v., deci 0,2 ml/5 kg g. v. i. m. sau s.c. La utilizarea inducţiei anesteziei intravenoase aplicaţi butorfanolul cu 15–30 min. înainte de aplicarea anesteziculuI.
La utilizarea inducţiei anesteziei intramusculare (acepromazin-ketamină, sau xylazin-ketamină) aplicaţi butorfanolul la 5 min. înainte de aplicarea anesteziculuI. Prin utilizarea butorfanolului, timpul de trezire nu este influenţat în niciun fel.
Ca analgezic postoperativ: administrare intramusculară, subcutanată: Aplicaţi butorfanolul singur în doză de 0,4 mg/kg g.v., ceea ce corespunde unei doze de 0,04 ml preparat/kg g. v., deci 0,2 ml/5 kg g. v. s.c. sau i. m.
administrare intravenoasă: Aplicaţi butorfanolul singur în doză de 0,1 mg/kg g. v., ceea ce corespunde unei doze de 0,01 ml preparat/kg g. v., deci 0,05 ml preparat/5 kg g. v. i. v.
Ca sedativ:
• butorfanol în combinaţie cu medetomidina: Aplicaţi butorfanol în doză de 0,4 mg/kg g. v., ceea ce corespunde unei doze de 0,04 ml preparat/kg g. v. i. m. sau s.c. Imediat apoi aplicaţi medetomidină clorhidrat în doză de 0,05 mg/kg g. v. s.c. sau i.m.
Pentru utilizarea la sutura inciziilor chirurgicale ar trebui utilizată anestezie locală.
Ca parte integrantă a protocolului anestezic:
• butorfanol în combinaţie cu medetomidina şi ketamina:
Administrare intravenoasă: Aplicaţi butorfanol în doză de 0,1 mg/kg g. v., ceea ce corespunde unei doze de 0,01 ml preparat/kg g. v. i. v. Imediat apoi aplicaţi medetomidină clorhidrat în doză de 0,04 mg/kg g. v. i. v. şi ketamină în doză de 1,25–2,5 mg/kg g. v. i. v.; dozaţi ketamina în funcţie de intensitatea necesară a anesteziei.

Administrare intramusculară: Aplicaţi butorfanol în doză de 0,4 mg/kg g. v., ceea ce corespunde unei doze de 0,04 ml preparat/kg g. v. i. m. Imediat apoi aplicaţi medetomidină clorhidrat în doză de 0,08 mg/kg g. v. i. m. şi ketamină în doză de 5 mg/kg g. v. i. m.

NARKAMON BIO 100 mg/ml



Compoziţie (1 ml):
Substanţă activă:

Ketamină	100,0 mg
(sub formă de clorhidrat de ketamină)	115,4 mg

Indicaţii:
Anestezie generală de scurtă durată pentru diagnostic şi intervenţii terapeutice la câini, pisici, cai şi măgari.

Administrare:

Câini

Monoanestezie: 0,1 – 0,2 ml produs/kg greutate corporală (echivalent cu 10 – 20 mg ketamină/kg greutate corporală), pe cale intramusculară.

Opţiuni de combinare: atropină 0,05 mg/kg greutate corporală, i.v., i.m. sau s.c. împreună cu acepromazină în doză de 0,1 mg/kg greutate corporală, iar după efectul lor de iniţiere se administrează NARKAMON BIO 100 mg/ml soluţie injectabilă, în doză de 0,2 ml/10 kg greutate corporală (echivalent cu 2 mg ketamină/kg greutate corporală) pe cale i.v..

Altă opţiune: atropină 0,05 mg/kg greutate corporală împreună cu xylazină în doză de 2 mg/kg greutate corporală i.m., iar după efectul lor de iniţiere se administrează NARKAMON BIO 100 mg/ml soluţie injectabilă, în doză de 0,05 - 0,1 ml/ kg greutate corporală (echivalent cu 5 - 10 mg ketamină/kg greutate corporală) pe cale i.m..

Pisici

Monoanestezie: 0,2-0,4 ml produs/kg greutate corporală (echivalent cu 20 – 40 mg ketamină/kg greutate corporală), pe cale intramusculară.

Anestezie combinată: 0,1 – 0,2 ml produs/kg greutate corporală (echivalent cu 10 – 20 mg ketamină/kg greutate corporală), pe cale intramusculară.

Opţiuni de combinare: pentru a reduce salivaţia, atropină 0,05 mg/kg greutate corporală împreună cu acepromazină în doză de 0,1-0,15 mg/kg greutate corporală. După instalarea efectului lor, se administrează NARKAMON BIO 100 mg/ml soluţie injectabilă, în doză de 0,2 ml/kg greutate corporală (echivalent cu 20 mg ketamină/kg greutate corporală) intramuscular sau atropină împreună cu xylazină în doză de 0,1 ml/kg greutate corporală (2 mg/kg greutate corporală) i.m. sau s.c., iar după efectul lor de iniţiere se administrează NARKAMON BIO 100 mg/ml soluţie injectabilă, în doză de 0,1 ml/kg greutate corporală (echivalent cu 10 mg ketamină/kg greutate corporală) pe cale intramusculară.

XYLAZIN BIO 2% 50 ml



Compoziţie (1 ml):
Ingredient activ medicinal:
Xilazină 20 mg (echivalent cu 23,31 mg xilazină clorhidrat)

Indicaţii:
Câini, pisici: sedare. Se utilizează în combinaţie cu alte substanţe pentru analgezie, anestezie şi miorelaxare.

Administrare:
XYLAZIN BIO 2% se administrează intravenos, intramuscular sau subcutanat.

Intramuscular dozele sunt:
Câini: 0,5-1 ml produs/10 kg greutate corporală (1-2 mg xilazină / kg greutate corporală).

Pisici: 0,1-0,2ml produs/kg greutate corporală (1-2 mg xilazină/kg greutate corporală i.m. sau subcutanat

Intravenos:
Câini: 0,25-0,5 ml produs/10 kg greutate corporală (0,5-1 mg xilazină/kg greutate corporală).
Intravenos:
În combinaţie, respectiv, premedicaţie la câini: atropină 0,05-0,10 mg/kg g.c. i.m., xilazină 1-2 mg/kg g.c. i.m., ketamină 8-20 mg/kg g.c. i.m.

DOMITOR 10 ml

Compoziţie:
1 ml soluţie injectabilă conţine:

clorhidrat de medetomidină.....1 mg
metil-4-hidroxibenzoat.....1 mg
propil-4-hidroxibenzoat.....0,2 mg



Indicaţii:
Câini: sedarea în scop de investigaţii (investigaţii clinice, radiografii).
Ca premedicaţie pentru soluţii narcotice administrate injectabil sau sub formă de inhalaţii în cazul câinilor şi al pisicilor (pentru detalii a se vedea instrucţiunile de dozare).

Administrare:
CÂINI: 10 - 80 mcg/kg intramuscular
PISICI: 10 - 150 mcg/kg

Pentru mai multe informaţii despre DOZAJ şi MOD DE ADMINISTRARE consultaţi prospectul.

ANTISEDAN 10 ml

Compoziţie:
1 ml soluţie injectabilă conţine: 5 mg clorhidrat de atipamezol, 1 mg metil – 4 – hidroxibenzoat



Indicaţii:
În cazul clorhidratului de atipamezol este vorba despre un antagonist alfa 2 specific care are ca efect îndepărtarea efectului sedativ al clorhidratului de medetomidină la câini. Faza de trezire este astfel redusă la aprox. 5 minute. După aproximativ 10 minute pacientul se poate deplasa.

Administrare:
Administrarea se realizează intramuscular într-o doză de 5 ori mai mare (în micrograme/kg) faţă de sedativul administrat anterior clorhidratului de medetomidină (Domitor).

Antisedan are o concentraţie de cinci ori mai mare decât Domitor, motiv pentru care se administrează aceleaşi volume din ambele produse pentru a obţine acelaşi efect

Clorhidratul de Atipamezol se administrează în general la 15–60 minute după clorhidratul de medetomidină.

SEDAN 35 mg/ml 1x10 ml



Substanţa activă:
Acepromazină 35,0 mg

Indicaţii:
-Sedarea animalelor din motive de neliniște, nervozitate, tetanos, lumbago
-Sedare cu scopul de a imobiliza animalele înaintea unei examinări clinice și în timpul tratamentului
-Sedare înainte de transportul animalelor (reducerea stresului de transport)
-Acționează și ca antiemetic (la narcoză, în timpul călătoriei)
-După intervenții chirurgicale grave, atunci când animalul trebuie menținut într-o stare de sedare pentru o perioadă mai lungă de timp

Administrare:
Utilizare orală.
Produsul se administrează direct în gura animalului, sau poate fi amestecat în hrana acestuia.

Câini:

Cantitate produs	*Greutatea câinelui*			
	17,5 kg	*35 kg*	*52,5 kg*	*70 kg*
Sedare uşoară (1,0 mg acepromazină/kg g.c.)	0,5 ml	1,0 ml	1,5 ml	2,0 ml
Sedare medie (2,0 mg acepromazină/kg g.c.)	1,0 ml	2,0 ml	3,0 ml	4,0 ml
Premedicaţie anestezică (3,0 mg acepromazină/kg g.c.)	1,5 ml	3,0 ml	4,5 ml	6,0 ml

ALVEGESIC VET 10 MG/ML

VMD Livestock pharma

Butorfanol 1%, soluţie injectabilă sub formă de Tartrat de butorfanol



Gently drift away

DOZAJ	MOD DE ADMIN.	ANALGESIC	SEDATIV
Câini	IM, IV, SC	0.02 mL/kg greutate corporală	0.01 mL/kg greutate corporală
Pisici	IM, SC	0.04 mL/kg greutate corporală	0.04 mL/kg greutate corporală
	IV	0.01 mL/kg greutate corporală	0.01 mL/kg greutate corporală

Utilizare

Pre-anestezie
- Între 0.01 şi 0.02 ml/kg greutate corporală la câini
- 0.04 ml/kg greutate corporală la pisici
- Efect în **15-20 minute**
- Posibilă asociere cu un calmant

Sedare
- **Câini:** doar Alvegesic
- **Pisici:** doar Alvegesic, sau în asociere cu un anestezic local

Anestezie
- În asociere cu **Medetomidina-Ketamina** la câini şi pisici, respectând protocoalele produselor

Analgezia
- Analgezia viscerală la speciile ţintă
- Efect în 15 minute
- Durata: 2 ore
- Posibilitatea readministrării

Analgezia (Post)
- o administrare cu 15 minute înainte de trezire pentru prevenirea durerilor post-operatorii

VETBROMIDE

600 mg
Comprimate pentru câini



Compoziție:
Fiecare comprimat conține:
Substanța activă:
600 mg de bromură de potasiu

Indicații:
Vetbromide este un agent epileptic indicat în vederea controlării crizelor epileptice idiopatice, fie în monoterapie, fie ca medicament asociat la fenobarbital în vederea controlării cazurilor refractate de epilepsie idiopatică.

Specii țintă:
Câini



Administrare:
Orală.
Administraţi de două ori pe zi cu alimente pentru a reduce riscul de iritaţie gastrointestinală.

La câinii cu crize epileptice severe şi frecvente sau când un câine este schimbat rapid de la fenobarbital la bromura de potasiu, se poate administra o doză de încărcare de 60 mg/kg greutate corporală de două ori pe zi, timp de 5 zile (echivalent cu o doză zilnică totală de 120 mg/kg) pentru a atinge rapid concentraţiile serice terapeutice.

Pentru mai multe informații despre DOZAJ și MOD DE ADMINISTRARE consultați prospectul.

Comprimate divizibile



Vetbromide comprimate
poate fi împărțit în
2 sau 4 părți egale
pentru o dozare precisă și ușoară.

- Flexibilitate mai mare
- Dozare optimă și precisă
- Ideal pentru câini de talie mare și mică



PROTEGO

LIVISTO

SPRAY PUDRĂ

Sprayul pudră Protego cu microgranule îngrijește local zonele cutanate foarte solicitate și sensibile creând un strat protector (regiunea interdigitală, suprafața internă a coapselor, suprafața articulației jaretului, leziuni provocate în urma utilizării harnașamentelor), iar pulverizat pe răni sau plăgi operatorii sprijină regenerarea rapidă a pielii (de ex. răni cutanate superficiale, castrări). Pe lângă acestea dispune de efect analgezic și hemostatic.
De asemenea oferă protecție complementară bună împotriva iritațiilor cauzate de muște și țânțari.

Ambalaj:
400 ml

Compoziție:
Oxid de zinc, stearat de calciu, ulei de oregano, ulei de mușețel, ulei de arnică, ulei de arbore de ceai, ulei de gălbenele.

Utilizare:
Agitați bine înainte de utilizare.
Suprafața afectată trebuie curățată cu grijă.
Se pulverizează zilnic de 2-3 ori de la 10-20 cm distanță.
Praful de pudră poate fi îndepărtat cu o cârpă uscată.





Indicații de utilizare la animale mici:
Orice rană superficială pe suprafața pielii (mușcături, zgârieturi, tăieturi)
Iritații și arsuri
Hot spots
Plăgi și iritații interdigitale
Iritații cauzate de muște și țânțari
Îngrijirea plăgilor operatorii



Indicații de utilizare la animale mari:
Orice rană superficială pe suprafața pielii (mușcături, zgârieturi, tăieturi)
Decornare
Plăgi și iritații





SPRAY AMAR
100 ml

Substanță activă:
Benzoat de denatoniu 0.2 g

Indicații:
Este o soluție cu gust amar, extrem de neplăcut. Prin utilizarea ei se poate evita ca animalul să lingă și să muște plăgile existente sau să roadă diverse obiecte din casă.
Astfel, nu mai este nevoie de un guler de protecție.

Administrare:
Produsul se pulverizează de la o distanță de 15 cm de suprafața de protejat.



SPRAY ADEZIV
150 ml

Substanță activă:
Soluție adezivă: 75.0 g
Gaz propulsor: 37.5 g

Indicații:
Fixarea foliei operatoare pe suprafeţele tratate înaintea operaţiilor şi fixarea pansamentelor.

Administrare:
A se utiliza numai extern! Evitați contactul cu ochii!
Înainte de aplicare se curăță bine suprafața de piele și se usucă complet. De la o distanță de 20-25 cm, în încăperi fără curenți de aer puternici, se pulverizează zona de 1-2 ori, după aplicare așteptați 30-35 de secunde, după care se fixează materialul dorit prin apăsări ușoare pe piele.





ZINKOXID SPRAY
200 ml

Substanță activă:
Oxid de zinc praf 12 g

Indicații:
- acoperirea plăgilor superficiale
- protecția plăgilor de murdărie
- stimularea epitelizării
- are efect ușor astringent
- impregnarea bandajelor pentru a împiedica aderarea la piele
- protecția pielii înainte de aplicarea bandajelor gipsate

Administrare:
Se pulverizează timp de 1-2 secunde asupra zonei afectate, de la o distanță de 20-25 cm. Tratamentul se poate repeta, în caz de nevoie, de mai multe ori.





ALUMINIUM SPRAY
200 ml

Substanță activă:
Praf de aluminiu (micronizat) 6.270 g

Indicații:
Pentru acoperirea rănilor superficiale, protejează rănile de murdărie, ajută la dermizare.

Administrare:
Se proiectează un jet de Aluminium Spray timp de 1-2 secunde asupra zonei afectate de la 20-25 cm distanță față de plagă. Tratamentul se poate repeta, în caz de nevoie, de mai multe ori pe zi.




MP-PLUS ZINK SPRAY
200 ml

Compoziție:
Pulbere de oxid de zinc, stearat de calciu, ulei de arbore de ceai, carvacrol.

Indicații:
Are efect ușor astringent.
Se poate folosi pentru impregnarea bandajelor pentru a împiedica aderarea la piele.
De asemenea se folosește pentru protecția pielii, înainte de aplicarea bandajelor gipsate.
Este potrivit pentru terapia adjuvantă a sângerărilor şi durerilor, precum şi ca protecţie împotriva muştelor şi a ţânţarilor.

Indicații:
Se pulverizează MP Plus Zink Spray timp de 1-2 secunde asupra zonei afectate, curățată în prealabil de la o distanță de 10-20 cm.
Tratamentul se poate repeta, în caz de nevoie, de mai multe ori.
A se agita înainte de utilizare.



CHARMIL MULTIACTION SKIN PUMP SPRAY 100 ml



Compoziţie:

Cedrus deodara
• ajută la vindecarea ţesutului epitelial, are un efect puternic antimicrobian
• se foloseşte în tratamentul râiei şi a pododermatitelor
• are proprietăţi antiinflamatoare, antibacteriene, antifungice
• are efect repelent şi insecticid

Azadirachta indica
• are proprietăţi antibacteriene şi antifungice
• se foloseşte în tratamentul scabiei şi a dermatitei

Pongamia glabra
• uleiul se foloseşte pentru uz extern în cazul râiei, herpesului, pododermatitei şi a altor leziuni cutanate. Are efect antibacterian şi insecticid.

Indicaţii:
• tratamentul diferitelor tipuri de răni
• tratamentul infecţiilor cutanate
• plăgi postoperatorii


Administrare: după curăţarea zonei afectate, spray-ul se aplică zilnic, până la vindecarea ţesutului.

CHARMIL SPRAY 100 ml



Substanţă activă:
ulei de cedru himalayan, ulei pongamia

Indicaţii:
• în tratamentul rănilor şi infecţiilor cutanate având proprietăţi antibacteriene, antifungice, antiinflamatoare, antilarvare şi acaricide



OTIBIOVIN
15 ml, 20 ml



Compoziţie:
Triamcinolon acetonid 0,5 mg; acid salicilic 5,0 mg; gentamicină sulfat 2,0 mg; bromură de carbetopendecini 0,125 mg; etanol 96%; apă distilată

Indicaţii:
Otita externă şi dermatita canină şi felină superficială, cauzate de microorganisme sensibile la substanţele din preparat.

Administrare:
Se administrează 4–5 picături din preparat în canalul auricular la începutul tratamentului, de 3-4 ori/zi, iar după 3 zile, de 2-3 ori/zi.

OTOFIN
100 ml



Compoziţie: propilengligol 40,0 g; (±) alfa-bisabolol 100 mg; extract fluid de muşetel 3,0; ulei esenţial de lavandă 100 mg; ulei esenţial de busuioc 280 mg - magrogol-7-cocoat de glicerol; acidifiant; edetat disodic dihidrat; antispumant; apă purificată.

Indicaţii: Otofin loţiune otică pentru câini şi pisici curăţă canalul auditiv extern, dizolvă ceara şi menţine pielea suplă şi curată. Folosirea regulată ajută la menţinerea urechilor animalului curate şi sănătoase. Muşeţelul, lavanda, busuiocul şi propilenglicolul sunt recunoscute pentru capacitatea de a reduce numărul bacteriilor şi ciupercilor, ele acţionând, de asemenea, şi împotriva unor virusuri şi acarieni. Muşeţelul şi alfa-bisabololul au o acţiune antiinflamatoare dovedită şi un efect calmant.

Administrare: pentru a menţine urechile animalului sănătoase şi curate, produsul trebuie utilizat o dată pe săptămână.
În cazul urechilor foarte murdare, produsul poate fi utilizat zilnic, timp de 8 zile consecutiv, după consultarea unui medic veterinar.
Se umple canalul auditiv extern cu produsul şi se masează uşor părţile flexibile. Lăsaţi animalul să-şi scuture capul şi înlăturaţi cu un tampon impurităţile dizolvate în ureche. Procedura se repetă în cazul urechilor foarte murdare.

BIODEXIN
Soluţie auriculară
100 ml



Compoziţie:
Soluţie de Digluconat de chlorhexidină 0.5 ml, Extract din arbore de ceai, Dexpanthenol, Propilen glicol, Cremofor RH-40, Euxyl PE 9010, Acid acetic 99%, Acetat de sodiu trihidrat, apă purificată.

Indicaţii:
Produsul se foloseşte pentru curăţarea canalului auditiv extern la câini.

Administrare:
Aplicaţi 5-8 picături din produs în urechea animalului. Masaţi urechea, după care lăsaţi câinele să-şi scuture capul, pentru a elimina soluţia. Ceara şi soluţia rămase în ureche se îndepărtează cu un tampon. Procedura se poate repeta de 2 ori pe zi.

OTOTOP
15 ml, 30 ml



Compoziție:
Miconazol nitrat, prednisolon acetat, polimixină B sulfat.

Specii țintă:
Câini, pisici, porcușori de Guineea

Indicații:
Pentru tratamentul infecției conductului auditiv extern (otită externă) la câini și pisici, precum și al infecțiilor primare și secundare ale pielii și anexelor pielii (păr, unghii, glande sudoripare) la câini, pisici și porcușori de Guineea, cauzate de următorii agenti patogeni sensibili la miconazol și polimixină B:

- Fungi (inclusive levuri)

-Malassezia pachydermatis
-Candida spp.
-Microsporum app.
-Trichophyton spp.

- Bacterii Gram-pozitive

-Staphylococcus spp.
-Streptococcus spp.

- Bacterii Gram-negative

-Pseudomonas spp.
-Escherichia coli

Pentru tratamentul adjuvant al infestării cu Otodectes cynotis (acarieni auriculari) asociată cu otita externă.

Mod de administrare:
Pentru utilizare auriculară și cutanată.

Căi de administrare:
Câini, pisici: Pentru instilare în conductul auditiv extern sau pentru aplicare cutanată.
Porcușori de Guineea: Pentru aplicare cutanată.

TREI INGREDIENTE ACTIVE = ACȚIUNE TRIPLĂ

1

Miconazol nitrat
Are o acțiune antifungică ce inhibă dezvoltarea fungilor, în special a drojdiilor din specia Malassezia spp.

2


Acetat de prednisolon
Reduce durerea și inflamația din canalul auditiv datorită puternicului efect antiinflamator.

3

Sulfat de polimixină B
Un antibacterian cu spectru larg, eficient împotriva bacteriilor Gram-pozitive și Gram-negative.

CUM ESTE **DIAGNOSTICAT** „OCHIUL USCAT”?

- Semnele clinice pot varia, iar simptomele pot fi ușoare până la severe, în funcție de stadiul bolii
- Ambii ochi sunt de obicei afectați
- Dacă medicul veterinar suspectează OCHI USCAT, atunci va efectua un test - acest test este Schirmer Tear care măsoară cantitatea de lacrimi pe care ochiul o produce. Un rezultat slab indică OCHI USCAT și necesită tratament
- Acest test implică introducerea unor fâșii de hârtie în interiorul pleoapei inferioare a câinelui și este de obicei bine tolerat de majoritatea pacienților.



Testul Schirmer Tear



CUM ESTE **TRATAT** „OCHIUL USCAT”?

Veterinarul dumneavoastră vă va prescrie picături pentru ochi

Unguent pentru ochi cu ciclosporină - se aplică de obicei de două ori pe zi pe ochi. Acest medicament esențial împiedică sistemul imunitar să atace țesutul lacrimal și are ca scop inversarea stării.
Dacă are succes, tratamentul cu acest medicament este pe viață - dacă medicamentul este oprit, sistemul imunitar va începe din nou să distrugă țesutul lacrimal.

Produse de curățare a ochilor - îndepărtarea acumulării de crustă și a secrețiilor care se observă frecvent la acești pacienți este benefică.
Câinele tău se va simți mai confortabil și va ajuta la aplicarea picăturilor medicamentate pentru ochi.

Picături pentru ochi pentru înlocuirea lacrimilor - acestea au scopul de a menține ochiul lubrifiat și de a preveni uscarea acestuia. Un ochi uscat este iritant și dureros și poate duce la deteriorarea corneei.
Înlocuirile lacrimale sunt utilizate frecvent inițial și apoi pot fi reduse sau oprite, dacă funcția glandei lacrimale este redobândită cu picături de ciclosporină. Dacă boala este depistată prea târziu, atunci ciclosporina poate să nu fie eficientă în inversarea modificării induse în țesutul lacrimal - în acest moment, înlocuitorii lacrimali pot deveni singura modalitate de a ajuta medical un ochi uscat.

Picături pentru ochi antibiotice - pot fi utilizate dacă este prezentă o infecție bacteriană secundară.

OCRYL

Soluție oftalmică special creată pentru curățarea ochilor și a ariei perioculare, îndepărtând crustele și secrețiile, reducând colorarea cauzată de petele lacrimale.

Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	Flacon 135 ml
Utilizare	La nevoie

- Îndepărtează crustele și secrețiile din ochi, din sacul conjunctival și din regiunea periorbitală
- Crustele și secrețiile pot acționa ca sursă de proliferare bacteriană
- Pregătirea regiunii periorbitale înaintea aplicării altor unguente sau soluții oftalmice
- Reduce colorarea provocată de lacrimi





INDICAȚII: • Curățare și reducerea petelor lacrimale

Pete lacrimale:

Faza de atac – aplicați Ocryl folosind o dischetă de bumbac de 1-2 ori pe zi până la dispariția petelor

Faza de menținere – aplicați Ocryl folosind o dischetă de bumbac de 1-2 ori pe săptămână

Compoziție:

- Clorură de benzalconiu
- Albastru de metilen
- Ulei de trandafir
- Acid boric
- Borat de sodiu

- Același pH ca și lacrima
- Dozator optim și precis
- Valabilitate mare de utilizare
- Vârf dozator atraumatic

Clorura de benzalconiu: dezinfectează conjunctiva și prin proprietățile hidroabsorbante cresc concentrarea de substanțe nutritive la nivel cornean

Albastru de metilen: antiseptic

Acidul boric și **boradul de sodiu:** antiseptice și astringente

Ulei de trandafir: revitalizant

OCRY-GEL

CARBOPOL 980 NF

Gel pe bază de carbomer pentru lubrefierea și hidratarea corneei.

Compoziție	Carbopol 980 NF și Cetrimidă
Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	1 x 10g tub
Utilizare	1-2 picături la nevoie

- Carbopol 980 NF este un polimer hidrodispersabil capabil să rețină apa de 500 de ori mai mult decât propria greutate.

INDICAȚII:
- Anestezie generală
- Terapia de substituție în cazul deficitului de film lacrimal - ochi uscat

CORNEAL FOCUSRANGE
SEE THINGS MORE CLEARLY


- tub cu vârf ergonomic
- proprietăți bioaderente și lubrefiante
- are același pH și osmolaritate ca și filmul lacrimal
- nu rămân urme albe după utilizare



Filmul lacrimal joacă un rol vital în menținerea sănătății corneei.



Beneficiile lacrimomimeticelor pentru diferitele straturi ale filmului lacrimal:



Stratul lipidic

favorizezează stabilitatea filmului, mărind tensiunea superficială a acestuia, întârziind evaporarea stratului apos produs de glandele Meibonius și Zeiss

Stratul seros

format din apă, electroliți, glucoză, uree, polimeri, glicoproteine, și proteine lacrimale determină menținerea pH-ului lacrimal ușor alcalin și a osmolarității produs de glanda lacrimală principală (70%) și de glandele accesorii (30%)

Stratul mucos

formează legătura între filmul lacrimal și suprafața corneeană, este asigurat de țesutul glandular difuz situat la fața internă a pleoapei a treia (glanda Harder) și celulele difuze din structura conjunctivei

	STRATUL LIPIDIC	STRATUL SEROS	STRATUL MUCOS
CARBOPOL 980 NF	●	● ● ● ●	● ●
ACID HIALURONIC 0.15%	●	● ●	● ● ● ●

VISKYAL

ACID HIALURONIC

Picăturile cu acid hialuronic ajută la menținerea lubrefierii fiziologice și protecției corneei.

Compoziție	Acid hialuronic 0.15%
Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	Flacon 1 x 10 ml
Utilizare	1-2 picături de cel puțin 2 ori pe zi

- Menține umiditatea corneei
- Timp lung de valabilitate după prima deschidere (60 zile)
- Asigură interfața dintre epiteliul cornean și faza apoasă a filmului lacrimal datorită proprietăților mucomimetice
- Acidul hialuronic are de asemenea proprietăți lubrefiante și hidratante prin abilitatea lui de a se combina cu un număr crescut de molecule de apă

INDICAȚII:

- Terapia de substituție în cazul deficitului de film lacrimal - ochi uscat
- Pentru suplinirea nevoilor fiziologice





TWELVE

ACID HIALURONIC , VITAMINA B12, FACTORI MINERALI TROFICI

Aplicații locale de factori implicați în multiplicarea celulară.

Compoziție	Acid hialuronic, vitamina B12, factori minerali trofici incluzând Mg^{2+} și Ca
Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	Flacon 1 x 10 ml
Utilizare	1-2 picături de 2 ori pe zi

- Menține umiditatea corneei
- Timp lung de valabilitate după prima deschidere (60 zile)

INDICAȚII:

- Cel mai bun suport pentru multiplicarea celulară



Cianocobalamina (Vitamina B12) este un factor esențial în multiplicarea celulară. Este implicată în sinteza de proteine și acizi nucleici. Este de asemenea implicată în procesul fiziologic, care ajută la protejarea organismului împotriva radicalilor liberi.

Factorii mineral trofici joacă un rol important în reacția biochimică intracelulară în timpul unei activități intense ca multiplicarea sau faza de vindecare.

Acidul hialuronic este un constituent natural al filmului lacrimal. Îmbunătățește aderența lacrimală pe suprafața epiteliului corneal. Acidul hialuronic are de asemenea proprietăți lubrefiante și hidratante prin abilitatea lui de a se combina cu un număr crescut de molecule de apă.



Clerapliq

Produs pentru igiena ochilor - pentru animale;
Substitut al matricei extracelulare.

Compoziție	RGTS 100µg (polimeri de sulfat de carboximetil-glucoză) Excipienți ad. 1 ml
Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Utilizare	1-2 picături, în medie de 2 până la 3 ori/săptămână

Indicat în restaurarea și regenerarea matricei extracelulare corneene



INDICAȚII:

- Terapia de regenerare matriceală, de vindecare a leziunilor corneene cronice, cum ar fi defectele epiteliale persistente și distrofia corneană anterioară persistentă și durerea asociată.
- Clerapliq este o soluție sterilă pentru vindecarea leziunilor oculare.
- Ajută la refacerea și regenerarea matricei extracelulare a corneei.

Fluodrop

FLUORESCEINĂ

Colorant lipsit de activitate farmacologică a cărui culoare se modifică în funcție de pH.

Compoziție	0.5%
Specii țintă	Câine, pisică, cal, animale exotice
Ambalare	Cutie cu 10 x 0,4 ml fiole
Utilizare	1-2 picături per ochi

Avantajele soluției 0.5% 0.4 ml:

- Reduce "suprainundarea" ochiului cu fluoresceină
- Ajută la reducerea disconfortului

INDICAȚII:

- Vizualizare stromei corneene și a celulelor epiteliale afectate



UTILIZAT PENTRU:

- Observarea ulcerațiilor corneene
- Observarea permeabilității canalului nazo-lacrimal (testul Jones)
- Ajută la măsurarea TFBUT (timpul de rupere al filmului lacrimal)
- Observarea scurgerii umoarei apoase prin perforația corneei (testul Seidal)



STROMEASE

CORNEAL FOCUSRANGE



PRIMUL ȘI SINGURUL PRODUS AUTORIZAT PENTRU TRATAMENTUL DE SUSȚINERE AL ULCERELOR CORNEENE LA CÂINI ȘI PISICI

N-acetilcisteină 25 mg/ml
picături oftalmice

Anti-colagenază "la îndemână"
- Formulă gata preparată, sterilă
- Convenabil atât pentru medicul veterinar, pentru proprietarul animalului de companie cât și pentru pacient.

Depozitare ușoară
- Nu este necesară depozitarea la rece
- Valabilitate 3 ani - flacon sigilat (7 zile de la deschidere)

Flacon 5 ml prevăzut cu vârf aplicator pentru dozare ușoară
- Dozare simplă și uniformă
- Aplicați 2 picături, de 3-4 ori pe zi

N-ACETILCISTEINĂ

Notată adesea și NAC, Acetilcisteină sau N-acetil-L-cisteină;este utilizată pe scară largă în medicina umană și veterinară pentru proprietățile sale **mucolitice** și **antioxidante**.

NAC **inhibă colagenaza** în mod ireversibil prin reducerea legăturilor disulfidice și chelatarea calciului și a zincului, cofactori ai MMP (matricei metaloproteinazei).

Deși MMP joacă un rol important în vindecarea leziunii corneene inițiale, este necesară diminuarea răspunsului pentru a preveni **digestia corneană** și a **permite vindecarea leziunilor corneene**.

OPHTAPRIME

DP DÔMES PHARMA

SOLUȚIE PENTRU OCHI 3-IN-1



1 **CURĂȚĂ** ochiul
2 **PREGĂTEȘTE** ochiul
3 **FACILITEAZĂ** acțiunea anumitor tratamente oculare

OphtaPRIME® pregătește ochiul și facilitează acțiunea anumitor tratamente oculare. Astfel, este cel mai bine utilizat înainte de medicamentele topice.

Utilizare:
Se aplică cu cel putin 5 minute înainte de a administra un tratament pentru ochi.
Dacă nu există scurgeri în jurul ochiului, aplicați 1 sau 2 picături pe ochiul afectat.
Dacă există scurgeri în jurul ochiului (ochi murdar), aplicați o cantitate mică de produs pe ochi. Ștergeți impuritățile și excesul de produs cu un tampon de tifon curat.

OphtaPRIME® este conceput pentru a fi o soluție pregătitoare. Nu este concepută pentru a fi utilizată ca soluție de curățare zilnică.

SEMACO Dr Sekiz
We create supplements for dogs and cats since 1995



BIOMIX PLUS OMEGA 3
100 tbl. - 100 g



Compoziţie: drojdie de bere, celuloză microcristalină, alge uscate - *Schizochytrium limacinum*, dioxid de siliciu, stearat de magneziu.
Aditivi nutriţionali: Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, D-pantotenat de calciu; Niacină B3, Biotină H2; Cupru (Cu); Zinc (Zn); Mangan (Mn);
Constituienţi analitici: fibră brută 36%, proteine 20%, cenuşă brută 17%, grăsime brută 7,8%, acizi graşi Omega 3 (DHA) 1,7 %, sodiu 0,04%.

Administrare:
Doza zilnică recomandată:
Pisici: ½ tabletă
Câini: 1 tabletă/10 kg greutate corporală

Doza intensiv-terapeutică recomandată zilnic:
Pisici: 1 tabletă
Câini: 2 tablete/10 kg greutate corporală

Beneficii:
- îmbunătăţirea calităţii şi aspectului pielii şi blănii
- influenţă pozitivă asupra pigmentaţiei
- asigurarea funcţionării normale a organelor interne
- creşterea imunităţii şi a apetitului
- creşterea rezistenţei organismului la boli şi infecţii



KALCEVIT
100 tbl. - 120 g
500 tbl. - 600 g

Compoziţie: celuloză microcristalină, drojdie de bere, fosfat monocalcic, carbonat de calciu, dioxid de siliciu, stearat de magneziu.
Aditivi nutriţionali: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacină B3, Vitamina B6, Vitamina B12, acid folic B9, Vitamina C, D-pantotenat de calciu; Biotină H2; Fier (Fe); Cupru (Cu); Zinc (Zn); Mangan (Mn); Magneziu (Mg); Cobalt (Co); Iod (I); Seleniu (Se); Metionină; Lizină;
Constituenţi analitici: cenuşă brută 56%, fibră brută 25%, Ca-calciu 17%, P-fosfor 5%, proteine 5%, grăsime brută 0,6%, sodiu 0,12%, magneziu 11.2.1. (oxid de Mg) 0,025%.

Administrare:
Doza zilnică recomandată: 1 tabletă/10 kg greutate corporală
Doza intensiv-terapeutică recomandată zilnic: 2 tablete/10 kg greutate corporală.

Beneficii:
- dezvoltare corespunzătoare a oaselor şi o creştere sănătoasă
- pentru femelele gestante - gestante în ultima perioadă - şi lactante, oferă protecţie împotriva pierderilor de calciu şi contribuie la menţinerea vitalităţii şi structurii osoase



IMMUNOCAN
100 tbl. - 100 g

Compoziţie: celuloză microcristalină, drojdie de bere, produs de cicoare, dioxid de siliciu, stearat de magneziu.
Constituenţi analitici: fibră brută 42%, cenuşă brută 20%, proteină 11,5%, grăsime brută 0,2%, sodiu 0,05.
Aditivi nutriţionali: β-D-glucan, Manan-oligozaharide, Inulină, probiotoce: *Bacillus licheniformis*, *Bacillus subtilis*

Administrare:
Doza zilnică recomandată:
- câini: 1 comprimat/10 kg gc, înainte de masă.

Beneficii:
- 1,3-1,6 beta-D-glucanul este un polizaharid unic, care apare în mod natural şi este considerat cel mai puternic activator şi stimulator al sistemului imunitar pe care natura îl oferă
- Prebioticele Manan-oligozaharide (MOS) promovează creşterea şi supravieţuirea bacteriilor benefice din tractul digestiv
- MOS blochează şi imobilizează bacteriile patogene (cum ar fi *E. coli* şi *Salmonella*) şi toxinele, prin legarea lor de acestea, prevenind astfel proliferarea bacteriilor şi provocarea leziunilor
- Prebioticul inulină (FOS) serveşte ca nutrient pentru bacteriile benefice din tractul digestiv, stimulând creşterea acestor bacterii (*Lactobacillus*), inhibând totodată creşterea bacteriilor dăunătoare.
- Conţine două tulpini de bacterii probiotice benefice (*Bacillus licheniformis* şi *Bacillus subtilis*), crescând populaţia lor în tractul digestiv, menţinând echilibrul şi normalizând microflora intestinală.

KITTYCAT
100 tbl. - 100 g



Compoziţie: celuloză microcristalină, drojdie de bere, alge uscate - *Schizochytrium limacinum*, fosfat monocalcic, carbonat de calciu, dioxid de siliciu, stearat de magneziu.
Aditivi nutriţionali: Vitamina A, Vitamina D3, Taurină, Vitamina C, Vitamina E, Niacină B3, D-pantotenat de calciu, Vitamina B2, Vitamina B1, Vitamina B6, Acid folic B9, Vitamina K3, Biotină H2, Vitamina B12, Fier, Zinc, Mangan, Cupru, Iod, Seleniu, Metionină, Lizină.
Constituenţi analitici: fibră brută 28%, cenuşă brută 13%, proteine 13%, grăsime brută 5%, Ca-calciu 2%, P-fosfor 1%, acizi graşi Omega-3 (DHA) 1,1%, sodiu 0,15%, magneziu 11.2.1. (oxid de Mg) 0,12%.

Administrare:
Doza zilnică recomandată: ½-1 comprimat pentru juniori. 1-2 comprimate pentru pisici adulte.

Beneficii:
- contribuie la o bună calitate, strălucire şi culoare a blănii
- asigură funcţionarea normală a organelor
- creşte imunitatea
- contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii generale

ß-CAROTEN & SEAWEED
100 tbl. - 80 g



Compoziţie: drojdie de bere, celuloză microcristalină, alge uscate - *Schizochytrium limacinum,* dioxid de siliciu, stearat de magneziu.

Constituenţi analitici: fibră brută 40%, cenuşă brută 16,8%, proteine 12%, grăsime brută 3,6%, acizi graşi Omega 3 (DHA) 1,7%, sodiu 0,05%.
Aditivi nutriţionali: Vitamina D3, Vitamina E acetat de dl-alfa-tocoferil, Beta Caroten, Fier, Zinc, Mangan, Iod

Administrare:
Doza zilnică recomandată: 1 comprimat/10 kg greutate corporală.

Beneficii:
- influenţează pozitiv pigmentarea
- oferă un colorit mai intens şi mai estetic
- ajută la menţinerea sănătăţii pielii şi a blănii



SEMAVIT
100 tbl. - 100 g

Compoziţie: celuloză microcristalină, drojdie de bere, fosfat monocalcic, carbonat de calciu, dioxid de siliciu, stearat de magneziu.
Constituenţi analitici: fibră brută 35%, cenuşă brută 29%, proteine 12%, Ca-calciu 7%, P-fosfor 3%, grăsime brută 0,6%, sodiu 0,08%, magneziu 11.2.1. (oxid de Mg)) 0,05%.
Aditivi nutriţionali: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina C, Taurină, Vitamina E, Niacină B3, D-pantotenat de calciu, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina K3, Acid folic B9, Biotină, Vitamina B12, Fier, Zinc, Mangan, Cupru, Iod, Seleniu, Metionină, Lizină.

Administrare:
Doza obişnuită, recomandată zilnic:
1 tabletă/10 kg greutate corporală
Doza intensiv-terapeutică, recomandată zilnic:
2 tablete/10 kg greutate corporală

Beneficii:
- creşte rezistenţa generală a câinilor la boli şi infecţii
- întăreşte dinţii şi oasele
- asigură strălucirea şi sănătatea blănii
- îmbunătăţeşte metabolismul şi performanţa câinilor utilitari şi de reproducţie



CONNECTEN
100 tbl. - 100 g

Compoziţie: Glucozamină sulfat 35%, Condroitină sulfat 10%, Metilsulfonilmetan (MSM) 5%, acid hialuronic 0,5%, celuloză microcristalină, drojdie de bere, dioxid de siliciu, stearat de magneziu
Aditivi nutriţionali: Vitamina C, Vitamina E, Zinc, Mangan, Cupru, Metionină (DL-Metionină)
Constituenţi analitici: fibră brută 17%, cenuşă brută 14,5%, proteine 2%, grăsime brută 1,5%, sodiu 0,11%.

Administrare:
Doza zilnică recomandată: ½ tabletă/10 kg greutate corporală, de 2 ori pe zi, în timpul hrănirii.
Doza intensiv-terapeutică recomandată zilnic (primele 2 săptămâni):1 tabletă/10 kg greutate corporală, de 2 ori pe zi, în timpul hrănirii.

Indicaţii:
Pentru dureri articulare, inflamaţie, slăbiciune, atât acute, cât şi cronice, degenerare a tendoanelor şi ţesutului conjunctiv şi pentru rigiditatea articulaţiilor (spondiloză şi artrită).

Beneficii:
- menţinerea sănătăţii articulaţiilor şi ţesutului conjunctiv
- formarea şi regenerarea cartilajului articular
- promovează mobilitatea şi activitatea câinilor
- protejează şi îmbunătăţeşte elasticitatea cartilajului
- lubrifiază articulaţiile şi acţionează ca antiinflamator (reduce durerea şi edemul)
- ajută la întărirea ţesutului conjunctiv din articulaţii

CARDIO PROTECT
100 tbl. - 100 g



Compoziție:
Coenzima Q10 (Ubiquinol) 2%, drojdie de bere, celuloză microcristalină, rădăcină de păpădie pulbere, fructe de păducel pulbere, alge uscate, stearat de magneziu.
Aditivi nutriționali per 1 comprimat (1g):
Vitamine: L-Carnitină (L-Tartrat) 3a911 125 mg, Taurină 3a370-125 mg, Vitamina E 3a700, acetat de all-rac-alfa-tocoferil-20 mg, Vitamina C 3a300 acid ascorbic-15 mg, Niacină 3a314- 5 mg, Vitamina B6 3a831, clorhidrat de piridoxină-1,2 mg, Vitamina B1 3a820, clorhidrat de tiamină-1,0 mg, Acid folic 3a316-0,8 mg, Vitamina B12, cianocobalamină-0,005 mg. Oligoelemente: Drojdie selenizată inactivată 3b812 25 mg

Administrare:
Doza zilnică recomandată: Pentru pisici: ½ -1 comprimat. Pentru câini: 1 tabletă per 10 kg greutate corporală.

Beneficii:
- este special conceput pentru a susține un ritm cardiac adecvat și o funcționare normală a circulației sângelui
- ajută la menținerea în limite normale a tensiunii arteriale și a colesterolului
- Coenzima Q10 contribuie la întărirea mușchiului cardiac și creșterea puterii de contracție a inimii

Specii țintă: câini și pisici

MaxiM
100 tbl. - 100 g



Compoziție:

Celuloză microcristalină, Drojdie de bere, Alge uscate, Stearat de magneziu.
Aditivi nutriționali per 1 comprimat (1g):
Vitamine: Vitamina A 3a672a, acetat de retinil-600 UI, Vitamina D3 3a671, colecalciferol-100 UI, L-Carnitină (L-Tartat) 3a911-10 mg, Taurină 3a370-10 mg, Vitamina C 3a300, acid ascorbic-10 mg, Niacină 3a314-10 mg, Vitamina E 3a700, acetat de all-rac-alfa-tocoferil-5 mg, Vitamina B2 3a825i, riboflavină-1,6 mg, Vitamina B1 3a820, clorhidrat de tiamină-1,2 mg, Vitamina B6 3a831, clorhidrat de piridoxină-1,0 mg, D-pantotenat de calciu 3a841-1,0 mg, Vitamina B12, cianocobalamină-0,002 mg.
Oligoelemente: Chelat de zinc al glicinei hidrat 3b607-2,0 mg, Chelat de fier al glicinei hidrat 3b108-1,5 mg, Chelat de mangan al glicinei hidrat 3b506 0-6 mg, Chelat de cupru al glicinei hidrat 3b413-0,069 mg, Iodat de calciu anhidru 3b202-0,050 mg, Drojdie selenizată inactivată 3b812-0,002 mg.
Aminoacizi: Monoclorhidrat de L-lizină , tehnic pură 3c322-40,0 mg, DL-metionină, tehnic pură 3c301-27,0 mg, L-Treonină 3c410-15,8 mg, L-Triptofan 3c440-4,5 mg.

Beneficii:
MaxiM este recomandat ca și adjuvant în dieta zilnică a câinilor (peste 12 luni). Formula sa specială ajută la creșterea în greutate și a masei musculare, favorizând dezvoltarea și definirea musculaturii, îmbunătățind performanțele câinilor de competiție (sursă de energie, rezistență și viteză sporite).

Administrare:
Doza zilnică recomandată: 1 tabletă per 10 kg greutate corporală/câine înainte de antrenament.
Doza zilnică maximă recomandată: 2 tablete per 10 kg greutate corporală/câine înainte de antrenament.

Specii țintă: câini



ALLERGYCALM
100 tbl. - 100 g

Compoziție:
Drojdie de bere, celuloză microcristalină, quercetină, bromelainăă, pulbere de frunze de urzică, pulbere de rădăcină de lemn dulce, pulbere de rădăcină de brusture, pulbere de rădăcină de curcuma, pulbere de rădăcină de turmeric, alge uscate, stearat de magneziu.
Aditivi nutriționali per 1 comprimat (1g): Vitamine: Vitamina C 3a300, acid ascorbic-50 mg, Vitamina E 3a700, acetat de all-rac-alfa-tocoferil-10 mg.

Administrare:
Pentru alergiile sezoniere și de mediu, se utilizează preventiv înainte de apariția simptomelor. În cazul afecțiunilor alergice acute, se utilizează împreună cu administrarea unui tratament adecvat prescris de către medicul veterinar.
Doza zilnică recomandată, pe stomacul gol: Pentru pisici: ½ tabletă, de două ori pe zi. Pentru câini: 1 tabletă per 10 kg greutate corporală, de două ori pe zi.

Beneficii:
- formulă unică ce conține doar ingrediente naturale, pe bază de plante, atent selecționate pentru a menține un nivel normal de histamină și buna funcționare a sistemului imunitar.
- Quercetina împreună cu Bromelaina au puternice proprietăți antiinflamatorii.

Specii țintă: câini și pisici



RELAXCALM
100 tbl. - 100 g

Compoziție:
Celuloză microcristalină, drojdie de bere, pulbere de floarea pasiunii, pulbere de mușețel, pulbere de valeriană, pulbere de roiniță, pulbere de busuioc, pulbere de rădăcină de ashwagandha, pulbere de rădăcină de ghimbir, pulbere de rădăcină de lemn dulce, melatonină, stearat de magneziu.
Aditivi nutriționali per 1 comprimat (1g): Vitamine: Taurină 3a370-10 mg, Niacină 3a314-10 mg, Vitamina B1 3a820, clorhidrat de tiamină-5 mg, Vitamina B6 3a831, clorhidrat de piridoxină-2 mg, Vitamina B12, cianocobalamină-0,005 mg. Aminoacizi: L-Teanină-25 mg, L-Triptofan 3c440-30 mg.

Administrare:
Administrați doza recomandată cu 60 de minute înainte de o situație potențial stresantă. Repetați din nou nivelul dozei peste 6-8 ore, dacă este necesar.
Doza zilnică recomandată: Pentru pisici: ½ tabletă. Pentru câini: 1 tabletă per 10 kg greutate corporală.
Doza zilnică maximă recomandată: Pentru pisici: 1 comprimat. Pentru câini: 2 tablete per 10 kg greutate corporală.

Beneficii:
- contribuie la menținerea unei stări de relaxare și liniștire, reducând stresul de mediu cauzat de: furtuni, focuri de artificii, separare, călătorii, vizita la veterinar, șederea într-o canisă și comportamentul distructiv nedorit.
- Formulă complexă, recomandată pentru susținerea sistemului nervos prin reducerea stresului și a tensiunii.

Specii țintă: câini și pisici

Rx Vitamins® for PETS

Profesional Veterinary Formulas

Suplimente nutriționale pentru câini și pisici
Dermato-cosmetice şi întreţinere



- **Condro-protectoare**
- **Susţinerea funcţionării normale a ficatului**
- **Susţinerea sistemului imunitar asociat în tratamentul FIV, FELV**
- **Adjuvanţi în terapia bolilor gastro-intestinale**
- **Adjuvanţi în terapia oncologică**
- **Reducerea comportamentului anxios şi suport nutriţional pentru producerea de serotonină**





RELAXAN
30 tablete

Compoziţie:
Carbonat de calciu, acizi graşi, sulfat de magneziu

Aditivi nutriţionali: inozitol, nicotinamidă, taurină, vitamina-B6, vitamina (E671) D3, zinc (sulfat de zinc heptahidrat E6), seleniu, L-triptofan

Indicaţii:
Tableta calmantă conţine vitamine, minerale şi aminoacizi naturali, de care are nevoie organismul animalului pentru a preveni starea de stres.
În cazul în care animalul va trece printr-o perioadă mai stresantă se recomandă începerea administrării calmantului cu 2 - 3 zile înainte de perioada respectivă.

Administrare:
Tableta se poate administra în mod direct sau sfărâmată şi amestecată în mâncare.
Pisici: 1 tabletă/zi
Câini: sub 5 kg - 1 tabletă zilnic, de 2 ori pe zi
5 - 10 kg - 2 tablete zilnic, de 2 ori pe zi
10 - 20 kg - 3 tablete zilnic, de 2 ori pe zi



RELAXAN FORTE
30 tablete

Compoziţie:
Carbonat de calciu, acizi graşi, sulfat de magneziu

Aditivi nutriţionali: inozitol, nicotinamidă, taurină, vitamina-B6, vitamina (E671) D3, zinc (sulfat de zinc heptahidrat E6), seleniu, L-triptofan

Indicaţii: Tableta calmantă conţine vitamine, minerale şi aminoacizi naturali, de care are nevoie organismul animalului pentru a preveni starea de stres.
În cazul în care animalul va trece printr-o perioadă mai stresantă, se recomandă începerea administrării calmantului cu 2 - 3 zile înainte de perioada respectivă.

Administrare:
Tableta se poate administra în mod direct sau sfărâmată şi amestecată în mâncare.
Câini: talie medie şi/sau talie mare - 1 tabletă zilnic, de două ori pe zi
talie mare – 2-3 tablete zilnic, de două ori pe zi



ARTHROMED
60 capsule

Compoziţie:
Extract de midie verde 500 mg

Indicaţii:
Arthromed este un aliment complementar recomandat ca antiinflamator în tratamentul complementar în artrite, tendinite, ruptură fibrilară de tendoane, osteocondroză, intervenţii chirugicale osteoarticulare şi displazie. Totodată, este recomandat şi în perioada de creştere a câinilor.

Administrare:
1 - 2 capsule/zi pe cale orală în funcţie de greutatea corporală şi de severitatea simptomelor. Capsulele trebuie administrate în timpul mesei, dimineaţa sau seara. În primele 10 zile de tratament este indicat dozajul dublu.



ULEI DE SOMON - NORVEGIAN
500 ml

Compoziţie:

CULOARE	Red Orange
EPA (20:5 n-3)	2-3.000 mg/100 ml
DHA (22:6 n-3)	3,6-5.000 mg/100 ml
DPA (22:5 N-3)	1-2.000 mg/100 ml
Total Omega 3	13-15.000 mg/100 ml
Total Omega 6	13-15.000 mg/100 ml
Sum PUFA	27-30.000 mg/100 ml

Indicaţii:
- Combate năpârlirea excesivă şi redă strălucirea blănii
- Reduce simptomatologia dermatitelor şi a alergiilor
- Întăreşte sistemul imunitar
- Contribuie la sănătatea articulaţiilor
- Redă pofta de mâncare
- Efect antiinflamator
- Reduce riscul afecţiunilor cardiovasculare
- Sprijină funcţionarea optimă a sistemului nervos

Administrare:
Se recomandă amestecarea uleiului de somon împreună cu hrana.
1 pompiţă corespunde cu 2 ml ulei de somon.

Câini < 2 kg: 1 ml
Câini 2 - 5 kg: 2 ml
Câini 5- 10 kg: 4 ml
Câini 10 - 25 kg: 10 ml
Câini 25 - 50 kg: 20 ml
Câini > 50 kg: 36 ml

Pisici < 5 kg: 1 ml
Pisici > 5 kg: 2 ml

Sitalan

Supliment nutritiv pentru sănătatea ochilor

- Prin asigurarea unui aport suplimentar de vitamina C și E precum și de glutation - precursor al aminoacizilor, SITALAN se adresează nevoilor fiziologice ale lentilei cristaline senecente. Vitamina E și Seleniul sunt antioxidanți care permit o scădere a dezvoltării radicalilor liberi ce cauzează accelerarea îmbătrânirii celulare.
- Susține funcțiile fiziologice ale animalelor mature sau în vârstă (oboseală, scăderea tonusului sau a acuității vizuale, etc.).
- Acționează în prevenirea îmbătrânirii ochilor la câini și pisici.

Administrare:

Greutate	Număr comprimate / zi
< 7 kg	1
7 - 11 kg	1
12 - 25 kg	2
>25 kg	3



SITALAN se administrează în cure de 15 până la 20 de zile pe lună, cu repetare în funcție de evoluție, sau cu administrare continuă.



Oralade® GI+

HIPOALERGENIC
PROTEINĂ HIDROLIZATĂ



- Este o soluție gata preparată, cu aromă 100% naturală de pui, ceea ce o face ideală pentru utilizare la toate speciile carnivore, în special la câini și pisici cu sensibilități gastrointestinale.
- Nu conține citrați sau conservanți artificiali care pot afecta palatabilitatea.
- Fabricat cu apă purificată.
- Conține zero grăsimi și doar 1% proteine, fiind sigur de utilizat în toate etapele vieții.

Compoziție:

Apă purificată, dextroză monohidrată, clorură de sodiu, clorură de potasiu, fosfat monosodic, hidrolizat de ficat de pui, uleiuri și grăsimi vegetale fără citrați sau conservanți;

Aditivi/kg: Glicină 4000mg, gumă xantan 1200mg, fructo-oligozaharidă 1000mg, acid L-glutamic 400mg;

ACȚIUNE TRIPLĂ



Indicații:

1. PREHIDRATARE: Pentru gestionarea activă a hidratării și intervenția timpurie atunci când animalul dumneavoastră de companie este expus riscului de pierdere crescută de lichide sau de scădere a aportului de lichide.

2. REHIDRATARE: Un suport de rehidratare orală cu acțiune rapidă, care funcționează pentru a restabili și menține hidratarea optimă, chiar și în perioadele de tulburări gastrointenstinale.

3. SUPORT GASTROINTESTINAL: Produsul este o combinație unică de zaharuri simple și aminoacizi cheie care lucrează împreună pentru a susține tractul gastrointestinal. Fibrele prebiotice ușor digerabile ajută la menținerea echilibrului optim al bacteriilor bune și al altor microorganisme benefice în tractul gastrointenstinal al animalului dumneavoastră de companie.



Conține zero grăsimi și doar 1% proteine
Oralade® GI+ nu necesită digestie,
este ușor de absorbit și sigur de utilizat
în toate etapele vieții.

Oralade® RF+

HIPOALERGENIC
PROTEINĂ HIDROLIZATĂ



- Este o soluție gata preparată, cu aromă 100% naturală de pui;
- Nu conţine citraţi sau conservanţi artificiali care pot afecta palatabilitatea;
- Fabricat cu apă purificată;
- Conține zero grăsimi și doar 1% proteine, fiind sigur de utilizat în toate etapele vieții;
- Conține aminoacizi esențiali care sunt necesari pentru menținerea sănătății sistemului ocular, sistemului imunitar, a aparatului cardiovascular, susținând în același timp celulele gastrointestinale;

Compoziție:

Apă purificată, dextroză monohidrată, clorură de sodiu, clorură de potasiu, fosfat monosodic, hidrolizat de ficat de pui, uleiuri și grăsimi vegetale fără citrați sau conservanți.

Aditivi/kg: Glicină 4.500 mg, glutamat monosodic 2.500mg, gumă xantan 2.000mg, lizină 1.500mg, arginină 1.500mg, taurină 800mg, L-Carnitină 100mg.

ACȚIUNE TRIPLĂ



Indicații:

1. PREHIDRATARE: Pentru gestionarea activă a hidratării și intervenția timpurie atunci când animalul dumneavoastră de companie este expus riscului de pierdere de lichide sau de scădere a aportului de lichide.

2. REHIDRATARE: Susține echilibrul fluidelor și electroliților. Conține raportul ideal de electroliți și glucoză, care asigură o absorbție rapidă și optimă a apei.

3. FUNCȚIONAREA OPTIMĂ A RINICHILOR & SISTEMULUI URINAR: Oralade RF+ este o formulă izotonică cu conținut zero fosfor și calciu, favorizând absorbția de fluide și totodata protejând funcția rinichilor.

Oralade® ACTIVE asigură hidratarea rapidă și eficientă a câinilor în momentele critice.



PET PHOS *canin*

CROISSANCE CA/P = 1,3



Pet Phos canin CROISSANCE CA/P=1,3 este un complex alimentar destinat cățeilor în creștere și cățelelor în lactație hrăniți cu hrană industrială clasică pentru adulți, fiind recomandat de asemenea și pentru cățelele gestante și câinii activi.

PET PHOS *canin*

CROISSANCE CA/P = 2



Pet Phos canin CROISSANCE CA/P=2 este un complex vitamino-mineral destinat cățeilor în creștere și cățelelor în lactație, hrăniți cu hrană preparată în casă. Se administrează oral animalelor care primesc o rație dezechilibrată în calciu. Gustul excelent (palatabilitatea) permite în general o priză spontană. Se poate administra și în amestec cu hrana.

PET PHOS *canin*

CROISSANCE GRAND CHIEN



Pet Phos canin CROISSANCE Ca P/2 este un supliment vitamino-mineral cu gust plăcut (palatabil) care se recomandă patrupezilor cu o dietă dezechilibrată în calciu. Se administrează doar câinilor din rasele mari, cu greutatea peste 25 kg.

PET PHOS *canin*

SENIOR



Pet Phos canin SENIOR este indicat pentru echilibrarea organismului și aduce un plus de vitalitate câinilor adulți prin conținutul de minerale, vitamine, acizi grași esențiali și extracte din plante. Nu conține sodiu, potasiu și fosfor, fiind compatibil cu regimul dietetic al animalelor care suferă de insuficiență cardiacă sau renală. Datorită palatabilității ridicate, Pet Phos canin SENIOR este ideal pentru a recompensa animalele în vârstă.

PET PHOS *canin*

PELAGE



Pet Phos canin PELAGE este un supliment nutițional pentru câini. Este recomandat pentru îmbunătățirea calității pielii și blănii în următoarele situații: blană mată, uscată, friabilă, carențe nutriționale, dermatoză, perioada năpârlirii, căderea excesivă a părului sau pregătirea pentru concursuri și expoziții. Gustul excelent (palatabilitatea) permite în general o priză spontană. Se poate administra și în amestec cu hrana.

PET PHOS *felin*

CROISSANCE



Pet Phos felin CROISSANCE este un supliment vitamino-mineral special elaborat pentru o creștere perfectă și o dezvoltare armonioasă a pisoilor, dar și pentru o întreținere optimă a pisicilor adulte. Este palatabil și se recomandă pentru pisoii în creștere, femelele în gestație sau lactație, pisoilor care prezintă o diminuare a stării de sănătate, cu apetit capricios sau celor care primesc o rație neechilibrată.

PET PHOS *felin*

PELAGE



Pet Phos felin PELAGE este un supliment nutrițional pentru îmbunătățirea calității blănii în vederea participării la concursurile de frumusețe și expoziții. Este de asemenea recomandat pentru pisicile care necesită atenție specială, ajutând la combaterea aspectului de piele cu solzi. Conține vitamine, microelemente, aminoacizi și acizi grași, substanțe necesare pentru o piele și o blană sănătoasă. Gustul excelent (palatabilitatea) permite în general o priză spontană. Se poate administra și în amestec cu hrana.

PET PHOS *felin*

SENIOR



Aliment complementar gustos destinat pisicilor în vârstă de peste 8 ani, utilizat în cazul scăderii greutății corporale sau pur și simplu pentru menținerea vitalității. Nu conține sodiu, potasiu și fosfor, fiind compatibil cu regimul dietetic al animalelor care suferă de insuficiență cardiacă sau renală.

DENTIHEX

Clorhexidină 0.2 %

A REASON TO SMILE

LIVISTO

EASY APPLICATION DENTIHEX WITHOUT BRUSHING

Gel dentar aderent pentru câini și pisici





Compoziție:
Parafină, agent adeziv, aromă de vanilie, clorhexidină 0,2%.

Administrare:
- Pentru utilizare la câini și pisici.
- Dentihex este un produs ușor de aplicat.
- Poate fi aplicat direct în cavitatea bucală a animalului cu ajutorul aplicatorului inclus, permițând accesul mai ușor în spatele gingiilor. Pentru aplicarea externă, întindeți pasta cu atenție pe zona respectivă, cu degetele curate. În cavitatea bucală, pasta este distribuită de limba animalului.
- Se recomandă aplicarea Dentihex după mese.
- Se poate utiliza zilnic sau săptămânal, după cum este nevoie.

Utilizare obișnuită

1-2 aplicări pe săptămână

Înainte și după un tratament stomatologic veterinar

3-4 zile înainte

3-4 zile după

Managementul afecțiunilor parodontale

1 aplicare/zi

Pentru rezultate optime, aplicați înainte de apariția plăcii dentare sau a tartrului.

Bucogel



Produs de igienă orală pentru câini, pisici și dihori.

- Luptă împotriva plăcii dentare și a respirației urât mirositoare
- Ajută la eliminarea tartrului și la întreținerea sănătății dentare
- Previne iritarea gingiilor și menține o bună igienă orală




Compoziție:

Centella asiatica.....0,50 %
Digluconat de clorhexidină.....0,20 %
Biosecure C320C*.....0,15 %
*Amestec de diferite extracte organice de citrice.
Agent de detartrare, agent de lustruire.

Administrare:

Aplicare orală cu ajutorul periuței, al degetarului inclus în pachet, sau utilizând o compresă sterilă.
Distribuiți uniform gelul în cavitatea bucală (3-5 milimetri, în funcție de talia animalului).
Periați sau frecați dinții cu atenție, folosind o mișcare de rotație. Contorizați aproximativ 1 min./maxilar.
BUCOGEL poate fi înghițit fără inconveniențe, iar persistența sa în sfera bucală contribuie la prelungirea efectelor sale benefice.
BUCOGEL se utilizează de 2 până la 3 ori pe săptămână, sau chiar o dată pe zi dacă este necesar.

BUCOGEL se folosește fără clătire.
Pachetul conține o periuță de dinți moale și un aplicator pentru deget.
Conține fluor.





V-SKIN ATOPIC Spray Prebiotic

Pentru piele sensibilă și uscată

Compoziție:
Inulină, fructoză, acid hialuronic, extract de flori de *Calendula officinalis*, glicerină, apă.
Indicații:
Susține refacerea și echilibrarea barierei cutanate. Hidratează și calmează pielea sensibilă, iritată și uscată. Conține prebiotice pentru a întări microbiomul pielii, acid hialuronic și glicerină pentru o bună hidratare a pielii și gălbenele cu proprietăți antiinflamatorii și antioxidante.
Mod de utilizare:
Agitați înainte de utilizare. Pulverizați pe zonele dorite și lăsați să acționeze. Nu este nevoie de clătire. Frecvența trebuie stabilită în funcție de fiecare caz în parte, așadar se poate utiliza zilnic, de 2-3 ori pe săptămână sau conform recomandărilor medicului veterinar. În unele cazuri, ar putea fi indicată tunderea părului pentru a favoriza contactul produsului cu pielea.
Indicat pentru zonele greu accesibile, cum ar fi spațiile interdigitale.
Poate fi utilizat împreună cu alte produse V-SKIN.



V-SKIN Ear cleaner Aloe Vera 125 ml

Soluție cerumenolitică pentru curățarea urechilor

Compoziție: suc de frunze de *Aloe barbadensis*, extract de flori de *Calendula officinalis*, propilenglicol, gliceride caprilice, etanol, glicerină, parfum, apă, 4'-hidroxiacetofenonă.
Indicații:
Utilizați în practica obișnuită de curățare a urechilor. Conține gălbenele cu proprietăți antiinflamatorii și Aloe Vera cu proprietăți emoliente și calmante. Prevăzut cu dozator flexibil cu canulă, pentru o aplicare mai ușoară. Nu conține parabeni. Neutralizează mirosurile.
Mod de utilizare:
Instilați câteva picături în canalul auditiv sau în pavilionul urechii, în timp ce țineți urechea cu mâna cealaltă. Masați baza urechii timp de cel puțin 1 minut, determinând eliberarea excesului de produs și a cerumenului. Înfășurați pe deget un tampon sau un tifon de bumbac curat și introduceți degetul în canalul auditiv, având grijă să nu îl introduceți prea adânc, pentru a nu pune în pericol sănătatea animalului. Rotiți cu grijă degetul, curățând și uscând amestecul de produs de curățare și cerumen. Repetați acest pas până când tamponul este curat. Nu folosiți bețișoare de urechi. Frecvența aplicării trebuie să fie stabilită pentru fiecare caz în parte. Nu folosiți în cazul rupturii de timpan.



V-SKIN Sebo GlucoZinc spray 125 ml

Pentru piele uscată, descuamată sau grasă

Compoziție: Gluconolactonă, bis(D-gluconato-O1,O2) zinc, ceramidă NG, suc de frunze de *Aloe barbadensis* și extract de flori de *Calendula officinalis* (gălbenele).
Indicații:
Spray cu gluconolactonă cunoscută pentru proprietățile sale keratolitice, keratoplastice, hidratante și antioxidante. Conține, de asemenea, zinc - ideal pentru a echilibra flora pielii și ceramide, pentru a restabili bariera cutanată. Aloe Vera cu proprietăți calmante și gălbenele cu proprietăți antioxidante pentru a neutraliza radicalii liberi.
Mod de utilizare:
Agitați flaconul înainte de folosire. Aplicați produsul, prin pulverizare, pe suprafețele dorite. Nu necesită clătire. Zone localizate sau generalizate. Potrivit pentru zonele greu accesibile, cum ar fi spațiile interdigitale. Frecvența aplicării trebuie să fie stabilită pentru fiecare caz în parte.

DOUXO S3
Șampon & Spumă fără clătire pentru câini și pisici



DOUXO S3 CARE
cu OPHYTRIUM

Catifelează și hidratează pielea



Protejează bariera cutanată
Pentru utilizare zilnică

DOUXO S3 CALM
cu OPHYTRIUM, în concentrație crescută

Calmează pielea sensibilă



Reduce pruritul și iritația

DOUXO S3 PYO
cu OPHYTRIUM + clorhexidină 3%

Igienizează Hidratează



Acțiune antibacteriană și antifungică

DOUXO S3 SEB
cu OPHYTRIUM + Sebolliance

Îndepărtează mirosurile



Seboreglator
Pentru piele grasă și descuamată

FĂRĂ PARABENI · **FĂRĂ COLORANȚI** · **FĂRĂ SĂPUN**



NOU

Bazat pe tehnologie micelară

Soluție de curățare a urechilor

- **Putere mare curățare**
- **Acțiune calmantă imediată**
- **Protejează ecosistemul urechilor**
- **Posibilitatea asocierilor cu medicația otitelor**

BIODEXIN ŞAMPON
250 ml; 500 ml



Compoziţie:
100 ml de produs conţine: Soluţie de Digluconat de clorhexidină 20 ml, Decil glucosida 12,5 g, Flavol BMK (cocoamidopropil betaină, clorură de sodium) 15 g, Oxid de cocamină 3 g, PEG-7 gliceril cocoat 3 g, Laureth-4 2 g, Arlipon TT 2 g, glicerol 85% 7,5 g, Euxil K-100 0,1 ml, Acid acetic 99%, Briliant Blue FCF 0,1 mg, Apă purificată ad 100 ml.

Administrare:
Aplicaţi o cantitate mică pe blana umedă a animalului şi masaţi până se creează o spumă. Lăsaţi produsul să acţioneze 5-10 minute, după care spălaţi animalul cu apă până la îndepărtarea completă a produsului. Dacă este necesar, spălarea se poate repeta la câteva zile.

Indicaţii:
Produsul conţine o soluţie de clorhexidină cu bază de şampon. Datorită efectului puternic antiseptic, produsul are proprietăţi combinate de spălare, antiseptice şi deodorant.
Se recomandă în cazul în care este necesară spălarea blănii câinilor şi pisicilor pentru a obţine un efect de curăţare, efect antiseptic şi deodorant.



ALAPTID
20 g



Unguent cosmetic, special conceput pentru îngrijirea leziunilor minore de pe piele și mucoase.

Compoziție / 100 g:

Alaptidum - 1g

Bază de unguent: Polisorbat 60, alcool cetilstearilic, parafină lichidă, propilen glicol, metilparaben, propilparaben, apă pentru preparate injectabile.

Caracteristici:

Alaptida (dipeptida spirociclică preparată sintetic) are efecte regenerative excepționale, accelerează procesul de epitelizare și vindecare a rănilor superficiale.

Utilizare:
Produsul poate fi utilizat la toate animalele cu sânge cald pentru tratarea leziunilor minore ale pielii, arsurilor, degerăturilor, escarelor, etc.

Aplicare externă.
Se aplică pe piele într-un strat de 2-3 mm pe zona inflamată sau se poate bandaja ușor și lăsa să acționeze pentru a grăbi vindecarea rănii.
În cazul în care nu se poate utiliza un bandaj, unguentul se aplică de două ori pe zi.
Perioada de administrare depinde de întinderea zonei afectate.
Durata obișnuită a aplicării este de 3-10 zile, chiar mai mult în cazurile cronice.

ARTHRO GEL
100 ml



Compoziție:
Aloe barbadensis (Aloe vera), Carbomer, Mentol, Ulei de mentă, *Rosmarinus officinalis* (Unt de rozmarin), Terpineol, Apă

Administrare:
Aplicați de 1 - 2 ori pe zi.

Indicații:
- deteriorarea articulațiilor (pauze fibrilare, echimoze, entorse, etc.)
- tratamentul adjuvant pentru inflamație articulară
- în sporturi competitive și la animale sportive pentru susținerea țesuturilor conjunctive

NEWCHARM GEL
25 g



Compoziţie: Gel pe bază de plante

Administrare: Curăţaţi/spălaţi cu grijă pielea afectată. Dacă este necesar, îndepărtaţi părul de pe piele/zona afectată. Aplicaţi o cantitate suficientă de gel pe pielea afectată, o dată pe zi (sau de mai multe ori dacă este necesar) până la vindecarea totală.

Indicaţii:
- poate fi folosit ca şi tratament pentru infecţiile locale ale pielii (impetigo, dermatită, infecţii fungice, eczeme, scabie, plăgi infectate cu larve)
- se foloseşte şi în cazul tăieturilor, contuziilor, plăgilor rupte, muşcate, în tratamentul chirurgical al rănilor sau în arsuri, degerături, înţepături, ulceraţii
- reduce dermatitele şi alergiile la câini

CHARMIL GEL
25 g, 50 g



Compoziţie:
Produs naturist din medicina ayurvedică.

Administrare:
Se aplică de 1 - 2 ori/zi pe zona afectată şi în jurul acesteia, după curăţare, până la vindecare.

Indicaţii:
- răni şi diverse afecţiuni cutanate
- tăieturi, zgârieturi, arsuri
- vindecarea rănilor postoperatorii
- tratarea laminitei, abceselor
- tratarea scabiei, furunculilor, herpesurilor



CARBODOTE
PRIME & REPEAT

O REVOLUȚIE ÎN MANAGEMENTUL INTOXICAȚIILOR

PASUL 1 Prime



CARBODOTE PRIME trebuie utilizat ca primă intenție și se administrează o singură dată.
Un punct (•) corespunde la 7,8 g de produs.

- Gel unic, 2 în 1 cu cărbune activat plus un cathartic
- Accelerează decontaminarea gastrointestinală a toxinelor

Compoziție: Carbodote® Prime: cărbune activat (30%), glicerină, sulfat de sodiu (6,25%)

PASUL 2 Repeat



CARBODOTE REPEAT trebuie administrat la fiecare 4-6 ore, timp de 24-48 de ore, atunci când este necesar.Un punct corespunde (•) la 7,2 g de produs.

- Gel pur de cărbune activat
- Se utilizează atunci când este necesară administrarea repetată

Compoziție: Carbodote® Repeat: Cărbune activat (30%), glicerină





ADMINISTRARE CARBODOTE

Administrați cantitatea de produs din seringa dozatoare „dial & dispense”, conform tabelului de mai jos:

Carbodote® Prime

CARBODOTE PRIME se utilizează ca primă intenție și se administrează o singură dată.
Un punct (•) corespunde la 7,8 g de produs.

Carbodote® Repeat

CARBODOTE REPEAT se administrează la fiecare 4-6 ore, timp de 24-48 de ore, atunci când este necesar.
Un punct corespunde (•) la 7,2 g de produs.

Greutatea animalului (kg)	Prime	Repeat
≤ 2	1 •	1 •
2.1 - 4	2 ••	2 ••
4.1 - 6	3 •••	3 •••
6.1 - 8	4 ••••	4 ••••
8.1 - 10	5 •••••	5 •••••
10.1 - 12	6 ••••••	6 ••••••
12.1 - 14	7 •••••••	7 •••••••
14.1 - 16	8 ••••••••	8 ••••••••
16.1 - 18	9 •••••••••	9 •••••••••
18.1 - 20	10 ••••••••••	10 ••••••••••





CARBODOTE Liquid 100 ml

Suspensie orală pe bază de cărbune activ, care se utilizează în caz de ingestie de substanțe nedorite și, de asemenea, în caz de tulburări intestinale.

Compoziție: Cărbune (24 %), glicerină.

- Cărbune activ simplu gata de utilizat
- Soluție omogenă stabilă (agitare rapidă)
- Sticle mici și ușor de utilizat, 100 ml
- 1 flacon la 20 kg (5 ml/kg)
- Poate fi administrat prin tuburi gastrice/nasogastrice
- Indicat în situații în care este preferabilă o alternativă la formula sub formă de gel

EMEDOG

1 mg/ml soluție injectabilă pentru câini

Compoziție:
Fiecare ml de soluție conține:
Apomorfină 1,0 mg
(echivalent cu 1,17 mg de clorhidrat de apomorfină hemihidrat)
Metabisulfit de sodiu (E223) 1,0 mg



Specii țintă:
Câini

Indicații de utilizare:
Introducerea emezei

Dozaj și mod de administrare:
Numai pentru utilizare pe cale subcutanată.
O singură injecție de apomorfină la doza de 0,1 mg/kg greutate corporală (echivalent cu 1 fiolă de 1 ml/10 kgc)



Monge VetSolution



Soluții nutriționale specializate, special adaptate pentru a susține sănătatea și vitalitatea animalelor de companie cu nevoi speciale.

CALITATE PREMIUM

FĂRĂ ADAOS DE COLORANȚI ȘI CONSERVANȚI ARTIFICIALI

X.O.S. PREBIOTICE

FORMULĂ FĂRĂ CEREALE

HIGH PREMIUM QUALITY Gemon®

Hrană Premium completă pentru câini și pisici

✓ Ingrediente de calitate superioară, special selectate pentru a satisface nevoile nutriționale ale animalelor.

✓ Hrană special adaptată pentru toate vârstele și condițiile de viață ale animalelor.

✓ Gustul excepțional al crochetelor se datorează includerii de carne proaspătă, care este o sursă de nutrienți esențiali precum proteine, minerale și vitamine.

✓ Fără coloranți și conservanți artificiali.





HRANĂ PREMIUM PENTRU ANIMALE

- Formulă solidă cu ingrediente de înaltă calitate care sunt ușor digerabile.
- Sursă de proteină animală (pui, miel sau somon)
- Fără gluten - conținut ridicat de orez
- Fără odorizanți, coloranți și aromatizanți artificiali.



Calitativ, simplu & pur

GALASTOP

SOLUȚIA EFICIENTĂ PENTRU PROBLEMELE CAUZATE DE GESTAȚIA FALSĂ ȘI LACTAȚIA NERVOASĂ LA CĂȚELE



Indicații:
Tratamentul gestaţiei false la căţele, suprimarea lactaţiei la căţele şi suprimarea lactaţiei la pisici.

Substanță activă: 50 µg cabergolină / ml

Specii țintă: Căţele şi pisici

Administrare:
Dozajul recomandat, atât la căţele cât şi la pisici este de 0,1 ml GALASTOP/kg greutate corporală (echivalent a 5 µg cabergolină/kg greutate vie) o dată pe zi timp de 4-6 zile consecutive în funcţie de starea clinică a animalului.

Calea de administrare: pe cale orală ca atare sau amestecată în mâncare.
Soluția poate fi administrată cu pipeta sau cu seringa dozatoare.

KLISTIER
130 ml

cp-pharma



Compoziție:
Fosfat de monohidrogen sodic, metilparaben, benzoat de sodiu, hidroxid de sodiu, apă distilată.

Administrare:
Câini de talie mare ½ - 1 flacon, câini de talie mică ¼ - ½ flacon.

Indicaţii:
Soluţie pentru spălături transrectale, în caz de obstrucţii, golirea rectului rapid înaintea operaţiilor, pregătiri pentru ex. ginecologic, Röntgen, ex. rectoscopic şi proctoscopic.

cp-pharma

UROCID PASTĂ
100 g



Compoziție:
DL-metionină, extract de merişoare (Cranberry), sirop de melasă, glicerină.

Administrare:
Pisică: 1/2 - 1 linguriță/pisică, de 2 ori pe zi
Câine: 1 - 3 linguriţe/câine, de 2 ori pe zi
A se administra odată cu hrana sau după masă.



Indicaţii:
Pentru sprijinirea dizolvării struviţilor şi pentru prevenirea formării acestora. DL-Metionina creează şi menţine un pH urinar acid care ajută la dizolvarea şi inhibă non-formarea struviţilori. În extractul de merişoare (Cranberry) (*Vaccinium macrocarpon*) proantocianida reduce, prin efectul antiadeziv special exercitat asupra *E. coli*, adeziunea şi multiplicarea agenţilor patogeni.

BisLac Pet

Înlocuitor de lapte
pentru
căței și pisoi

PREMIUM

Este recomandat:

- Pentru hrănirea puilor din prima zi de viață.
- Pentru femelele gestante sau aflate în perioada de gestație.
- În caz de lapte matern insuficient.
- În timpul fazei de tranziție către hrana solidă.
- Pentru hrănirea câinilor și pisicilor senioare cu o stare generală slăbită.

Ghid de hrănire 1-4 săptămâni

Vârstă (săptămâni)	Numărul de mese/zi	Planul de hrănire (ml)			
		Pisici	Căței de talie mică	Căței de talie medie	Căței de talie mare
1	8	2-5	10-20	20-30	25-40
2	6	5-10	30	50	70
3	5	10-15	50	70	110
4	4	10-15	60	80	120

Conținut optim de lactoză, digestibilitate crescută

Conținut echilibrat de vitamine și oligoelemente

Fără amidon, structură apropiată de laptele matern

Conținut bogat în DHA și taurină



31% PROTEINĂ
34% GRĂSIME
DHA ADĂUGAT

Comfort zone®

Soluția ideală non-medicamentoasă pentru reducerea comportamentelor nedorite

MADE IN USA

CONCENTRAȚIE MARE DE FEROMONI
UNIC ÎN ROMÂNIA - SINGURA ZGARDĂ CU FEROMONI PENTRU PISICI

Difuzor cu feromoni Comfort Zone



Zgardă cu feromoni Comfort Zone



Comfort Zone oferă pisicilor un sentiment de **siguranță, fericire și relaxare.**
Vaporii eliberați imită **feromonii naturali** ai pisicii semnalizând că zona este **familiară și sigură.**

Compoziție:
Hidrocarburi izoparafinice 85%
Analog de feromon felin 5%
Alte ingrediente10%

Zone de utilizat:
- În sala de așteptare a cabinetelor / clinicilor veterinare
- În sala de consultații / tratament
- La domiciliu

Recomandat pentru:
- Calmarea generală în diferite situații de stres (78%)
- Acomodarea cu animale de companie noi (75%)
- Adaptarea la o casă nouă (71%)



FLUOXEVET

Pentru câini mai echilibrați, mai liniștiți, mai fericiți.

Un aliat eficient în gestionarea tulburărilor de comportament asociate anxietății de separare la câini, manifestate prin comportamente distructive sau inadecvate.

Substanță activă: Fluoxetină



- ☑ Comprimate de 32 mg - divzibile pentru o dozare precisă.
- ☑ Potrivite pentru câini cu greutatea între 4 și 32 kg .
- ☑ Profil aromatic unic, ușor de administrat.
- ☑ Disponibil în cutii de 30 de comprimate.
- ☑ Valabilitate după deschidere: 4 luni.

Indicații și administrare:

Tratament adjuvant al tulburărilor legate de separare la câini, manifestate prin comportament distructiv și inadecvat (vocalizare și defecare și/sau urnare în mod inadecvat), și numai în combinație cu tehnici de modificare a comportamentului.

Comprimatele pot fi divizate în 2 sau 4 părți egale, pentru a asigura dozarea corectă.

Administrare pe cale orală, în doză zilnică unică de 1-2 mg/kg greutate corporală, cu sau fără alimente.

Cum acționează Fluoxevet®?

Fluoxevet® conține fluoxetină, un inhibitor selectiv al recaptării serotoninei (SSRI), care:

- ☑ Crește nivelul de serotonină în creier
- ☑ Îmbunătățește transmisia serotonergică
- ☑ Contribuie la reducerea stresului, fricii și comportamentelor distructive asociate separării



LITTER KING

AȘTERNUT ECOLOGIC PENTRU PISICI

Formulă hipoalergenică

100% PREMIUM QUALITY

- Așternut PREMIUM sub formă de granule pentru pisici, realizat din fibre 100 % naturale din lemn de molid pur.
- Menține mirosul proaspăt în litieră datorită parfumului natural de molid.



MOD DE UTILIZARE:

✓ Umpleți litiera pisicii cu un strat de 5-6 cm de așternut ecologic LITTER KING.

✓ Îndepărtați bulgării formați o dată sau de două ori pe zi pentru a păstra litiera curată și completați cu așternut proaspăt ori de câte ori este necesar.

✓ La nevoie schimbați în totalitate așternutul.



CARNET DE SĂNĂTATE ÎNSERIAT



PAŞAPORT PENTRU ANIMALE ÎNSERIAT



CITITOR MICROCIP

Frecvența	134.2KHZ
Distanța de citire	13 cm
Dimensiuni	122*60*19 mm
Timp de încărcare	4-5 ore
Autonomie	5 h (3000 citiri)
Tip citire	EMID, FDX-B

APLICAȚII:

CROTALII BOVINE



CROTALII SUINE



INEL CIP PORUMBEI



MICROCIP



MICROCIP CU APLICATOR









STETOSCOP SIMPLU ŞI DUBLU



Stetoscopul simplu este prevăzut cu un capăt simplu din aluminiu anodizat și tub Y din PVC.
Stetoscopul dublu este prevăzut cu un capăt dublu, placat cu argint și tub standard din PVC.

MICROSCOP TRINOCULAR




- Cap trinocular înclinat la 45^0 (stil culisant) şi 30^0 (fără compensare)
- Rotaţie 360^0
- Distanţă interpupilară ajustabilă între 48 - 75 mm
- Oculare cu câmp larg de 10x/22 mm
- Focalizare coaxială fină cu ajutorul butoanelor de control coaxial
- Dimensiune platformă 140 mm x 140 mm
- Deplasare X-Y: 75 mm x 45 mm
- Sistem optic infinit, iluminare Kohler
- Intensitate ajustabilă
- Iluminare 6 V/20 W lampă cu halogen, reglabilă
- Obiective: plan acromatic 4X, 10X, 40 XR, 100 XR



REFRACTOMETRU URINĂ ŞI PROTEINĂ MEDX





- ✓ Măsoară rapid și precis nivelul de concentrație al urinei
- ✓ Permite măsurarea greutății specifice a urinei, a proteinelor serice și a indicelui de refracție.
- ✓ Structură din aluminiu, conferind greutate redusă, dimensiuni mici și portabilitate.
- ✓ Oferă un câmp vizual mai larg, facilitând o citire mai precisă și mai clară a rezultatelor.

Specificații:
Scala S.P. (concentrație proteine): 0-12 g/ml Div: 0.2 g/ml Precizie: ± 0.2 g/ml
Scala ND (indice de refracție): 1.330 RI – 1.360 RI Div: 0.0005 RI Precizie: ± 0.0005 RI
Scala UG (greutate specifica): 1.000-1.050 sg Div: 0.002 sg Precizie: ± 0.002 sg
Dimensiune (mm): 26 x 40 x 170

OTOSCOP DIGITAL IO1 VET

Otoscop veterinar multifuncțional cu Wifi



Urechi



Nas



Dinți



Piele

Specificații tehnice:

Dimensiuni 90 x 40 x 175 mm
Afișaj 1,5” TFT-LCD color
Rezoluție Full HD
Tip focalizare fixă
Sursă de lumină LED alb cu luminozitate ridicată
Format fișier JPEG, Mp4
Interfață USB/Type C
Memorie Card Micro SD 32G
WIFI Standard 802.11
Putere Baterie reîncărcabilă cu litiu Bulit-in
3.7V/2600mAh/6 ore de funcționare

Modul Wifi se conectează la Windows

Ieșirea video permite afișarea sincronizată a imaginilor și clipurilor video pe un PC extern sau pe un laptop, îmbunătățind comunicarea dintre medicul veterinar și proprietarul animalului de companie.



FULL HD Resolution

Wi-Fi





QuickBis

Teste pentru diagnostic veterinar



REZULTAT RAPID

UŞURINŢĂ ÎN INTERPRETAREA REZULTATELOR

ACURATEŢE CRESCUTĂ

DEPOZITARE LA TEMPERATURA CAMEREI (4-30°C)

Teste pentru diagnostic simplu:


Test	Probă
Gestație canină Test Rapid Relaxin	Ser sau plasmă
Distemper Virus Test Rapid CDV Ag	Secreții (oculare, nazale, rectale) / Ser sau plasmă
Parvovirus Antigen Test Rapid CPV Ag	Fecale sau vomă
Panleucopenia felină Test Rapid FPV Ag	Fecale sau vomă
Dirofilaria Immitis Test Rapid CHW Ag	Ser, plasmă sau sânge
Toxoplasma IgG/IgM Test Rapid (TOXO Ag)	Ser sau plasmă
Giardia Test Rapid Giardia Ag	Fecale sau vomă
Brucella canină Test rapid C.Brucella Ac	Ser, plasmă sau sânge
Coronavirus Felin Test Rapid FCoV Ag	Fecale
Coronavirus Felin Test Rapid FCoV Ac	Ser, plasmă sau sânge
Babesia Gibsoni Test Rapid B.G. Ac	Ser, plasmă sau sânge
Leishmania canis Test Rapid LSH Ac	Ser sau plasmă

Teste pentru diagnostic combinat:


Test	Probă
Parvovirus, Coronavirus, Giardia Test Rapid CPV+CCV+GIA Ag	Fecale sau vomă
Virusul imunodeficienței feline + virusul leucemiei feline Test Rapid Combo FIV Ac/FeLV Ag	Ser, plasmă sau sânge
Ehrlichia-Lyme-Anaplasma-Dirofilaria Test Combo EHR-LYM-ANA-CHW Ac	Ser sau plasmă

ACE ŞI FIRE DE SUTURĂ

Identificarea acelor şi montare



Corp rotund




Tăiere curbă


Forma acului




Drept ½Cerc 3/8 Cerc 1/4 Cerc 5/8 Cerc



Fir acid poliglicolic, polifilament



Fir catgut cromic



Fir mătase chirurgicală



Fir nailon




Polipropilenă Monofilament

Absorbabile

Fir acid poliglicolic, polifilament
Fir catgut cromic
Fir polidioxanonă

Neabsorbabile

Fir mătase chirurgicală
Fir nailon



Fir polidioxanonă cu ac atraumatic (monofilament)



Fir de sutură fabricat din poliesterul polidioxanonă, resorbabil, sintetic, monofilament. Firul este acoperit cu polimer de polidioxanonă pentru a fi non antigenic, apirogen, extrem de moale şi pentru a realiza noduri sigure.

Caracteristici produs:

- Material: poliester polidioxanonă
- Modalitate de absorbţie: hidroliză
- Timp de absorbţie: 180-210 zile
- Timp retenţie nod: până la 56 zile
- Grosime fir: USP 2, USP 1, USP 0
- Lungime fir: 75 cm
- Curbură ac: ½
- Tip ac: Secţiune rotundă (ac rotund) 45 mm, 40 mm, 35 mm
- Mod de ambalare: 12 buc/cutie

Beneficii:

- Efect minim la nivel de ţesut
- Trecere uşoară prin ţesut
- Manipulare uşoară
- Produs sterilizat
- Absenţa capilarităţii
- Înnodare excelentă

Indicaţii:

Chirurgie generală, Chirurgie gastrointestinală, Chirurgie oftalmică, Ortopedie, Ginecologie-Obstetrică, Urologie, Chirurgie plastică



Fir acid poliglicolic, polifilament



Descriere:
Fir resorbabil pe termen mediu, realizat din acid poliglicolic pur, polifilament. Descompunerea acestuia se realizează prin hidroliză, într-o manieră predictibilă.

Caracteristici produs:

- Material: acid poliglicolic
- Modalitate de absorbţie: absorbţie prin hidroliză
- Perioada de resorbţie predictibilă: 60-90 zile
- Grosime fir: USP 2, USP 1, USP 0, USP 2/0, USP 3/0
- Lungime fir: 75 cm
- Curbură ac: ½
- Tip ac: Secţiune rotundă (ac rotund) 45 mm, 40 mm, 35 mm, 30 mm, 25 m
- Mod de ambalare: 12 buc/cutie

Beneficii:

- Manipulare uşoară
- Siguranţă la înnodare
- Noduri sigure
- Rezistenţă la rupere
- Flexibilitate ridicată
- Produs sterilizat
- Trecere uşoară prin ţesut

Indicaţii:

Chirurgie generală, Chirurgie oftalmică, Ginecologie-Obstetrică, Ortopedie, Urologie, Chirurgie plastică.

Contraindicaţii:

Fiind o sutură resorbabilă, nu trebuie utilizată în situaţiile în care este necesar un suport prelungit la nivelul plăgii.

ACE PREMIUM

Tehnologie avansată de fabricație din oțel german 300 PLUS




- **Rezistență ridicată**
- **Pătrundere ușoară prin țesut**
- **Control precis**
- **Traumă minimă a țesutului**

Ace pentru cele mai complexe intervenții chirurgicale de specialitate:
- Chirurgie cardiovasculară
- Chirurgie oculară
- Chirurgie plastică, estetică și reconstructivă

Ace din silicon, cu o combinație excelentă de:
- Curburi
- Lungimi ale acului
- Vârfuri ale acului

Curburi



Produse exclusive Atramat®

Ace Atraglide®

Special concepute pentru cele mai complexe intervenții chirurgicale de specialitate



Vârf
Vârf de ac cu margini tăioase subțiri, oferind o trecere ușoară și lină prin țesut.

Înveliș
Permite o trecere mai lină prin țesut, cu rupere minimă și reducerea semnificativă a daunelor tisulare.

Geometrie
Asigură o pătrundere mai mare și o traiectorie controlată prin țesut.

Vârf



Fire de sutură Atramat®

- **Rezistență mare la rupere și tracțiune**
- **Reacție tisulară minimă**
- **Fixare excelentă a nodurilor**



Atramat® controlează întregul proces de fabricare a firelor sale, de la nivel molecular până la produsul finit. Folosind cele mai avansate tehnologii și cei mai experimentați specialiști, firele Atramat® au o calitate superioară și sunt disponibile atât în varianta de fir resorbabil, cât și neresorbabil.

FIRE MONOFILAMENT

- „Memorie” redusă datorită sistemului inovativ de fabricație.
- Efect minim de „tăiere” datorită flexibilității firului, protejând complet țesutul.
- Reacție tisulară minimă.
- Fixare excelentă a nodurilor.
- Alunecare netedă și atraumatică prin țesut.
- Rezistență mare la rupere și tracțiune.
- Rezistență mare la întindere.
- Hidroliză predictibilă (pentru fire resorbabile).
- Suprafață sterilă garantată.


FIRE MULTIFILAMENT

- Efectul de „aspect zimțat” este redus datorită flexibilității firului, protejând complet țesutul.
- Performanță excelentă la realizarea nodurilor.
- Rezistență mare la rupere și tracțiune.
- Reacție tisulară minimă.
- Hidroliză predictibilă (pentru fire absorbabile).
- Suprafață sterilă garantată.


FIRE DE SUTURĂ CHIRURGICALE




Tip	Multifilament împletit și acoperit
Compoziție	Acid poliglicolic
Acoperire:	Policaprolactonă și stearat de calciu (1%)
Culoare:	Violet
Reacție tisulară:	Minimă
Absorbție:	Acțiunea hidrolitică prin care materialul este descompus duce la absorbție completă în aproximativ 60–90 de zile. Aproximativ 50% din rezistența la tracțiune se păstrează după 21 de zile.



Rezistență la tracțiune



Absorbția



SURGICRYL® PGA POLYGLYCOLIC ACID

ÎN CASETĂ

Metric	USP	Lungimea
1.5	4/0	15 m
2	3/0	15 m
2	3/0	25 m
3	2/0	15 m
3	2/0	25 m
3	2/0	50 m
3.5	0	15 m
3.5	0	25 m
3.5	0	50 m
4	1	15 m
4	1	25 m
4	1	50 m
5	2	15 m
5	2	25 m
5	2	50 m
5	2	100 m
6	3&4	15 m
6	3&4	25 m
6	3&4	50 m
6	3&4	100 m
7	5	15 m
7	5	25 m
7	5	50 m
8	6	15 m
8	6	25 m
8	6	50 m

SURGICRYL® Plus PGA POLYGLYCOLIC ACID

ÎN CASETĂ cu lichid

Metric	USP	Lungimea
1.5	4/0	15 m
2	3/0	15 m
2	3/0	25 m
3	2/0	15 m
3	2/0	25 m
3	2/0	50 m
3.5	0	15 m
3.5	0	25 m
3.5	0	50 m
4	1	15 m
4	1	25 m
4	1	50 m
5	2	15 m
5	2	25 m
5	2	50 m
5	2	100 m
6	3&4	15 m
6	3&4	25 m
6	3&4	50 m
6	3&4	100 m
7	5	15 m
7	5	25 m
7	5	50 m
8	6	15 m
8	6	25 m
8	6	50 m

CATETERE URINARE
PENTRU CÂINI ŞI PISICI

COMPOZIŢIE:

CATETER PENTRU CÂINI – Fabricat din polipropilenă biocompatibilă, oferind rigiditatea optimă necesară
CATETER PENTRU PISICI – Realizat din polietilenă de joasă densitate, cu stilet de introducere din sârmă; special conceput pentru a fi moale şi flexibil
CONECTOR CATETER – Tip Luer lock, pentru conectarea la o seringă sau la o pungă de colectare a urinei



CATETER PISICI
12 buc. / cutie

	*
1.00 mm x 13 cm	3 FG
1.30 mm x 13 cm	4 FG
1.00 mm x 13 cm with Stylet	3 FG
1.30 mm x 13 cm with Stylet	4 FG



CATETER CÂINI
12 buc. / cutie

	*
1.30 mm x 50 cm	4 FG
2.00 mm x 50 cm	6 FG
2.60 mm x 50 cm	8 FG
3.30 mm x 50 cm	10 FG

* Coduri de culoare -
3FG = roz, 4FG = alb, 6FG = galben, 8FG = portocaliu, 10FG = roşu

CAPSATOR
DISPOZITIV DE APLICAT AGRAFE DE SUTURĂ



Dimensiunea capsei
6,4 mm
4,0 mm

DECAPSATOR
AGRAFE DE SUTURĂ




LAME BISTURIU SMI






Pentru mânerul nr. 3 — N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 12d | N° 15 | N° 15c



Pentru mânerul nr. 4 — N° 18 | N° 20 | N° 21 | N° 22 | N° 23 | N° 24 | N° 25

MÂNER BISTURIU INOX SMI
Nr. 3 / Nr. 4



BANDAJ AUTOADEZIV / AUTOADEZIV CU GUST AMAR



2.5 cm - 4.5 m
5 cm - 4.5 m
7.5 cm - 4.5 m
10 cm - 4.5 m
15 cm - 4.5 m

COLIERE ELISABETANE



Coliere flexibile pentru animale de companie, realizate din material rezistent, pe bază de polietilenă, utilizate pentru a împiedica animalul să ajungă la rănile de pe corp sau cap.

• Colier Elisabetan 7,5 cm
Circumferinţa gâtului: 18 - 20 cm; Adâncime: 7,5 cm; Grosime: 0.06 cm
(pisici, Chihuahua, Miniature Pinscher etc.)

• Colier Elisabetan 10 cm
Circumferinţa gâtului: 20 - 23 cm; Adâncime: 10 cm; Grosime: 0.06 cm
(pisici, câini de talie mică)

• Colier Elisabetan 12,5 cm
Circumferinţa gâtului adecvată: 24 - 28 cm; Adâncime: 12.5 cm; Grosime: 0.06 cm
(pisici peste 10 kg, Pomeranian, Shih Tzu)

• Colier Elisabetan 15 cm
Circumferinţa gâtului adecvată: 26 - 31 cm; Adâncime: 15 cm; Grosime: 0.08 cm
(Schnauzer)

• Colier Elisabetan 20 cm
Circumferinţa gâtului adecvată: 30 - 36 cm; Adâncime: 20 cm; Grosime: 0,08 cm
(Pechinez, Bichon Frise)

• Colier Elisabetan 25 cm
Circumferinţa gâtului adecvată: 35 - 40 cm; Adâncime: 25 cm; Grosime: 0,08 cm

• Colier Elisabetan 30 cm
Circumferinţa gâtului adecvată: 35 - 41 cm; Adâncime: 30 cm; Grosime: 0,08 cm
(Pechinez, Cocker spaniol)

• Colier Elisabetan 35 cm
Circumferinţa gâtului adecvată: 40 - 47 cm; Adâncime: 35 cm; Grosime: 0,09 cm
(Husky, Golden Retriever, Samoyed)

• Colier Elisabetan 40 cm
Circumferinţa gâtului adecvată: >47 cm; Adâncime: 40 cm; Grosime: 0,1 cm
(câini de talie mare)





HSW SERINGĂ PLEXIGLAS - TU FLEX-MASTER®

Volum: 10 ml LL, 20 ml LL; 50 ml LL



VERSIUNEA A: pentru dozare ușoară

Seringă ajustabilă hipodermică din plastic TPX
Dozare ușoară
Duza Luer Lock metalică, interschimbabilă
Autoclavabilă (se sterilizează la 134°)
Ambalat individual
Duză de administrare disponibilă ca accesor

SERINGI CU AC

VOLUM	BUC/CUTIE
1 ML CU AC 21 G (3 CP)	100
10 ML CU AC 21 G (2 CP)	100
10 ML CU AC 21 G (3 CP)	100
2 ML CU AC 18 G (2 CP)	100
2 ML CU AC 18 G (3 CP)	100
20 ML CU AC 21 G (2 CP)	80
20 ML CU AC 21 G (3 CP)	100
20 ML CU AC 21 G (3 CP)	50
5 ML CU AC 22 G (2 CP)	100
5 ML CU AC 22 G (3 CP)	100
50-60 ML CU AC 18 G (3 CP)	25



SERINGĂ UF FĂRĂ AC 100 ML (3 CP)



TUB ENDOTRAHEAL CU BALON, CU CONECTOR



- Fabricat din PVC de uz medical
- Material flexibil
- Volum mare, manșeta de presiune scăzută menține o etanșare bună
- Model tip Murphy
- Linie radioopacă pe întreaga lungime a tubului

Mărimi: 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm.

PERFUZOR

Trusă pentru perfuzie cu membrană hidrofobă pentru umplerea fără aer a trusei şi fără pierdere de substanţă, cu filtru hidrofil pentru oprirea automată după golirea flaconului.



Caracteristici:

- lungime 180 cm;
- rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar); tub 3mm x 4,1 mm;
- canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevazută cu două orificii;
- dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm şi căpăcel de protecţie;
- cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ~1 ml; cel inferior flexibil) şi cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului;
- filtru de 15 µm în camera de picurare;
- conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofobă ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță;
- fără LATEX



PERFUZOR Y- AC PLASTIC- LUER LOCK

Pentru administrarea soluțiilor perfuzabile.
Tub de plastic din PVC nontoxic cu o lungime de minim 155cm, la care se adaugă 25cm ai tubului perfuzorului.
Luer-lock pentru securizarea procedurii, împotriva deconectării accidentale.

BRANULE CU VALVĂ

14 G	16 G	17 G	18 G
			

20 G	22 G	24 G	26 G
			

COMPRESE TIFON

COMPRESE 10/10 CM 100 BUC /PACHET
COMPRESE 5/5 CM 100 BUC/PACHET
COMPRESE STERILE 10/8 HELP



BANDAJ ELASTIC AUTOADEZIV

Dimensiuni: 4.5 m lungime, 10 cm lăţime.
Culori disponibile: albastru.
Ambalare: 12 role/cutie.



BistriVet
Everything for vets and farms
www.bistrivet.ro

VIZITEAZĂ SITE-UL BISTRI-VET

www.bistrivet.ro



design nou

conținut actualizat

interfață intuitivă

catalog complet de produse