

+ EMEDOG – GHID ADMINISTRARE

EMETIC VETERINAR CU APOMORFINĂ LICENȚIAT
PENTRU UTILIZARE LA CÂINI

**DIMENSIUNEA ȘI CONCENTRAȚIA FIOLEI
SUNT FORMULATE SPECIAL PENTRU A ASIGURA
O DOZARE UȘOARĂ ȘI PRECISĂ, CU RISIPĂ MINIMĂ.**

- Conține fiole de 1 ml
- Injecție subcutanată
- 1 mg apomorfina / ml



0,1 ml/kg sau 1 fiolă la 10 kg administrată subcutanat.

Greutate (kg)	2	5	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35	40	45
Dozaj (ml)	0.2	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5

PART OF THE
ANTI-TOX
RANGE
BE PREPARED FOR POISONING

BistriVet
Everything for vets and farms
www.bistrivet.ro

tvm UK
INNOVATIVE
ANIMAL HEALTH

CE ESTE EMEDOG?


Emedog conține apomorfina. Apomorfina este un agonist al receptorilor de dopamină, care provoacă vărsături atunci când este administrată câinilor.

CUM ACȚIONEAZĂ APOMORFINA?

Cele două părți ale creierului implicate în declanșarea vomei sunt:

- (1) zona chemoreceptorilor declanșatori
- (2) centrul vomei.

Apomorfina activează (1) zona chemoreceptorilor declanșatori prin legarea de receptorii de dopamină. Aceasta, la rândul său, activează (2) centrul vomei.



ACȚIUNE FOARTE RAPIDĂ

Eforturile de expulzare apar între 2 și 15 minute după injecție. Eliminarea substanțelor toxice ingerate se face, astfel, cât mai repede.



EFICIENT CU DOAR 1 INECȚIE

Nu este necesară readministrarea produsului, din contră, o doză mare de apomorfina poate provoca un efect invers (antiemetic), printr-un efect depresor asupra centrului vomei.

Emedog 1 mg/ml, soluție injectabilă pentru câini cu apomorfina. Pentru inducerea vomei la câini. Te rugăm să consulți ambalajul produsului și broșura pentru informații despre efectele secundare, precauții, avertismente și contraindicații.

PART OF THE
ANTI-TOX
RANGE
BE PREPARED FOR POISONING

BistriVet
Everything for vets and farms
www.bistrivet.ro

tvmUK
INNOVATIVE
ANIMAL HEALTH