

FICOXIL

Comprimat masticabil cu Firocoxib pentru câini



GESTIONAȚI DUREREA

TABLETE DIVIZIBILE ȘI HIPOALERGENICE

Comprimat masticabil Ficoxil pentru câini

Firocoxib 57 mg și 227 mg

Specii țintă

Câini

Indicații

Pentru ameliorarea durerilor și a inflamațiilor asociate cu osteoartrita la câini. Pentru ameliorarea durerilor postoperatorii și a inflamațiilor asociate leziunilor țesuturilor moi la câini și în chirurgia ortopedică și dentară.

Cantități de administrat

Administrare orală.

Osteoartrită: Se administrează 5 mg per kg greutate corporală o dată pe zi.

Durata tratamentului va depinde de reacția observată. Având în vedere faptul că studiile din teren au fost limitate la 90 de zile, tratamentul pe termen mai lung trebuie să fie analizat cu atenție și necesită monitorizare obișnuită de către medicul veterinar.

Ameliorarea durerii postoperatorii: Se administrează 5 mg per kg greutate corporală o dată pe zi, timp de până la 3 zile, după cum este necesar, începând cu aproximativ 2 ore înainte de intervenția chirurgicală.

În urma unei intervenții chirurgicale

ortopedice și în funcție de reacția observată, tratamentul cu aceeași schemă de administrare zilnică a dozei poate fi continuat după primele 3 zile, la latitudinea medicului veterinar curant. Comprimatele se pot împărți în 2 sau 4 părți egale, pentru o dozare precisă. Comprimatele se pot administra cu sau fără alimente.

Contraindicații

Nu se utilizează la cățele gestante sau aflate în perioada de lactație. Nu se utilizează la animale cu vârsta mai mică de 10 săptămâni sau cu greutatea corporală mai mică de 3 kg.

Nu se utilizează la animale care suferă de sângerare gastrointestinală, discrazie sanguină sau tulburări hemoragice.

Nu se utilizează concomitent cu corticosteroizi sau alte medicamente antiinflamatoare non-steroidiene (AINS).

Termen de valabilitate

3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar
7 zile.

Depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

Referințe

1. Autefage A, Palissier F, Asimus E et al. 2011. Long-term efficacy and safety of firocoxib in the treatment of dogs with osteoarthritis. *Veterinary Record*; 168(23): 617.
2. Aragon C, Hofmeister E, Budsberg S. 2007. Systematic review of clinical trials of treatments for osteoarthritis in dogs. *Journal of the American Veterinary Medical Association*; 230 (4): 514–521.
3. Hanson P, Brooks K, Case J, et al. 2006. Efficacy and safety of firocoxib in the management of canine osteoarthritis under field conditions. *Veterinary Therapeutic*; 7(2): 127-140.
4. Budsberg S. 2015. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. *Handbook of Veterinary Pain Management*; 8: 142-160.
5. Wooten J, Blikslager A, Marks S et al. 2009. Effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs with varied cyclooxygenase-2 selectivity on cyclooxygenase protein and prostanoïd concentrations in pyloric and duodenal mucosa of dogs. *American Journal of Veterinary Research*; (10):1243-1249.
6. Lascelles B, McFarland J, Swann H. 2005. Guidelines for safe and effective use of NSAIDs in dogs. *Veterinary Therapy*; 6: 237–251.

FICOXIL

GESTIONAȚI DUREREA

Comprimat masticabil Firocoxib pentru câini

Along with you



FICOXIL


Comprimat masticabil cu Firocoxib pentru câini

OSTEOARTRITA

Osteoartrita este o boală degenerativă progresivă a articulațiilor, caracterizată prin durere și dizabilitate asociate cu distrugerea cartilajului articular și remodelarea osoasă.

Afectează în general câinii în vârstă, iar greutatea corporală excesivă (obezitatea) poate exacerba boala.¹

FICOXIL conține substanța activă firocoxib, care aparține grupului de medicamente antiinflamatoare non-steroidiene (AINS), în special clasei coxib.



Obiectivul tratamentului este de a reduce durerile și inflamațiile, menținând astfel mobilitatea și calitatea vieții câinelui.

Molecula de firocoxib prezintă proprietăți analgezice, antiinflamatorii și antipiretice, care au îmbunătățit scorul pe scara de ameliorare a durerii și a inflamației.^{2,3}

FICOXIL este indicat pentru a ameliora:

- Durerile și inflamațiile asociate cu osteoartrita.
- Durerile post operatorii și inflamațiile asociate leziunilor țesuturilor moi la câini și în chirurgia ortopedică și dentară.

GESTIONAȚI DUREREA



Mai puține efecte gastrointestinale adverse^{5,6}

Mai puțin decât alte AINS.



Produs hipoalergenic și fără gluten



Comprimat aromat și masticabil

Aromă de vită de origine animală.



Blister perforat

Pentru administrare ușoară.




2 moduri de prezentare pentru toate mărimile

57 mg și 227 mg



Comprimat divizibil

Comprimatele se pot împărți în 2 sau 4 părți egale.



FICOXIL este un inhibitor selectiv COX-2⁴

Greutate corporală (kg)	Ficoxil 57 mg	
	Număr de comprimate administrate pe zi	
3-4	1/4	☐
> 4-7	1/2	☐
> 7- 10	3/4	☐
> 10-12,5	1	●
> 12,5-15,5	1+1/4	● ☐
> 15,5-18,5	1+1/2	● ☐
> 18,5-21	1+3/4	● ☐
> 21-24	2	● ●

Greutate corporală (kg)	Ficoxil 227 mg	
	Număr de comprimate administrate pe zi	
10-17	1/4	☐
> 17-28	1/2	☐
> 28-39	3/4	☐
> 39-51	1	●
> 51-62	1+1/4	● ☐
> 62-73	1+1/2	● ☐
> 73-85	1+3/4	● ☐
> 85-96	2	● ●

DURATA TRATAMENTULUI

Osteoartrită: Având în vedere faptul că studiile din teren au fost limitate la 90 de zile, tratamentul pe termen mai lung trebuie să fie analizat cu atenție și necesită monitorizare obișnuită de către medicul veterinar.

Ameliorarea durerilor postoperatorii: timp de până la 3 zile, după cum este necesar, începând cu 2 ore înainte de operație.

Tratamentul trebuie continuat fără întrerupere timp de până la câteva zile după dispariția completă a simptomelor clinice.



DOZE

5 mg per kg greutate corporală o dată pe zi.

