

APROAPE BINE NU ESTE SUFICIENT




Firodyl®

Lucrurile mici
fac diferența

Firocoxib
62.5 mg și 250 mg
tablete palatabile



EFICACITATE DOVEDITĂ ÎN DUREREA CRONICĂ



Eficacitate **crescută** în durerea asociată osteoartritei

➤ **Din ziua 10**
➤ **Foarte bine în ziua 40**

Adaptat din Ryan et al., 2006 (1)


Rezultate clinice îmbunătățite în 40 de zile de tratament la 5mg/kg GC într-un studiu pe un număr de 1002 câini

■ Fără îmbunătățire ■ Îmbunătățire ușoară ■ Îmbunătățire mare sau moderată

Eficacitate pe termen lung în durerea asociată osteoartritei

➤ **Eficacitate continuă**
➤ **Până la 360 de zile**

Adaptat din Autefage et al., 2011 (2)




Scorul ortopedic mediu al câinilor diagnosticați cu osteoartrită cronică tratată cu 5 mg/kg/ zi firocoxib pe o perioadă de 360 de zile

■ Schiopătură ■ Durere la manipulare ■ Distanță de mișcare

NIVEL DE SIGURANȚĂ DEMONSTRAT

Nivel crescut de siguranță

➤ **De la 30 de zile**
➤ **Până la 360 de zile**



Analiza siguranței firocoxibului

■ Câinii retrași datorită reacțiilor adverse la firocoxib
■ Câinii rămași până la sfârșitul studiului

Studii sub 30 de zile de administrare: Stegall et al., 2007 (3); Pollmeier et al., 2006 (4); Hanson et al., 2006 (5); Hanson et al., 2004 (6)
Studii cu administrare între 30 și 90 de zile: Ryan et al., 2006 (1); Lecoindre, Pepin- Richard 2010 (7); Joubert 2009 (8)
Studii peste 90 de zile de administrare: Tangmahakul et al., 2015 (9); Albanes et al., 2013 (10); Autefage et al., 2011 (2)

AVANTAJE MULTIPLE



Palatabilitate superioară

pentru a ușura administrarea



Tablete divizabile

ușor de divizat prin simplă apăsare cu degetul




Evită supradozarea

Pentru a maximiza siguranța




Adaptat greutății

pentru optimizarea costurilor la rasele mari




► Ingerare spontană de Firodyl® și alt produs

Ceva Santé Animale, 2019 (11)



► Ingerare spontană complet de Firodyl® și alt produs

Ceva Santé Animale, 2019 (11)





Distribuit de Vetro Solutions
IAȘI, Calea Chișinăului, nr. 6 • Telefon: +40 332 803 182
• Email: office@vetro.vet • Website: www.vetro.vet



Greutate corporală (kg)	62.5mg	250mg
3.1		
3.2-6.2		
6.3-9.3		
9.4-12.5		
12.6-15.5		
15.6-18.5		
18.6-21.5		
21.6-25		
25.1-37.5		
37.6-50		
50.1-62.5		
62.6-75		
75.1-87.5		
87.6-100		

Firodyl 62.5 & 250 mg tablete masticabile pentru câini. Compoziție cantitativă și calitativă: Firodyl 62,5 mg : 62,5 mg firocoxib. Firodyl 250 mg: 250 mg firocoxib. **Specii țintă:** Câini. **Indicații:** Pentru ameliorarea durerii și inflamației asociată cu osteoartrita la câini și pentru ameliorarea durerii post-operatorii asociată țesuturilor moi, intervențiilor chirurgicale ortopedice și dentare la câini. **Posologie:** Doza minimă recomandată este de 5 mg/kg GC de firocoxib administrat oral o dată pe zi. **Contraindicații:** A nu se folosi în cazuri cunoscute de hipersensibilitate la substanța activă sau la unul dintre excipienți. A nu se folosi la cățelele gestante sau în lactație. A nu se folosi la animalele mai mici de 10 săptămâni ca vârstă sau mai puțin de 3 kg greutate corporală. **Reacții adverse:** Vomă și diaree au fost semnalate ocazional. Aceste reacții sunt de natură tranzitorie și sunt reversibile când tratamentul este stopat. Disfuncții renale sau hepatice au fost semnalate în cazuri foarte rare în doza normală recomandată la câini. Rar, au fost semnalate disfuncții neurologice la câinii tratați. Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați reprezentantul deținătorului autorizației de comercializare. **Precauții speciale pentru utilizarea la animale:** Deoarece tabletele sunt palatabile, trebuie depozitate într-un loc sigur departe de accesul animalelor. Doza recomandată, așa cum este indicată în tabelul de dozare, nu trebuie depășită. **Precauții speciale pentru persoana care administrează produsul medical animalelor:** Acest produs poate fi dăunător dacă este ingerat de către om. Pentru a preveni accesul copiilor la medicament, tabletele trebuie administrate și depozitate departe de accesul copiilor. Jumătățile sau sferturile de tabletă rămase trebuie returnate în blistere, iar blisterele depozitate în cutia de carton. Femeile gravide sau femeile care plănuiesc să rămână gravide trebuie să administreze produsul cu precauție. Spălați mâinile după administrarea produsului.

Surse:

1. RYAN et al., Clinical effectiveness and safety of a new NSAID, firocoxib: a 1,000 dog study, Vet Ther 7(2):119-126 (2006). • 2. AUTEFAGE et al., Long-term efficacy and safety of firocoxib in the treatment of dogs with osteoarthritis. Vet Rec 168:617 (2011). • 3. STEAGALL et al., Evaluation of the adverse effects of oral firocoxib in healthy dogs. J Vet Pharmacol Ther 30(3):218-223 (2007). • 4. POLLMEIER et al., Clinical evaluation of firocoxib and carprofen for the treatment of dogs with osteoarthritis. Vet Rec 159(17):547-551 (2006). • 5. HANSON et al., Efficacy and safety of firocoxib in the management of canine osteoarthritis under field conditions. Vet Ther, 7(2):127-140 (2006). • 6. HANSON et al. Health events recorded from 575 dogs treated for osteoarthritis with firocoxib, carprofen or etodolac. In: Programs and Abstracts of the 22nd Annual American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) Forum, Minneapolis (MN), USA 18:427 (2004). • 7. LECOINDRE, PEPIN-RICHARD, Tolerance of firocoxib in dogs with osteoarthritis during 90 days. J Vet Pharmacol Ther 34:190-192 (2010). • 8. JOUBERT, The effects of firocoxib (Previcox®) in geriatric dogs over a period of 90 days. J S Afr Vet Assoc 80(3):179-184 (2009). • 9. TANGMAHAKUL et al., Comparison of the efficacy of firocoxib and carprofen in clinical use for canine coxofemoral osteoarthritis. The Thai Journal of Veterinary Medicine 45(3), 351-362 (2015). • 10. ALBANESE et al., Clinical outcome and cyclo-oxygenase-2 expression in five dogs with solar dermatitis/actinic keratosis treated with firocoxib. Vet Dermatol 24(6):606-612 (2013). • 11. Ceva Santé Animale, Internal Data, D935 Palatability - Preference - Study report (2019).