

Meloxidyl



NU LĂSAȚI DUREREA SĂ COMPROMITĂ FERICIREA ANIMALELOR



Substanțe active: Meloxicam 1,5 mg / Sodium benzoate 2 mg

Specii țintă: câini

Indicații: Ameliorarea inflamației și a durerii în tulburările musculo-scheletale acute și cronice. Ideal în managementul durerii post-chirurgicale.

Administrare:

Administrare orală.

A se agita bine înainte de folosire.

A se administra amestecat în mâncare.

Tratamentul inițial constă în administrarea în prima zi a unei doze unice de 0,2 mg meloxicam/kg greutate corporală. Tratamentul va continua cu administrarea unei doze de întreținere zilnice orale (la intervale de 24 ore) de 0,1 mg meloxicam/kg greutate corporală. Suspensia poate fi administrată utilizând seringile gradate aflate în interiorul ambalajului. Seringa se află fixată pe flacon și are o scală care corespunde cu doza de întreținere (0.1mg Meloxicam/kg greutate corporală).

În acest fel pentru prima zi de tratament va fi necesar de două ori volumul pentru întreținere.

Un răspuns clinic normal se poate observa în 3-4 zile. Dacă nu se observă nicio îmbunătățire clinică, tratamentul trebuie întrerupt după 10 zile.